



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>




3 3433 06639457 2









Repertorium
der
Experimentalphysik,

enthaltend

eine vollständige Zusammenstellung der neuern
Fortschritte dieser Wissenschaft.



X 1 6

S u p p l e m e n t

z u

neuern Lehr- und Wörterbüchern der Physik

von

Gustav Theodor Fechner,

Doctor der Philosophie und außerordentlichem Professor zu Leipzig.

³
Dritter Band.

Leipzig, 1832.

Verlag von Leopold Voss.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's views on the state of the Union and the progress of the war.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1861.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1861.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

Inhaltsverzeichnis zum dritten Bande.

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine kosmische, tellurische und meteorologische Verhältnisse.

I. Vom Planetenraume.

	Seite
Über die Dichtigkeit des Äthers im Planetenraume (Walz)	1
Temperatur des Planetenraumes (Cvanderberg)	5
Resultate einer Luftfahrt (Forster)	5

II. Allgemeine Witterungsverhältnisse.

Einfluß des Mondes auf die Witterung (Schäbler, Flaugergues, u.	6
Einfluß der Erdbeben auf die meteorologischen Erscheinungen (Hoffmann)	8
Vorherbestimmung der Witterung (Wiegmann, Schön, Schäbler)	10

III. Vom Barometerstande.

Barometerstand im Niveau des Meeres unter verschiedenen Breiten und Längen (Erman, Kiese)	11
Mittler Barometerstand im Niveau der Nord- und Ostsee (Kiese)	12
Gang der monatlichen mittleren Barometeränderungen (Wach, Dove)	13
Ursache der täglichen Barometerschwankungen (Dove)	14
Bestimmungen über die täglichen Barometerschwankungen nach den neueren Beobachtungen (Bouvard, Carlini, Röntgen)	21
Mathematische Darstellung des Ganges der täglichen Barometerveränderungen an einem Orte (Halkett, Röntgen)	26
Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen (Flaugergues, Schäbler, Hallaschka, Siber)	27
Einfluß der Gewitter auf den Barometerstand (Strehle)	33
Fortschritt eines ungewöhnlich erhöhten Luftdruckes (Reißner)	33
Barometrische Höhenmessung (Förner, Eschmann, Gantler, Dove)	34

IV. Vom Winde.

	Seite
Windverhältnisse in Europa im Allgemeinen (Dove)	37
Jährliche Variation der mittlern Windrichtung in Deutschland (Schäb- ler)	38
Einfluß der Windrichtung auf den Druck der trockenen Luft und des atmosphärischen Wasserdampfes, so wie auf den ganzen Ba- rometerstand (Dove)	40
Formeln für die Abhängigkeit des Drucks der trockenen Luft, der Sta- ticität des atmosphärischen Wasserdampfes und des Barome- terstandes von der Windrichtung (Dove)	42
Einfluß des Mondes auf die Windrichtung (Dove)	43

V. Hygrometrischer Zustand der Luft.

Abhängigkeit des atmosphärischen Feuchtigkeitszustandes von der Zeit und Höhe (Dove)	44
-----------------------------------------------------------------------------------------	----

VI. Wässerige Niederschläge aus der Atmosphäre.

Regenmesser oder Hyetrometer (Horner, Schrön, Adam)	45
Regenmenge in verschiedenen Höhen (Fehler, Bugge)	45
Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge aus der Atmosphäre (Schäbler)	45
Hagel (Dimsted, Fehler)	56
Schnee (Quetelet)	61

VII. Über Variation der Kohlensäure in der Atmosphäre
(Gaussure)

61

VIII. Über atmosphärische Electricität und Gewitter.

Abhängigkeit der atmosphärischen Electricität von der Windrichtung (Schäbler)	74
Gewitterbildung (Dove)	79
Relative Häufigkeit der Gewitter in den einzelnen Monaten (Schm- der)	79

IX. Erdmagnetismus.

Methode, die Variationen der Declination und Declination zu verglei- chern und zu berechnen (Mosser)	80
Beseitigung der Fehler beim Messen der magnetischen Neigung (Kupf- fer)	82
Noch einige andere Fehlerquellen bei Bestimmung der magnetischen Nei- gung (Hanssen)	85
Maß der Intensität des Erdmagnetismus (Palfen, Mosser und Rieß)	86
Erdmagnetismus im Allgemeinen (Kupffer)	89
Gestalt der isogonischen, isoklinischen und isodynischen Linien im J. 1839 (Erman, Hanssen)	90
Allgemeine Betrachtungen über die isogonischen, isoklinischen und isody- nischen Linien (Erman)	96

Inhaltsverzeichnis.

v

	Seite
Veränderung in der Lage des magnetischen Aequators und der magnetischen Pole (Dupuyrey u.)	97
Combinirte Betrachtung der Inclination und Declination (Eggen)	98
Zusammenhang der isodynamischen Linien mit dem Streichen von Erdschichten (Necker)	99
Gang der täglichen Variation in der Declination auf der nördlichen Hemisphäre (Humboldt u.)	100
Tägliche Variation der Declination unter den Tropen (Boussingault)	103
Zusammenhang der täglichen Variation der Declination mit der Breitung (Farquharson)	104
Gang der Variation der Declination für längere Perioden (Hansen)	104
Tägliche Veränderung der Inclination (Krago)	106
Veränderung der Inclination in längeren Perioden (Hansen, Humboldt)	107
Inclination in Tiefen unter der Erde (Humboldt)	114
Gang der täglichen und jährlichen Änderung der horizontalen Intensität (Mosser und Rieß, Reich)	114
Veränderung der Intensität in längeren Perioden (Hansen)	114
Abnahme der Intensität mit der Höhe über der Erdoberfläche (Kupffer)	115
Einfluß der Nordlichter auf die Magnethabel	116
Einfluß von Erdbeben auf die Magnethabel (Erman)	119
X. Atmosphärische Lichterscheinungen.	
Zur Theorie des Regenbogens (Köcher)	119
Erklärung der Hölle und Ringe um leuchtende Körper (Mosser)	122
Verschiedene das Nordlicht betreffende Umstände (Richardson, Hansen, Farquharson, Dove, Field)	124
Nordlicht vom 7. Januar 1831	125
Zusammenhang des Nordlichtes mit Sternschnuppen	126
XI. Temperaturverhältnisse.	
Veränderungen der urweltlichen Temperatur (Cuvier, Humboldt)	127
Gleichbleiben der mittlern Temperatur in längern Perioden (Lilje)	128
Maximum und Minimum der täglichen Temperatur (Meermann)	128
Zeit der jährlichen mittlern Temperaturen und Temperaturextreme (Kämp)	129
Methode, den Gang der Temperatur im Jahre zu berechnen (Kämp)	130
Quellen- oder Bodentemperatur im Allgemeinen (Kupffer)	135
Gleichung für die Abhängigkeit der Quelltemperatur von der geographischen Breite (Kupffer, Brewster)	136
Temperaturabnahme mit der Höhe (Gurin, Kupffer)	139
Temperatur im Innern der Erde	141
Temperatur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen (Benz)	141
Bildung des Grundsees	142
Einfluß der Windrichtung auf die mittlere Temperatur (Dove)	144
Theorem in Bezug auf die isothermischen Linien (Cauchy)	144

Literatur der kosmischen, physikalisch-tellurischen und meteorologischen Beobachtungen, die seit Anfang des Jahres 1829 erschienen sind.

I. Kosmische Verhältnisse	146
II. Physikalische Geographie und Geologie	147
III. Allgemeine meteorologische Verhältnisse	153
IV. Zustand. (Barometer)	155
V. Hygrometeorologie	157
VI. Verschiedene Bestandtheile der Atmosphäre	159
VII. Wind	159
VIII. Atmosphärische und tellurische Electricität	159
IX. Erdmagnetismus	160
X. Atmosphärische Lichterscheinungen	162
XI. Temperaturverhältnisse	164

Literatur neuerer Abhandlungen über Gegenstände der mathematischen Physik und Mechanik	166
----------------------------------------------------------------------------------------	-----

Verzeichniß der in- und ausländischen Schriften, welche seit 1829 über Physik, Mechanik und Meteorologie erschienen sind	203
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Literatur der Abhandlungen, welche wegen zu spätem Erscheinens in dieser Lieferung des Repertoriums nicht haben aufgenommen werden können	217
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Sachregister	227
--------------	-----

Namenregister	243
---------------	-----

Zehnter Abschnitt.

Allgemeine kosmische, tellurische und meteorologische Verhältnisse.

I. Vom Planetenraume.

Über die Dichtigkeit des Äthers im Planetenraume, von Walz *).

Bekanntlich ist die Verzögerung, welche der sogenannte Encke'sche Komet von kurzer Periode in seiner Bahn erfahren hat, von Encke selbst einem Widerstande des im Planetenraume vorhandenen Äthers beigemessen worden. Walz hat in einem andern Phänomen desselben Kometen bei seinem Erscheinen im Jahre 1828 eine neue Veranlassung gefunden, die Existenz eines solchen Äthers für wahrscheinlich zu erklären. Dieser Komet zeigte nämlich eine mit der Annäherung an die Sonne zunehmende Verkleinerung seines Volumens, welche Walz auf Rechnung des vermehrten Druckes schreibt, welchen die Masse des Kometen durch die in der Sonnennähe vermehrte Dichtigkeit des Äthers erfährt.

In der That, wenn man die Data zu Grunde legt, 1) daß die Dichtigkeit des Äthers in verschiedenen Abständen von der Sonne sich wie der Druck des Äthers multiplicirt mit der Schwerkraft in diesem Abstande verhalte; 2) daß die Schwerkraft sich umgekehrt wie das Quadrat des Abstandes verhält; 3) daß die Volumenänderungen des Kometen (der sich als eine Art gasförmiger Masse von höchst geringer Dichtigkeit scheint betrachten zu lassen) im umgekehrten Verhältnisse der Dichtigkeitsänderungen des Äthers stehen; 4) daß die Temperaturänderungen, welche der veränderte Abstand des Kometen von der Sonne mit sich bringt, auf ihn nicht in

*) Bibl. univ. 1830. Jun. p. 113; Oct. 125.

Rechnung gezogen zu werden brauchen; 5) daß kein Verlust an Masse des Kometen Statt fand, und wenn man nach diesen (zum Theil sehr prechren) Voraussetzungen die Durchmesser berechnet *), welche der Komet in verschiedenen Entfernungen von der Sonne zufolge seiner Dichtigkeitsänderungen erlangen mußte, so erhält man eine sehr gute Übereinstimmung der berechneten mit den beobachteten Werthen, wie aus folgender Zusammenstellung erhellt:

Epochen.	Radius vector; den mittlern Radius vector = 1 gesetzt.	Horizontalparallaxe.	Beobachteter scheinbarer Durchmesser.	Berechneter scheinbarer Durchmesser.	Wahrer Durchmesser in Erdradien.
Aphehium des Kometen	4,103				271,42
16. Sept. 1828	1,9708	7",83	.	16',68	129,98
18. Oct. —	1,5930	13 ,86	.	20 ,41	92,89
28. — —	1,4617	15 ,23	20' Balg	20 ,8	79,36
7. Nov. —	1,3217	16 ,66	18 Struwe	18	64,82
30. — —	0,9668	17 ,96	9 dgl.	8 ,56	29,85
7. Dec. —	0,8473	18 ,12	6 dgl.	6	19,87
14. — —	0,7285	18 ,12	3,30 dgl.	3 ,25	11,30
24. — —	0,5419	17 ,12	1 Balg	0 ,53	3,10
Perihelium des Kometen	0,3454				0,165

(Die scheinbaren Durchmesser sind durch Multiplication der wahren Durchmesser mit der Horizontalparallaxe gefunden).

*) Die Formel, zu der man geführt wird, ist folgende: Es seien δ , δ' , δ'' die den Abständen r , r' , r'' von der Sonne entsprechenden Durchmesser des Kometen, so hat man:

$$\left(\frac{\delta'}{\delta}\right)^3 r \cdot (r' - r'') = \left(\frac{\delta''}{\delta}\right)^3 r'' \cdot (r' - r)$$

oder, für die Berechnung bequemer:

$$\log \delta = \log \delta' + \frac{r' - r}{r' - r''} \cdot \frac{r''}{r} \log \frac{\delta''}{\delta'}$$

Die letzte Formel, welche aus den in zwei verschiedenen Abständen r' , r'' beobachteten Durchmessern δ' , δ'' des Kometen die bei den übrigen Abständen r Statt findenden δ zu berechnen dient, ist vom Verfasser zur Berechnung der Werthe in obiger Tabelle angewandt worden, indem er die Beobachtungen vom 7. Nov. und 7. Dec. zu Grunde legte, welches giebt, wenn man den mittlern Radius vector der Erde als Einheit setzt:

$$\log \delta = 2,72911 - \frac{1,21246}{r}$$

Zur Bestimmung der Dichtigkeiten des Äthers für verschiedene Entfernungen von der Sonne, wie sie sich durch dieselbe Berechnungsweise nach den für den erwähnten Kometen gefundenen Daten ergeben, hat Valz folgende Tabelle beigefügt. Die dritte Spalte darin enthält die Durchmesser, die ein hypothetischer Komet, dessen Volumen bei der mittlern Erdferne dem Volumen der Erde gleich wäre, in verschiedenen Abständen von der Sonne haben würde, und die Dichtigkeiten des Äthers in denselben Abständen sind den Cuben dieser Durchmesser umgekehrt proportional.

	Abstände von der Sonne, in mittlern Erdfernen.	Durchmesser des hypothetischen Kometen in Erddurchmessern.
Perihellium des Merkur	0,3075	0,00186
Apohellium desselben	0,4667	0,04116
Venus	0,7233	0,34368
Erde	1	1
Mars	1,5237	2,611
Ceres	2,7672	5,947
Jupiter	5,2028	9,533
Saturn	9,5388	12,173
Uranus	19,1833	14,102
Apohellium des Kometen von 76 Jahren	35,3818	15,073
Desgl. von 354 —	100	15,863
Desgl. von 11180 —	1000	16,266
Desgl. von 853558 —	10000	16,307
Desgl. von 11180210 —	100000, Parall. 2° u. Unenbliche	16,312

Es erhellt nach dieser Tabelle, daß die Dichtigkeit des Äthers zwar in großer Nähe an der Sonne sehr schnell mit der Nähe zunimmt, in großen Abständen dagegen nur sehr langsam mit der Entfernung abnimmt, und sich einer constanten Gränze immer mehr nähert, die sie in sehr großen Entfernungen merklich, und im Unendlichen völlig erreicht.

Anderer Bestätigungen seiner Ansicht und Rechnungsweise findet Valz in Beobachtungen, welche Hevelius über den Kometen von 1652, und Gysat über den von 1618 aufgeführt hat; doch bemerkt er selbst, daß die Beobachtungen von Hevelius nur bis zu gewissen Gränzen der Verkleinerung des Cometen mit der Rechnung merklich übereinstimmen, dagegen diese Übereinstimmung sich bei den Durchmessern des Cometen von 4' bis 5' nicht mehr zeigt, wovon er den Grund in der Schwierigkeit der Schätzung so kleiner Durchmesser oder auch in einer eingetretenen Zustandsänderung des Cometen sucht. Auch die Beobachtungen von Gysat schließen sich nicht

Dichtigkeit des Äthers.

ganz genau an die berechneten Resultate an, was der Verfasser, den zu jener Zeit noch sehr unvollkommenen Beobachtungsmitteln beimgist. Wir wollen jedenfalls seine Zusammenstellung der beobachteten mit den berechneten Werthen hier hinzufügen, die jedoch Walz in Bezug auf Hevelius Beobachtungen nur in so weit mitgetheilt hat, als sie mit der Rechnung nahe übereinstimmen *).

Hevelius's Beobachtungen.

Epochen.	Radius vector.	Abstand von der Erde.	Beobachteter scheinbarer Durchmesser.	Berechneter scheinbarer Durchmesser.	Wahrer Durchmesser in Erdradien.
20. Dec. 1652	1,0946	0,1323	34'	34' 59"	31,33
23. — —	1,1283	0,1715	28	29 4	33,50
26. — —	1,1631	0,2341	24	22 55	39,20
29. — —	1,1988	0,3058	18	18 51	38,40

Gysar's Beobachtungen.

Epochen.	Radius vector.	Abstand von der Erde.	Beobachteter scheinbarer Durchmesser.	Berechneter scheinbarer Durchmesser.	Wahrer Durchmesser in Erdradien.
1. Dec. 1618	0,7080	0,3693	8"	5' 10"	20,61
8. — —	0,8443	0,3597	10	10 3	25,10
17. — —	1,0171	0,4087	13	15 30	37,06
20. — —	1,0739	0,4356	14	16 50	42,54
24. — —	1,1482	0,4775	16	18 10	53,30

Walz hat auch Bestimmungen über die absolute Dichtigkeit und den absoluten Druck des Äthers in verschiedenen Abständen von der Sonne zu geben versucht. Wir verweisen hierüber auf die Originalabhandlung, da dergleichen Bestimmungen sich auf zu hypothetische Basen stützen müssen, als daß sie einige Zuverlässigkeit erlangen könnten, so wie auch die ganze vorige Darstellung mir noch sehr problematisch erscheint. Die Entstehung des Kometenschweifes leitet Walz von Dämpfen ab, die sich vom Kometen aus entwickeln, und vermöge größerer Dünne als der Äther nach der von der Sonne abgekehrten Richtung (wo der Äther ebenfalls dünner ist, als nach der Sonne zu) fortgehen. Er fügt Berechnungen hinzu, um die Trichtigkeit dieser Vorstellung zu erweisen.

*) Es will mir freilich bedanken, daß man solche, bloß halb zur Rechnung stimmende, Beobachtungen ebenso gut gegen als für die Trichtigkeit derselben anführen könnte.

über die Temperatur des Planetenraumes.

Fourier ist durch seine Untersuchungen über die Wärme zu der Annahme geführt worden, daß die Temperatur des Planetenraumes -50°C . sei, und es ist bemerkenswerth, daß neuerdings Swanberg von ganz anderen Betrachtungen aus zu merklich demselben Resultate gelangt ist. Er drückt die Temperatur der Atmosphäre für beliebige Höhen mittelst einer Formel aus, welche zwei Constanten enthält, deren eine, welche zugleich eine Function der Zeit ist, stets durch die unmittelbare Beobachtung der entsprechenden Temperatur auf der Erdoberfläche gegeben ist, während die andere, die sich nicht mit der Zeit ändert, die Temperatur des Planetenraumes ist **), die sich sonach bestimmen lassen wird, wenn man die Temperatur gleichzeitig an der Erdoberfläche und in einem Punkte von sehr großer Höhe über der Erdoberfläche kennt. Bei zu Grundelegung des von Gay-Lussac bei seiner Luftfahrt gefundenen Datums nun findet Swanberg nach seiner Formel für die Temperatur des Planetenraumes $-49^{\circ}.85\text{C}$. Von einer andern Betrachtung ausgehend ***)) ergibt sich ihm $50^{\circ}.35\text{C}$., welche beide Bestimmungen, wie man sieht, fast ganz mit der von Fourier zusammenfallen. Da übrigens die genaue Begründung der Formel und die danach geführte Berechnung bis jetzt nicht mitgetheilt ist, so läßt sich nicht angeben, wie viel Zutrauen man diesen Bestimmungen zu schenken hat.

Auch muß bemerkt werden, daß, wenn man von den mehrjährigen Beobachtungen über die Temperaturabnahme mit der Höhe, welche auf dem St. Bernhard angestellt worden sind, ausgeht, sich nach Walz †) nur -45°C . für die Temperatur des Planetenraumes zu ergeben scheint; doch kann ein von der Temperatur der Luft eines Berges entlehntes Resultat schwerlich auf die Temperatur der freien Atmosphäre eine Anwendung finden.

Resultate einer Luftfahrt ††).

X. Forster stieg am 30. April 1831 bei 29,29 (engl.?) Zoll Bar. und 65°F . Temperatur zu Moulsham bei Chelmsford mit einem, mit Kohlenwasserstoff gefüllten, Ballon bis über 6000 Fuß Höhe auf. Die ganze Luftfahrt dauerte nicht völlig eine Stunde. Resultate, die uns unter den Beobachtungen, die er hiebei machte, interessiren können, sind folgende:

*) Bibl. univ. 1830. Avril. p. 367.

**) Diese Formel ist nicht mitgetheilt.

***)) Von dem Datum Lambert's über die Absorption, welche das Licht erfährt, welches vom Zenith einfallend die ganze Atmosphäre durchläuft, und unter der Annahme, daß das Differenzial der Temperaturzunahme der Portion des absorbirten Lichtes stets proportional ist.

†) Bibl. univ. 1830. Juin. p. 127.

††) Bibl. univ. 1831. Août. p. 437.

Einfluß des Mondes auf die Witterung.

1) Der Ballon drehte sich bei seinem langsamen Aufsteigen in derselben Richtung als die Erde und Planeten bei ihrer Umdrehung, d. h. von Rechts nach Links *); doch war diese Bewegung so sanft, daß sie nur durch Beobachtung der Gegenstände auf der Erde merklich wurde. Beim Wiederherabsteigen oscillirte der Ballon in derselben Richtung.

2) Der Ballon, der sich bei einem schwachen und veränderlichen Winde erhoben hatte, wurde in einer gewissen Höhe, in fast umgekehrter Richtung als er erst gehabt, südöstlich gerieben, in größerer Höhe änderte der Luftstrom wieder seine Richtung und in 6000 Fuß Höhe war die Luft ganz still. Am andern Tage traten diese Luftströme in derselben Folge, als Forster in sie gelangt war, auf der Erdoberfläche ein, so daß z. B. zuerst der Südostwind erschien, welcher Regen brachte. überhaupt glaubt Forster nach wiederholten Beobachtungen schließen zu dürfen, daß es sich so mit den Luftströmen in den oberen Regionen der Atmosphäre verhält.

3) Die Wolken, welche man mit dem Namen Cirro cumulus bezeichnet, befinden sich oberhalb des Punctes, bis zu welchem Ballons gelangen können, indem sie von der größten erreichbaren Höhe gesehen noch ebenso hoch über den gewöhnlichen Wolken sind, als sie unten über der Erde zu sein scheinen.

II. Allgemeine Witterungsverhältnisse.

über den Einfluß des Mondes auf die Witterung.

Wiewohl unter dem Volke der Glaube an einen Einfluß des Mondes auf die Witterung allgemein ist, so konnte doch ohne Vergleichung zuverlässiger Beobachtungen hierüber sich kein sicheres Urtheil über die Richtigkeit und Art dieses Einflusses fällen lassen. Nun haben zwar schon verschiedene ältere Naturforscher, wie Hanow, Loalbo, Pilgram, Lamark, Haberte einen Einfluß des Mondes auf unsere Atmosphäre nachzuweisen gesucht, indeß blieb doch dieser Gegenstand bis auf die neueste Zeit sehr zweifelhaft. Erst jetzt scheint es durch die neuesten übereinstimmenden Resultate von Glauguergues, Pallaschka und Siber über den Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen und die sich hieran anschließenden Resultate Schüller's und einiger anderer über den Einfluß desselben auf die Menge wässeriger Niederschläge aus der Atmosphäre, heiterer und trüber Tage und mehrerer anderer Witterungsverhältnisse außer Zweifel gesetzt zu sein, daß der Mond wirklich auf diese Umstände einen Einfluß äußere, wiewohl derselbe verhältnißmäßig nicht sehr stark ist und

*) Unkrenitig vermöge einer zufälligen Richtung des anfänglichen Impulses.
F.

nur durch ein Mittel so vieler Beobachtungen, daß sich der viel wichtigere Einfluß anderer Ursachen, welche auf die Witterung von Einfluß sind, darin merklich compensirt, wahrnehmbar gemacht werden kann, daher auch der Stand oder die Phase des Mondes allein nur eine geringe Wahrscheinlichkeit des Eintretens dieser oder jener Witterung oder dieses oder jenes Barometerstandes bedingen kann.

So ereigneten sich nach Schöbler's Berechnung 28jähriger Beobachtungen auf 100 Tage des Zusammentreffens der, die wässerigen Niederschläge am meisten begünstigenden, Punkte des synodischen und anomalistischen Umlaufes 67 Mal Niederschläge, und 43 Mal erfolgten diese nicht, und umgekehrt erfolgten beim Zusammentreffen der, die Aufhellung am Meisten begünstigenden, Verhältnisse 64 bis 66 Mal keine Niederschläge, während dennoch an diesen Tagen 34 bis 36 Mal Niederschläge erfolgten.

Man könnte daher auch noch in Zweifel sein, ob dieser in 28jährigen Beobachtungen sichtbare Einfluß nicht doch durch ein Mittel aus noch mehreren Beobachtungen verschwinden würde, wenn nicht die bemerkenswerthe Einscißung der Resultate der verschiedenen Beobachter unter einander diesen Einfluß vollständig bewiese. Es mögen in dieser Hinsicht folgende, von Schöbler *) mitgetheilte, Zusammenstellungen hier Platz finden:

Es verhält sich die Zahl der Witterungsänderungen zur Zeit des Vollmondes zu der Zahl derselben zur Zeit des letzten Viertels:

nach Gronau (100jährige Beobachtungen)	= 100 : 83,7
- nach Loalbo (50j. Beob.)	= 100 : 86,2
nach Schöbler (28j. Beob.)	= 100 : 80,2
nach Glauguergues (20j. Beob.)	= 100 : 79,2

Mittel = 100 : 82,3

Ferner verhält sich die Zahl der Witterungsveränderungen zur Zeit der Syzygien zu der Zahl derselben bei den Quadraturen

nach Gronau	= 100 : 86,4
nach Loalbo	= 100 : 84,9
nach Pilgram (25jähr. Beob.)	= 100 : 90,9
nach Glauguergues	= 100 : 88,2
nach Schöbler	= 100 : 92,2

Mittel = 100 : 88,5

Die nahe Übereinstimmung dieser Resultate ist um so bemerkenswerther, da die Beobachtungen, auf denen sie beruhen, in sehr verschiedenen Gegenden angestellt worden sind. Eine nicht minder gute Übereinstimmung zeigen die, für den Einfluß des Mondes auf den Barometerstand von verschiedenen Beobachtern erhaltenen Resultate, wie in dem vom Barometerstande handelnden Kapitel näher angeführt werden wird.

Den größten Einfluß äußert nach Übereinstimmung der Untersuchungen

*) Kohn. Arch. für Met. IV. 17. 162. ff.

von Flauguergues und Schöbler, die Stellung des Mondes in seinem synodischen Umlaufe; aber auch die Entfernung des Mondes von der Erde und die Declination desselben scheinen nicht ohne Einfluß darauf zu sein.

Daß die näheren Bestimmungen dieses Einflusses anlangt, so sind allerdings noch länger fortgesetzte und mehr Beobachtungsreihen erforderlich, um etwas Genaueres hierüber festzusetzen, als bisher vorhanden oder in Rechnung gezogen sind; indeß ergeben sich doch schon aus Schöbler's Berechnung 28jähriger Beobachtungen, und Flauguergues Berechnung 20jähriger Beobachtungen manche Puncte mit ziemlicher Zuverlässigkeit, und in anderen Hinsichten sind wenigstens Andeutungen gewonnen, die der Prüfung durch fernere Beobachtungen vorliegen. Wir werden das in dieser Hinsicht bis jetzt Gefundene in dem Kapitel vom Barometerstande, den wässerigen Niederschlägen und den Winden mittheilen.

Von dem Einfluß des Mondes auf die Witterung abhängt, muß zur Zeit noch für unbekannt angesehen werden. Nach den Berechnungen von Laplace und Bouvard scheint die Attraction des Mondes hierbei zeigen in Betracht kommenden Einfluß äußern zu können, wie denn auch mehrere der von Schöbler aufgefundenen Bestimmungen, z. B. daß der Vollmond sich stärker und bestimmter auf die Atmosphäre einwirkend zeigt, als der Neumond, und Anderes hieraus nicht erklärbar sein würde; man möchte es daher für das Wahrscheinlichste halten, daß der Lichteinfluß des Mondes hierbei eine Rolle spielt, wenn gleich bei den fast unmerklichen physikalischen Wirkungen, die wir vom Mondlichte kennen, diese Annahme ebenfalls bis jetzt mehr einer Erklärung bedürfen, als einer Erklärung ähnlich sehen würde.

Vom Einflusse der Erdbeben auf die meteorologischen Erscheinungen.

Die Annahme, daß die Erdbeben einen Einfluß besonderer Art auf die Atmosphäre äußern, der sich durch ungewöhnliche Erscheinungen in derselben kund gebe, ist wenigstens unter dem Volke, und zwar selbst in den Ländern, wo Erdbeben am häufigsten vorkommen, ziemlich allgemein. Es mußte daher interessant sein, diese Annahme durch Vergleichung einer hinreichenden Anzahl beobachteter Erdbebenfälle genau zu prüfen. Dies ist von Hoffmann *) geschehen, welcher zu diesem Zwecke das auf der Sternwarte zu Palermo geführte meteorologische Journal benutzte, in welchem vom J. 1792 bis 31. Sept. 1831 57 Erdbeben, die dort verspürt wurden, nebst den gleichzeitigen meteorologischen Zuständen aufgezeichnet sind. Da dieses Journal überhaupt regelmäßige Register des Barometerstandes und der übrigen meteorologischen Erscheinungen enthält, so war es solchergestalt möglich, die zur Zeit der Erdbeben beobachteten Erscheinungen mit denen,

*) Pogg. XXIV. 48.

die sonst im Mittel in Palermo beobachtet werden, zu vergleichen, und zu sehen, ob sich jene wirklich ungewöhnlich verhalten.

Das Resultat dieser Vergleichung, zu der in der Originalabhandlung tabellarische Belege vorliegen, ist indeß ein negatives. Der Verfasser sagt in diesem Bezuge:

„Vergebens habe ich bei den zu Rathe gezogenen 57 genauer beobachteten Erdbebenfällen gesucht, irgend eine Witterungserscheinung aufzufinden, welche sich mit denselben möglicherweise hätte in irgend eine wahrscheintliche Verbindung bringen lassen. Die Erdstöße erscheinen hier bei heiterem oder bedecktem Himmel, bei kaltem oder heißem Wetter, vor oder nach Regen und mit oder ohne ihn. Ja selbst die Stärke oder Richtung des Windes scheint vom Auftreten derselben vollkommen unabhängig, und dies ist zugleich auch die Meinung aller unterrichteten Personen, welche Gelegenheit hatten, in verschiedenen Theilen der Insel das Vorkommen von Erdstößen zu beobachten. Zwar scheint dies zu Palermo bei vorübergehender erster Ansicht der hier eben betrachteten Erdbebenfälle nicht ganz zuzutreffen, denn von 57 sehen wir 17 bei Nordost und 15 bei Südwestwind, mithin fast die Hälfte von allen bei diesen beiden angegeben, doch vermindert sich das Auffallende dieser Erscheinung, wenn wir berücksichtigen, daß gerade dies auch, vermöge der Lage von Palermo, die Richtung des hier bereits äußerst fühlbaren Wechsels von den wenigstens sechs Monate im Jahre hindurch wehenden Land- und Seewinden sei, welche sehr leicht in den niedrigeren Luftschichten über die im Allgemeinen durchstreifenden Winde die Oberhand gewinnen. Die letzteren insbesondere sind immer vorwaltend Nordost (s. Scinà Topografia di Palermo, p. 137), die erstere theils Südwest, theils westlich.“

Auch zum Barometerstande ergab sich aus der angestellten Vergleichung keine bestimmte Beziehung der Erdbeben. Gewöhnlich glaubt man, daß die Erdbeben einen niedrigeren Barometerstand hervorriefen; allein die Vergleichung lehrte, daß die Barometerstände sich in 31 Fällen über dem (aus 34jährigen Barometerbeobachtungen zu Palermo geschlossenen) Mittel desselben Monats, in 24 Fällen darunter, und in zweien gerade auf demselben befanden; von dem Mittelstande des Jahres aber wären die Barometerstände in 32 Fällen ins + und in 25 Fällen ins — abweichend. Es stand also das Barometer häufiger vielmehr über als unter dem Mittel. Was die Größe der Abweichungen vom Mittel anlangt, so erreichten diese bei den Erdbeben in den angegebenen 40 Jahren weder über noch unter dem Mittel jemals die Gränzen, welche in Mitteljahren ohne außerordentliche äußere Einflüsse vorzukommen pflegen, ja sie blieben in den meisten Fällen noch immer ansehnlich und sehr oft um mehr als die Hälfte des ganzen Werthes von diesen Gränzen entfernt.

III. Vom Barometerstande.

über den Barometerstand im Niveau des Meeres unter verschiedenen Breiten und Längen.

Gegen früheren, von Munde (Gehler's Wörterb. I. 914) gezogenen, Folgerungen findet Erman d. J. *) durch Benützung theils eigener, auf seiner Reise durch das asiatische Rußland gemachter, theils mehrerer zuverlässiger fremder Beobachtungen auf offenem Meere oder an Küstenorten, folgendes Resultat.

Der mittlere Luftdruck im Niveau des Meeres ist gleichzeitig abhängig von der Länge und von der Breite des Beobachtungsortes, kann daher nicht als eine Function der Breite allein angesehen werden. Auf demselben Meridiane aber nimmt er nicht zu, sondern vielmehr ab mit wachsender Breite.

In den Passatzen (die hauptsächlich vom Verfasser in Bezug auf den Einfluß der Länge untersucht wurden) findet ein Maximum des Luftdruckes unter den Ägäischen Meridianen Statt, und von dort aus werden sowohl gegen Osten als gegen Westen abnehmende Barometerstände gefunden, bis man ein Minimum des Luftdruckes auf den kamschatischen Meridianen erreicht. — Unter 40° nördlicher Breite scheint dieselbe Ordnung der Meridiane in Bezug auf die Größe des Luftdruckes Statt zu finden.

Die Beobachtungen, die zu Gunsten dieser Ansicht sprechen, scheinen jedoch genug, um dieselbe als begründet erscheinen zu lassen, sind aber doch noch zu vereinzelt, um leicht übersichtliche und direct vergleichbare Mittel zu gewähren; daher ich es vorziehe, hinsichtlich derselben auf die Originalabhandlung zu verweisen. Besonders merkwürdig und ganz in Übereinstimmung mit Erman's Ansichten ist der so äußerst niedrige Barometerstand an der Westküste von Kamschatka, wo er (unter 52° bis 58° nördlicher Breite) nur zwischen 330 und 332 Par. Lin. beträgt.

Der in Biot I. 217 angegebene theoretische Grund für eine Abnahme des Barometerstandes von den Polen nach dem Äquator zu kann deshalb kein Gewicht haben, weil, wenn gleich die Schwere der Luft von den Polen nach dem Äquator wirklich abnimmt, doch dies zugleich mit dem Quecksilber, welches den von jener Schwere abhängigen Druck mißt, der Fall ist, was macht, daß eine verhältnißmäßig höhere Quecksilbersäule am Äquator, als an den Polen erfordert wird, um einem gleichen Drucke das Gleichgewicht zu halten.

Dagegen macht Riese **) für die Annahme, daß der Barometerstand vom Äquator nach den Polen zu abnehme, folgende indirecte Schlussfolge

*) Pogg. XXIII. 121.

**) Pogg. XVIII. 127.

der G.
höhen
und
Wär-
weiten

(?) **)
je Wet-
selbe †)

mannt
deutet
treffen
Binter

und
Wet-
ist für
Jah-
Octo-

legi-
die
330
er

ist
n-
n-
n-
e
-

Barometerstand im Niveau des Meeres.

Der Barometerstand zur Unterstützung der Erman'schen Erörterungen.

Wenn man sich zusammen der Druck der Luft am Äquator und an den Polen vergleicht, so müßten unausweichlich Luftströme in höherer Luftschicht zwischen beiden Statt finden. Von diesen, und besonders von der Abnahme des Druckes nach dem Äquator hin zeigten die Beobachtungen, oder höchstens zwischen den Tropen einige Spuren, was man im Allgemeinen auf einen gleichen Druck der Luft an der Äquatorfläche schließen muß. Findet nun diese Gleichheit in der That wirklich im Mittel Statt, so muß der mittlere Barometerstand in der That von den Polen nach dem Äquator hin abnehmen, weil offenbar die, derselben Gleichheit der Luftdrucke, Querschnittsfläche so viel höher sein muß, als der Querschnitt der Barometerstand abnimmt. Dies als richtig vorausgesetzt, so ist der Barometerstand unter dem Äquator zu dividiren, mit dem Barometerstand unter irgend einer Breite zu erhalten **).

Die Beobachtungen scheinen indes größere, von der Breite abhängige Abweichungen zu zeigen, als daß sie bloß durch diese Betrachtungen erklärt werden könnten (vgl. die Erman'sche Abhandlung).

Barometerstand im Niveau der Nord- und Ostsee.

Der mittlere Barometerstand unter ungefähr 54° 40' nördlicher Breite ergab sich:

Im Niveau der Ostsee = 336,987 Par. Lin.

Im Niveau der Nordsee = 337,093 Par. Lin.

Der Mittelwert findet man (siehe ***) durch Erörterung nachfolgender Beobachtungen. Vom Professor Streblitz im Jahre 1827 und 1828 in

der That als bloße Spuren eines solchen allgemeinen Luftstromes kann man sich, wenn man von Polarströmen abgeleiteten allgemeinen Ostwind zu bedenken hat, nicht halten, da außerdem solche Polarströme gar nicht oder doch nur an ganz einzelnen Stellen factisch nachgewiesen sind, und zur Beweiskraft gar nicht ausreichen. Die Luftströme von ziemlich niedrigen Breiten ausgehen zu sein, scheint um so wahrscheinlicher wird, als bekanntlich in dem atlantischen und hohen Ocean unter mittleren und etwas nördlichen Breiten die westliche und im nördlichen Ocean die südwestlichen Winde, welche sämmtlich auf Strömungen vom Äquator her, folglich jenen Strömen von den Polen entgegenstehen, vorherrschen.

**) Es sei B der mittlere Barometerstand unter dem Äquator, b der unter der Breite φ , k ein konstanter Coefficient, nach Laplace = 0,0058931, nach Bessel = 0,0051990; nach Schmidt = 0,00520063; so hat man:

$$b = \frac{B}{1 + k \sin^2 \varphi^2}$$

*** Pogg. XVIII. 120.

Gang der monatlichen mittleren Barometeränderungen. 13

ig; unter Bessel's Leitung in denselben Jahren in Königsberg; Pfarrer Sommer 1815 bis 1822 ebendasselbst; vom Dr. Reuber bis 1827 zu Krenrode (im Herzogthum Schleswig) angestellt.

ig der monatlichen mittleren Barometerveränderungen, von Leopold von Buch *).

das für höhere Breiten wenigstens zum Theil geltende Resultat, daß mittleren monatlichen Barometerhöhen daselbst vom Winter zum Sommer nehmen, ist nicht allgemein; vielmehr hat Leopold von Buch Vergleichung vieler Beobachtungen unter verschiedenen Breiten gefunden, daß es in jeder Halbkugel eine Zone giebt, welche er die subtropische Zone nennt**), in der umgekehrt die mittleren Barometerhöhen der Monate vom Winter gegen den Sommer abnehmen, und zwar regelmäßig, und um so mehr, je weiter sie sich (innerhalb dieser vom Äquator entfernen, was mit der Natur der in dieser Zone je im Jahreszeiten herrschenden Winde zusammenzuhängen scheint, worüber auch mehrere Erörterungen beifügt.

Die Gränzen der subtropischen Zonen gegen den Äquator hin werden auch durch die Gränzen der tropischen Regen bestimmt, die Gränzen die Pole durch die Gränzen, von wo an keine regelmäßige Bewegung der monatlichen mittleren Barometerstände mehr Statt findet. Nördlich bestimmt Buch diese Gränzen folgendermaßen: in der nördlichen Halbkugel fällt die südliche Gränze der subtropischen Zone nördlich von den Capverdischen Inseln, ungefähr auf den 20. Grad Breite; im Innern von Africa noch etwas südlicher; die nördliche ist über Cairo zu setzen, doch nicht ganz bis Algier, daher in den Grad der Breite. In der südlichen Halbkugel geht diese Gränze weiter gegen den Pol, doch wie es scheint nicht viel weiter als 33°. Buch führt in einer Tabelle die monatlichen Mittel von 19 Orten an, welchen folgende in die subtropischen Zonen gehören, insofern bei sie monatlichen Mittel regelmäßig vom Winter zum Sommer abnehmen:

Shavannah	(23° 8' N. B.);
Natchez Mississippi	(31° 20' N. B.);
Seringapatam . . .	(12° 20' N. B.);
Bangalore	(12° 55' N. B.);
Madras	(13° 5' N. B.);
Calcutta	(22° 40' N. B.);
Benares	(25° 18' N. B.);
Rhatmandu	(27° 42' N. B.);
Macao	(22° 50' N. B.);
Cairo	(30° 2' N. B.).

Pogg. XV. 355.

) In der nördlichen Hemisphäre wird diese gewissermaßen dadurch charakterisiert, daß in ihr vorzugsweise der Dattelpalme gebührt.

Nach der telegraphischen Zone hinaus findet dieser Gang nicht statt, sondern ist, gleichsam in scharfem Abschnitt, verschwunden. In London (29° 5' N. M.), Gahr, Afrika finden die tiefsten in diesen nicht mehr im Sommer Statt, noch weniger an Orten von geographischer Breite.

Nach allgemeinen Resultate in Bezug auf den Gang der monatlichen Schwankungen unter verschiedenen Breiten stellt Dove *), in Prüfung der bestehenden Untersuchungen Bach's auf, nämlich folg-

1) In der kalten Zone sinkt das Barometer von den kälteren Monaten nach den wärmeren hin und steigt mit abnehmender Wärme entsprechend den höchsten und niedrigsten barometrischen monatlichen in den wärmsten Monaten, als am Äquator. Es nimmt ab gegen die kalten Wintermonate.

2) In der gemäßigten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

3) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

4) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

5) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

6) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

7) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

8) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

9) In der kalten Zone sinkt das Barometer in den wärmsten Monaten, als im Sommer. Der Maximum des höchsten und niedrigsten Monats kommt zu dem Zeit der kalten Wintermonate.

besteht also aus zwei Theilen besteht, deren einer durch die trockene Luft, der andere durch die Wasserdämpfe getragen wird, so erhält leicht, daß, je mit steigender Wärme sich die Dichtigkeit der Luft mindert, während die Verdampfung steigt, die täglichen Barometerveränderungen mit dem täglichen Temperaturwechsel nicht in einem leicht übersichtlichen Zusammenhang stehen werden. So lange wir nämlich nicht das quantitative Verhältniß beider, gleichzeitig in entgegengesetztem Sinne Statt findender, Veränderungen kennen, läßt sich nicht einmal bestimmen, ob der Gesamtdruck mit einem Wachsen der Wärme zu- oder abnehmen wird, ob nicht vielleicht in einem Theile des Tages das Übergewicht auf Seiten der einen Veränderung ist, den übrigen Theil des Tages auf Seiten der andern. Es ist daher klar, daß nur durch das gleichzeitige Beobachten des Barometers und Hygrometers ein Verständniß der täglichen Veränderungen zu erwarten ist.

Mit Rücksicht auf diese Betrachtungen hat Dove in einer sehr wichtigen Abhandlung die Trennung des Ganges, den der Druck der trockenen Luft und den der Druck des in der Atmosphäre vorhandenen Wasserdampfes zeigt, versucht, hiebei die Beobachtungen zu Grunde legend, welche Dr. Reuber in Kopenhagen vom Juni 1824 bis (incl.) Mai 1825 angestellt und im ersten Bande der *Collectanea meteorologica sub auspiciis societatis scientiarum Danicae edita* bekannt gemacht hat. Das Barometer und das Daniell'sche Hygrometer wurden hiebei täglich 10 Mal, nämlich um 7, 9, 11, 12, 1, 3, 5, 7, 9 und 11 Uhr beobachtet.

Das Resultat dieser Sonderung ist sehr überraschend und enthält eine bedeutende Aufklärung über diesen ganzen Gegenstand. Man findet durch nähere Betrachtung der unten mitzutheilenden Resultate jener Beobachtungen und namentlich, wenn man ihren Gang durch Formeln darstellt, welche ihn leicht zu übersehen erlauben:

„Daß der Druck der trockenen Luft und der des Dampfes in der Atmosphäre einen entgegengesetzten Gang befolgen, in der Art, daß das Maximum des einen nahe *) mit dem Minimum des andern zusammenfällt; daß sonach die täglichen Veränderungen, die das Barometer anzeigt, eigentlich bloß die Unterschiede zweier viel bedeutenderer, vom Winter nach dem Sommer sehr rasch zunehmender, Veränderungen sind **), und daß die zwölfstündige Periode der barometrischen Verän-

*) In den Sommermonaten bis auf eine Differenz von 3 Minuten Zeit, zufolge der Berechnung nach den weiterhin zu gebenden Formeln. Auch im Mittel des ganzen Jahres fällt das Maximum des Dampfdruckes mit dem Minimum des Druckes der trockenen Luft auf dieselbe Stunde (2 Uhr Nachmittags), das Minimum des Dampfdruckes jedoch etwas später (3 Uhr Morgens) als das Maximum des Druckes der trockenen Luft (welches um 1 Uhr Morgens fällt).

**) Es beträgt nämlich, wie man aus den weiterhin folgenden Daten sieht, im jährlichen Mittel die tägliche Variation des Dampfdruckes 0,000 Linien, des Druckes der trockenen Luft 0,004 Linien, des barometrischen Druckes aber, der

by durch dieselbe Ursache bedingt werden als jene. Die täglichen Oscillationen des Barometers, welches beide Veränderungen zugleich angiebt, entstehen also durch die täglichen Veränderungen der Temperatur.

Die tägliche Oscillation des Druckes der trocknen Luft ist, wie man aus der vorigen Übersicht ersieht, im Allgemeinen größer als die des Dampfdruckes, und bloß dieser Überschuf bewirkt die tägliche barometrische Oscillation, vermöge deren mit zunehmender Tageswärme das Barometer fällt. Wenn aber irgendwo ein unverhältnismäßiges Streigen der Elasticität des Wasserdampfes Statt fände, so daß beide Veränderungen einander gleich würden, so würden die täglichen barometrischen Veränderungen verschwinden. Diese Bedingung scheint, bei der täglichen Abwechselung der Land- und Seewinde, bei dem Beginnen und Ende des Südwest-Mousson gegeben zu sein, und hieraus würde sich dann die bisher unerklärte Erscheinung des Wegfallens der täglichen Veränderung in Indien, zu bestimmten Zeiten des Jahres, sehr natürlich ergeben. Da außerdem die Maxima und Minima des barometrischen Druckes nur durch das ungleichmäßige Zu- und Abnehmen zweier gleichzeitiger Veränderungen entstehen, so sieht man leicht ein, warum diese an verschiedenen Orten zu ziemlich verschiedenen Zeiten sich zeigen. Locale Bedingungen, welche das Verhältniß der Feuchtigkeit modifiziren, müssen, so gering sie sind, hier von Einfluß sein.

Ich will, nachdem ich die Resultate der Untersuchungen Dove's in möglichster Übersichtlichkeit mitgetheilt habe, nun auch noch die Data selbst folgen lassen, aus denen sie gezogen sind, nebst den Formeln, die zu ihrer Reknäpfung gedient haben. Bei den Beobachtungen beschränkte ich mich darauf, sie für die 4 Jahreszeiten zusammengezogen mitzutheilen *); der Druck ist in Pariser Linien Quecksilberhöhe ausgedrückt.

Wasserdampf.

Stunde.	Sommer.	Herbst.	Winter.	Frühling.	Jahr.
7	5 ^m ,225	3 ^m ,772	2 ^m ,500	2 ^m ,883	3 ^m ,570
9	5 ^m ,641	4 ^m ,133	2 ^m ,511	3 ^m ,141	3 ^m ,823
11	6 ^m ,024	4 ^m ,402	2 ^m ,613	3 ^m ,299	4 ^m ,042
Mittag 12	6 ^m ,148	4 ^m ,470	2 ^m ,669	3 ^m ,355	4 ^m ,133
1	6 ^m ,216	4 ^m ,515	2 ^m ,691	3 ^m ,401	4 ^m ,177
3	6 ^m ,170	4 ^m ,515	2 ^m ,680	3 ^m ,366	4 ^m ,155
5	5 ^m ,956	4 ^m ,335	2 ^m ,578	3 ^m ,243	3 ^m ,997
7	5 ^m ,562	4 ^m ,099	2 ^m ,511	3 ^m ,051	3 ^m ,784
9	5 ^m ,160	3 ^m ,952	2 ^m ,488	2 ^m ,939	3 ^m ,582
11	4 ^m ,785	3 ^m ,823	2 ^m ,483	2 ^m ,803	3 ^m ,463

*) Im Original sind sie auch für die einzelnen Monate angeführt, so wie sie auch daselbst mittelst nachstehender Formeln für alle Stunden berechnet sind, worüber ich auf das Original verweise.

Vorherbestimmung der Witterung.

Wiegmann hat die Regel aufgestellt: am 40sten Tage nach der Erscheinung eines sich zwischen dem 1. Nov. und 21. März zeigenden Höhenrauchs (sinkenden, trockenen Nebels) fällt strenge Kälte ein *). Auch Schön erkannte durch Vergleichung mehrjähriger Beobachtungen in Würzburg diese Regel für zutreffend **), wenn sie auf folgende Weise erweitert und modificirt wird:

Um den 40. Tag nach einem vom Monat September an (bis wenn?) ***) sich zeigenden trockenen und höhenrauchartigen Nebel tritt eine merkliche Wetterveränderung ein. Belege dazu s. in seinen Abhandlungen. Derselbe †) fand folgende Regeln gültig:

Wenn in der zweiten Hälfte des Octobers eiskalte Stürme, sogenannte Gewitterschauer, mit Regen, Schnee und Graupeln eintreffen, so deutet dieses auf einen bald beginnenden strengen Winter. Das Nichteintreffen jener Stürme läßt dagegen einen gelinden oder mittelmäßigen Winter vermuthen.

Wenn in einem Jahre die Differenz zwischen der mittlern Juli- und Augusttemperatur gleich oder kleiner als die, sich nach mehrjährigen Mitteln ergebende, ist, so wird der folgende Winter nicht streng sein; ist sie aber größer und ist zugleich die mittlere Octobertemperatur desselben Jahres niedriger als die sich nach einem mehrjährigen Mittel ergebende Octobertemperatur, so folgt höchst wahrscheinlich ein strenger Winter.

Die beiden letzteren Regeln hat Schön aus 22jährigen meteorologischen Beobachtungen zu Würzburg abgeleitet, und er setzt dieselben an die Stelle einer andern, von einem Ungenannten in Nr. 94. vom 4. April 1850 des Correspondenten von und für Deutschland mitgetheilten Regel, die er nicht hinlänglich zutreffend fand.

Es wird hier und da angenommen, daß sich aus der früheren Ankunft der Wandervögel, namentlich der Schwalben und Störche, auf bald eintretende günstige Frühlingswitterung und überhaupt auf ein gutes Jahr schließen lasse. Dreizehnjährige Beobachtungen Schöbler's ††) zu Tübingen sind jedoch dieser Ansicht nicht günstig. Ihre frühere oder spätere Ankunft scheint vielmehr mit den in den Gegenden ihres Winteraufenthaltes bereits eingetretenen Witterungsverhältnissen in Beziehung zu stehen.

*) Kaszn. Arch. X. 491; XV. 496; XVI. 64, 220.

**) Kaszn. N. Arch. für Met. II. 322; IV. 326.

***) Die vom Verfasser in seinen Belegen zu dieser Regel angeführten Nebel fallen in die Monate vom September bis Februar; also scheint er ebenfalls die Regel bis zu den Märznebeln auszudehnen.

†) Kaszn. N. Arch. II. 326.

††) Ebend. IV. 326.

Sage	$e(x) = 5^{\circ} 732 + 0^{\circ} 4086 \sin (x - 14^{\circ} 15') + 0^{\circ} 0522 \sin (2x + 266^{\circ} 5')$
Sommer	$e(x) = 5^{\circ} 3965 + 0^{\circ} 8296 \sin (x - 12^{\circ} 18') + 0^{\circ} 0079 \sin (2x - 15^{\circ} 12')$
Herbst	$e(x) = 4^{\circ} 0889 + 0^{\circ} 4549 \sin (x - 20^{\circ} 57') + 0^{\circ} 0902 \sin (2x - 66^{\circ} 52')$
Winter	$e(x) = 2^{\circ} 5544 + 0^{\circ} 0714 \sin (x - 7^{\circ} 43') - 0^{\circ} 0641 \sin (2x + 241^{\circ} 58')$
Grübling	$e(x) = 3^{\circ} 0194 + 0^{\circ} 3586 \sin (x - 14^{\circ} 51') + 0^{\circ} 0445 \sin (2x - 55^{\circ} 21')$
Sage	$p(x) = 332^{\circ} 4376 + 0^{\circ} 4220 \sin (x + 166^{\circ} 12') + 0^{\circ} 0713 \sin (2x + 38^{\circ} 44')$
Sommer	$p(x) = 330^{\circ} 8395 + 0^{\circ} 8689 \sin (x + 168^{\circ} 25') + 0^{\circ} 0176 \sin (2x - 66^{\circ} 57')$
Herbst	$p(x) = 330^{\circ} 0632 + 0^{\circ} 5159 \sin (x + 154^{\circ} 6') + 0^{\circ} 1169 \sin (2x + 72^{\circ} 1')$
Winter	$p(x) = 333^{\circ} 7832 + 0^{\circ} 0968 \sin (x + 180^{\circ} 27') + 0^{\circ} 1219 \sin (2x + 26^{\circ} 45')$
Grübling	$p(x) = 334^{\circ} 8706 + 0^{\circ} 4663 \sin (x + 166^{\circ} 6') + 0^{\circ} 0301 \sin (2x + 8^{\circ} 6')$
Sage	$B(x) = 336^{\circ} 1696 + 0^{\circ} 0138 \sin (x + 22^{\circ}) + 0^{\circ} 0526 \sin (2x - 8^{\circ} 10')$
Sommer	$B(x) = 336^{\circ} 236 + 0^{\circ} 0407 \sin (x + 8^{\circ} 11') + 0^{\circ} 0201 \sin (2x - 46^{\circ} 12')$
Herbst	$B(x) = 334^{\circ} 1059 + 0^{\circ} 1433 \sin (x + 8^{\circ} 55') + 0^{\circ} 0769 \sin (2x + 21^{\circ} 32')$
Winter	$B(x) = 336^{\circ} 3876 + 0^{\circ} 0281 \sin (x + 301^{\circ} 31') + 0^{\circ} 0787 \sin (2x - 1^{\circ} 15')$
Grübling	$B(x) = 337^{\circ} 89 + 0^{\circ} 1078 \sin (x + 101^{\circ} 51') + 0^{\circ} 0639 \sin (2x - 30^{\circ} 29')$

Dove macht in Bezug auf diese Formeln noch folgende sehr erhebliche
 merkungen: Betrachten wir nach denselben den Ausdruck der täglichen
 Änderung da, wo sie am entschiedensten hervortritt, nämlich im Som-
 mer, so zeigt die unbedeutende Größe der Coefficienten $0^{\circ} 0079$ und $0^{\circ} 0176$,
 wie eine bedeutende Annäherung erhalten werden, wenn wir die damit
 implicirten Glieder vernachlässigen. Es wird dann:

$$e(x) = 5^{\circ} 3965 + 0^{\circ} 8296 \sin (x - 12^{\circ} 18')$$

$$p(x) = 330^{\circ} 8395 - 0^{\circ} 8689 \sin (x - 11^{\circ} 35')$$

Die täglichen Veränderungen des Druckes der trockenen Luft sowohl
 als der Elasticität des Wasserdampfes, sind also nahe (bei dem Bas-

serdampfe beträgt die größte Abweichung der nach dieser Formel berechnete Werthe von den beobachteten Werthen $0^{\circ},02$, bei der trockenen Luft $0^{\circ},03$ proportional dem Sinus des Stundenwinkels, von den Extremen an gerechnet. Diese Extreme fallen angegebenermaßen bis auf einen Unterschied von 3 Minuten Zeit zusammen, das Maximum des einen mit dem Minimum des andern. Weil aber mit steigender Wärme die Elasticität des Wasserdampfes nicht so stark zunimmt, als der Druck der trockenen Luft abnimmt (der Coefficient $0^{\circ},8689$ ist etwas größer als $0^{\circ},8296$), so fällt das Barometer mit steigender Wärme.

Diese Symmetrie des Steigens und Fallens findet indeß doch nur mit angenäherter Vollkommenheit Statt. Da selbst die Temperatur nicht in der einen Hälfte des Tages in denselbem Verhältnisse steigt, als sie in der andern fällt, da die dynamischen Ursachen einen, wenn auch geringen, Einfluß auf den Druck der Luft haben, so wird das zweite Glied nöthig, jene Modificationen auszudrücken. Doch bleibt dies immer, verglichen mit dem ersten, klein, so daß die Formel nur ein Maximum und Minimum giebt. Nur im Winter findet dies bei den betrachteten Beobachtungen nicht Statt, was nach Dove offenbar daher kommt, daß die Verdampfung mit dem Feuchtigkeitsverhältnisse der Winde zusammenhängt, deren Unregelmäßigkeit nicht durch einjährige Beobachtungen ausgeglichen worden ist. Denn eine Zunahme der Elasticität des Wasserdampfes in der Nacht kann nur durch plötzliches Eintreten südlicher Winde entstehen, wovon wir in nördlichen Gegenden häufig Beispiele haben, welche aber bei längeren Beobachtungen ihren störenden Einfluß verlieren werden.

Bestimmungen über die täglichen Barometerschwankungen nach den neueren Beobachtungen.

Über die täglichen Variationen des Barometers sind neuerdings mehrere nicht unwichtige Untersuchungen erschienen, deren Resultate wir im Folgenden mittheilen werden. Abgesehen von der im Vorigen schon benutzten Abhandlung Dove's sind hieher namentlich zu rechnen:

1) Eine Arbeit von Bouvard in Schweigg. LIX. 135. Dieser hat durch Anwendung der mathematischen Verfahrensart, die wir nach diesem Artikel folgen lassen werden, auf alle Beobachtungen, welche er erhalten konnte, sowohl gedruckte als handschriftlich ihm mitgetheilte, allgemeine Resultate über die täglichen Barometerschwankungen zu ziehen gesucht. Diese Resultate sind den Zahlenergebnissen nach vereinigt in einer in Schweigg. LIX. 153 beigefügten Tabelle *). Außerdem hat Bouvard

*) In dieser Tabelle bedeutet beobachtete Periode den beobachteten Unterschied zwischen dem Stande des Barometers um 9 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags; m die Größe dieser Periode für die geographische Breite φ . — Die Temperatur in der fünften Spalte ist nicht die mittlere der Beobachtungs-Orter, sondern die mittlere Temperatur, welche der Dauer der Periode zwischen 9 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags entspricht (für den Äquator zu 20° C

die Resultate 11jähriger, zu Paris angestellter, Beobachtungen in Bezug auf die täglichen Barometerschwankungen verglichen (Schweigg. LIX. 129).

2) Eine Arbeit von Carlini in den *Mém. della societ. ital. della scienza*. T. X. und im Auszug in Baumg. und Ettingh. Zeitschr. V. 468. Derselbe legte seinen Berechnungen folgende Beobachtungen zu Grunde: a) Eigene Beobachtungen zu Mailand, vom 28. Mai bis 29. Juni von 4 zu 4 Stunden, von da bis in die Hälfte des Juli von 2 bis 2 Stunden Tag und Nacht fortgesetzt, und 40tägige Beobachtungen vom 1. Dec. bis 20. Jan. von 4 zu 4 Stunden fortgesetzt; — b) Beobachtungen, von Ghimnello im Jahre 1778 zu Padua von 2 zu 2 Stunden theils im Sommer (es ist nicht angegeben in welchen Monaten), theils im Winter (vom 1. Januar bis 6. Februar und vom 10. October bis 22. December) angestellt, jedoch bloß von Mittag bis 10 Uhr Abends; — c) Beobachtungen, welche im Jahre 1823 gleichzeitig an mehreren Orten Italiens, namentlich Mailand, Pavia, Turin, Padua, Modena, Bologna und Florenz vom 18. Januar bis zum 18. Juli von 2 zu 2 Stunden von 8 Uhr früh bis 10 Uhr Abends angestellt worden sind. — Sämmtliche benutzte Beobachtungen eignen sich sonach wegen der kleinen Zwischenintervalle, in denen die Beobachtungen geschahen, vorzugsweise zur Ziehung von Resultaten über die tägliche Variation. Carlini legt übrigens der Berechnung eine ähnliche Formel zu Grunde als Bouvard.

3) Eine Arbeit von Römig über die täglichen Oscillationen zu Halle in Schweigg. LIX. 154, nach eigenen dreißigjährigen Beobachtungen, größtentheils von 2 Stunden zu Stunde; oder von 2 zu 2 Stunden am Tage, wobei der Verfasser auch durch Benützung anderer Beobachtungen an andern Orten allgemeinere Resultate zu ziehen versucht, unter Anwendung einer ähnlichen Berechnungsart als Bouvard und Carlini.

Folgendes dürften die hauptsächlichsten Resultate sein, die sich aus diesen Arbeiten ergeben:

1) Bouvard glaubt aus den von ihm verglichenen Beobachtungen schließen zu können, daß sich die Größe der des Nachts Statt findenden Barometerschwankung *), zur Größe der am Tage Statt findenden Barometerschwankungen nahe konstant $= 1 : 1,62$ verhalte; denn er fand für die Orte, für welche er hinreichend genaue Data zu dieser Vergleichung erhalten konnte, das Verhältniß von 1 zu folgenden Zahlen:

Toulouse 1,70

Clermont-Ferrand 1,65

angenommen). Diese Temperaturen sind nach Bouvard's Bemerkung meist nur grobe Annäherungen an die Wahrheit, mit denen man sich jedoch aus Mangel an bessern Bestimmungen begnügen mußte.

*) Unter Barometerschwankung wird der Unterschied des Maximums und des darauffolgenden Minimums des Barometerstandes verstanden. Die am Tage Statt findende Barometerschwankung findet von Morgens ungefähr 8 oder 10 Uhr bis Nachmittags 3 oder 4 Uhr, auch wohl noch früher oder später (an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Jahreszeiten verschieden) Statt.

derungen ein zusammengesetztes Resultat ist, welches durch das gleichzeitige Stattfinden dieser zwei besonderen Veränderungen, deren jede eine 24stündige Periode befolgt, bewirkt wird."

Drücken wir daher den Gang der täglichen Änderungen der Elasticität des Wasserdampfes und des Druckes der trockenen Luft durch eine Curve aus, so erscheinen beide einfach gekrümmt, nur kehren sie ihre concaven Scheitel nach entgegengesetzten Seiten. Recht anschaulich wird überhaupt das ganze Größenverhältniß der einzelnen Veränderungen und die Art ihrer Aufeinanderfolge werden, wenn man die graphische Verzeichnung in Fig. 97. betrachtet, worin Dove für die drei Sommermonate den Gang des Dampfdruckes, des Druckes der trockenen Luft und des barometrischen Druckes in ihrer wechselseitigen Beziehung dargestellt hat *); auch wird folgende, für das Mittel des ganzen Jahres geltende, Übersicht der Maxima und Minima und ihrer Zeiten zur Erläuterung dienen können, wobei die Zahlen den Druck in Pariser Linien angeben.

Wasserdampf	Maximum	4,188, 2 Uhr Nachmittags,
	Minimum	3,368, 3 Uhr Morgens,

Oscillation	0,820
-------------	-------

Trockene Luft	Maximum	332,803, 1 Uhr Morgens,
	Minimum	331,949, 2 Uhr Nachmittags,

Oscillation	0,854
-------------	-------

Barometer **)	1tes Maximum	336,211 10 Uhr Morgens,
	1tes Minimum	336,194 4 Uhr Nachmittags,

Oscillation	0,017
-------------	-------

	2tes Maximum	336,231 10 Uhr Abends,
	2tes Minimum	336,127 4 Uhr Morgens,

Oscillation	0,104
-------------	-------

Es knüpft sich an dieses Entsprechen der beiden gesonderten Veränderungen des Dampfdruckes und Druckes der trockenen Luft nach entgegengesetzter Richtung folgende wichtige Betrachtung an:

Da wir von der Elasticität des Wasserdampfes wissen, daß ihre Streigerung durch keine andere physikalische Ursache bewirkt werden kann, als durch die mit der Temperatur zunehmende Verdampfung, die Verdünnung der trockenen Luft aber zufolge des Vorstehenden immer gleichzeitig mit der vermehrten Elasticität des Wasserdampfes zunimmt, so muß diese nothwen-

beide zugleich anzeigt, in der ersten täglichen Periode bloß 0,017, in der zweiten 0,104 Linien. Im Sommer ist der Unterschied noch größer, wie dies auch direct aus der graphischen Verzeichnung Fig. 97. (vorig. Bb.) zu ersehen ist.

*) Die rechts und links bestehenden Zahlen 0.1; 0.2 u. s. w. drücken den Stand des Druckes um 0,1 Linien, 0,2 Linien u. s. f. über dem Minimumstande aus.

**) Welches das zusammengesetzte Resultat beider Drucke giebt.

75° R. B. verschwindet. Auch in der von Kämg gegebenen Tabelle ist keine Abnahme sichtbar (Schweigg. LIX. 155, 162).

5) Die Höhe des Beobachtungsortes über dem Niveau des Meeres scheint einen bedeutenden, jedoch noch nicht genügend erörterten, Einfluß auf die Größe der Barometerschwankungen zu haben. Dies erhellt namentlich aus der von Bouvard unternommenen Vergleichung, der Beobachtungen, welche im Kloster auf dem St. Bernhard (2491 Meter hoch über dem Meeresniveau) um 9 Uhr Morgens und 3 Uhr Abends angestellt worden sind. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich als Unterschied zwischen dem Stande des Barometers zu beiden Zeiten die sehr unbedeutende Größe (0,046 Mill. *), während in Clermont-Ferrand, Chambéry und Genf, also Orten, die sehr nahe unter derselben Breite liegen, dieser Unterschied respectio 1,00, 0,94, 0,74 Mill. beträgt; auch hat dieser Unterschied auf dem St. Bernhard das entgegengesetzte Vorzeichen, als an allen übrigen in der Tabelle des Originals aufgeführten Orten; denn das Barometer steigt auf dem St. Bernhard von 9 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags, während es an allen anderen Orten sinkt. Die Messungen zwischen den Wendekreisen in Santa-Fé de Bogota (2660 Meter hoch), Quito (2907 Meter) und in der Meierei von Antisana (4095 Meter) zeigen ebenfalls denselben Umstand der kleinen Differenz zwischen dem Stande um 9 Uhr Morgens und 3 Uhr Nachmittags in großen Höhen als an niedriger gelegenen Orten unter nahe derselben Breite, wiewohl hier der Unterschied dieser Differenz viel weniger beträchtlich ist, als bei dem St. Bernhard, auch der Gegensatz des Vorzeichens nicht Statt findet. Es scheint daher, daß auf dem St. Bernhard noch eine besondere lokale Ursache wirksam ist.

Übrigens ist auch jener Umstand einer mit der Höhe abnehmenden Schwankung nicht allgemein, wenigstens bestätigt er sich nicht für kleinere Höhen Differenzen, wie aus den von Carlini erörterten Beobachtungen **) hervorgeht, wo dem höchsten Orte (Turin) die kleinste tägliche Barometerschwankung entspricht (Schweigg. LIX. 141; Baumg. V. 488).

6) Die Größe der am Tage Statt findenden Schwankung hängt zugleich von der Temperatur und der Breite des Beobachtungsortes ab, und zwar steht sie im zusammengesetzten geraden Verhältnisse der Temperatur des Ortes und des Quadrates des Cosinus seiner geographischen Breite. Hier Temperatur ist jedoch hierbei nicht die absolute mittlere Temperatur des Beobachtungsortes verstanden, sondern die mittlere Temperatur der kalten Periode, welche zwischen dem Maximum des Barometerstandes und dem Minimum Nachmittags fällt (Bouvard).

Es ergibt sich hieraus folgende Regel, um die Größe der barometrischen Schwankung an irgend einem Orte auf die Verhältnisse des Äquators zu reduciren.

*) Auch die neueren Beobachtungen (Pogg. XXIII. 120) auf dem St. Bernhard bestätigen die Geringfügigkeit dieser Größe.

**) Für Padua, Florenz, Mailand, Bologna, Modena, Pavia, Turin.

Barometer. Tägliche Schwankungen.

Trockene Luft.

Stunde.	Sommer.	Herbst.	Winter.	Frühling.	Jahr.
7	330 ^o ,983	330 ^o ,333	333 ^o ,816	334 ^o ,998	332 ^o ,584
9	330 ^o ,588	330 ^o ,085	333 ^o ,874	334 ^o ,748	332 ^o ,378
11	330 ^o ,194	329 ^o ,881	333 ^o ,790	334 ^o ,577	332 ^o ,178
Mittag 12	330 ^o ,080	329 ^o ,791	333 ^o ,696	334 ^o ,497	332 ^o ,069
1	329 ^o ,998	329 ^o ,703	333 ^o ,598	334 ^o ,412	331 ^o ,981
3	330 ^o ,022	329 ^o ,616	333 ^o ,561	334 ^o ,393	331 ^o ,951
5	330 ^o ,245	329 ^o ,816	333 ^o ,716	334 ^o ,506	332 ^o ,125
7	330 ^o ,667	330 ^o ,090	333 ^o ,832	334 ^o ,791	332 ^o ,392
9	331 ^o ,082	330 ^o ,131	333 ^o ,914	335 ^o ,007	332 ^o ,613
11	331 ^o ,520	330 ^o ,226	333 ^o ,968	335 ^o ,235	332 ^o ,769

Barometer.

Stunde.	Sommer.	Herbst.	Winter.	Frühling.	Jahr.
7	336 ^o ,203	334 ^o ,105	336 ^o ,316	337 ^o ,881	336 ^o ,154
9	336 ^o ,229	334 ^o ,218	336 ^o ,385	337 ^o ,889	336 ^o ,206
11	336 ^o ,218	334 ^o ,233	336 ^o ,403	337 ^o ,876	336 ^o ,230
Mittag 12	336 ^o ,228	334 ^o ,261	336 ^o ,365	337 ^o ,852	336 ^o ,202
1	336 ^o ,214	334 ^o ,218	336 ^o ,289	337 ^o ,813	336 ^o ,158
3	336 ^o ,192	334 ^o ,131	336 ^o ,241	337 ^o ,759	336 ^o ,106
5	336 ^o ,201	334 ^o ,151	336 ^o ,294	337 ^o ,749	336 ^o ,122
7	336 ^o ,229	334 ^o ,189	336 ^o ,343	337 ^o ,842	336 ^o ,176
9	336 ^o ,242	334 ^o ,083	336 ^o ,402	337 ^o ,946	336 ^o ,195
11	336 ^o ,305	334 ^o ,054	336 ^o ,451	338 ^o ,038	336 ^o ,237

Die daraus durch die Methode der kleinsten Quadrate abgeleiteten Formeln sind folgende, worin e die Elasticität des Wasserdampfes bezeichnet, p den Druck der trocknen Luft, B den Stand des ganzen Barometers, x den von 7 Uhr Morgens an gezählten Stundenwinkel *).

*) Im Original sind nach diesen Formeln Tabellen berechnet.

findet man = 4,09 ==, welche Größe in der That dasselbe Zeichen und nahe denselben Werth hat, als die übrigen in der Tafel gegebenen.

Die Beobachtungen des Capitain Sabine auf Melville's Insel beweisen ebenfalls, daß die Schwankungen in höheren Breiten ihr Zeichen ändern. Da aber die zugehörige Temperatur nicht bekannt ist, so kann ein näherer Beweis daraus nicht gezogen werden.

7) Bouvard glaubt sogar, daß das vorige Princip, nach welchem sich die Bewegungen des Barometers verhalten wie die Temperaturen, auch richtig sei, wenn man die verschiedenen Schwankungen während des Tages an demselben Orte mit einander vergleicht.

Bouvard findet nämlich *) nach einjähriger Aufzeichnung der Thermometerstände zu Paris die mittlere Temperatur der Tageschwankung von 9 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends = 13°,81 C. und die der nächsten Schwankung = 9°,86. Das Verhältniß dieser beiden Größen ist 1,48, was in der That nicht bedeutend von dem oben sich aus den, von Bouvard berechneten, Barometerbeobachtungen ergebenden Verhältniße 1,62 abweicht.

8) Die Zeit, wo das Maximum am Morgen eintritt, so wie die übrigen Wendestunden, ändern sich mit der Jahreszeit, wie übereinstimmend aus Bouvard's und Carlini's Erörterungen hervorgeht.

So tritt in Toulouse nach Bouvard das Maximum im Sommer sehr nahe um 8 Uhr 10 Minuten Morgens, im Winter um 9 Uhr 30 Minuten Morgens, also 1 Stunde 20 Minuten später ein als im Sommer. Carlini findet für Mailand und Padua folgende Bestimmungen:

Stunden des Maximums.	Stunden des Minimums.	Maximum u. Minimum in Millimetern.		Ort und Jahreszeit.
1 Uhr 38' Früh	5 Uhr 39' Nachm.	332,8431	332,4517	Mailand.
9 Uhr 39' Früh	4 Uhr 14' Früh	332,9378	332,8234	
10 Uhr 43' Abends	5 Uhr 25' Nachm.	331,7574	331,6672	Winter.
10 Uhr 25' Früh	3 Uhr 35' Früh	331,8891	331,6854	
0 Uhr 38' Früh	5 Uhr 38' Nachm.	333,9811	333,7475	Padua.
10 Uhr 7' Früh	5 Uhr 31' Früh	334,1871	333,9487	
10 Uhr 12' Abends	3 Uhr 51' Nachm.	337,2853	336,8892	Winter.
10 Uhr 15' Früh	4 Uhr 36' Früh	347,1576†	336,8889	

*) Schweigg. LIX. 149.

† Unkorrectig Druckfehler.

4. Formeln für den täglichen Gang des Barometers.

Genau treten die zwei Minima im Winter eher ein, als im Sommer, während das Morgenmaximum im Winter etwas später kommt. (Schweigg. LIX. 141; Baumg. V. 478, 481, 484).

5. Die Zeit des Eintretes des täglichen Maximums und Minimums ist nicht dieselbe in verschiedenen Jahreszeiten, sondern auch an verschiedenen Orten verschieden.

Zuerst sah man zwar schon aus früheren Beobachtungen (S. 1. 224), indeß waren die verglichenen Beobachtungen nicht von dem Einflusse der Jahreszeiten gehörig befreit worden, da viele derselben zu verschiedenen Jahreszeiten angestellt waren. Es ergibt sich indessen aus neuerdings auch aus den durch Carlini erhaltenen gleichzeitigen Beobachtungen in den genannten Städten Italiens. Folgende Tabelle gibt an, um wie viel eher oder später an jedem Orte ein Augenblick eintritt, wo der Barometerstand gerade das Mittel zwischen dem Maximum und Minimum am Tage hielt, als zu Mailand.

Padua, früher 1^h,9 Turin, später 0^h,5

Verona, später 3^h,4 Modena, früher 0^h,9

Bologna, früher 0^h,6 Florenz, früher 2^h,2

Durch berechnende Combination dieser Beobachtungen findet Carlini (für Italien):

- a) daß sich die Barometerschwankung von West nach Ost und von Süd nach Nord fortpflanzt;
- b) daß die Richtung, in welcher die Luftwelle von Mailand aus fortschreitet, einen Winkel von 24° mit dem Meridian bildet, und daß mithin in der darauf senkrechten durch Mailand gehenden Linie, welche einen Winkel von 66° zur andern Seite mit dem Meridian bildet, die Barometerschwankungen nahe gleichzeitig mit denen zu Mailand erfolgen, welche Richtung nahe mit dem Zuge der Küsten des adriatischen Meeres zusammenfällt;
- c) daß sich die Oscillationen der Atmosphäre in der Richtung der Länge drei bis vier Mal schneller fortpflanzen, als in der Richtung der Breite (Baumg. V. 489).

Mathematische Darstellung des Ganges der täglichen Barometeränderungen an einem Orte.

Hallström, Bouvard, Carlini, Röm, Dove und überhaupt alle Neuere bedienen sich zu Darstellung des Ganges der täglichen Barometeränderungen der Verknüpfung derselben durch eine (schon vorher von Bessel zu anderm Behuf angewandte) Formel, welche nach allen bisher angestellten Vergleichen vortrefflich zur genauen Darstellung der-

7) Hallström Pogg. VIII. 144; XI. 251. — Bouvard Schweigg. LIX. 126. — Carlini Baumg. Zeitschr. V. 472. — Röm Schweigg. LIX. 157. in

die Resultate 11jähriger, zu Paris angestellter, Beobachtungen in Bezug auf die täglichen Barometerschwankungen verglichen (Schweigg. LIX. 129).

2) Eine Arbeit von Carlini in den *Mém. della societ. ital. della scienza*. T. X. und im Auszug in Baumg. und Ettingh. Zeitschr. V. 468. Derselbe legte seinen Berechnungen folgende Beobachtungen zu Grunde:

a) Eigene Beobachtungen zu Mailand, vom 28. Mai bis 29. Juni von 4 zu 4 Stunden, von da bis in die Hälfte des Juli von 2 bis 2 Stunden Tag und Nacht fortgesetzt, und 40tägige Beobachtungen vom 1. Dec. bis 20. Jan. von 4 zu 4 Stunden fortgesetzt; — b) Beobachtungen, von Ghiminello im Jahre 1778 zu Padua von 2 zu 2 Stunden theils im Sommer (es ist nicht angegeben in welchen Monaten), theils im Winter (vom 1. Januar bis 6. Februar und vom 10. October bis 22. December) angestellt, jedoch bloß von Mittag bis 10 Uhr Abends; — c) Beobachtungen, welche im Jahre 1823 gleichzeitig an mehreren Orten Italiens, namentlich Mailand, Pavia, Turin, Padua, Modena, Bologna und Florenz vom 18. Januar bis zum 18. Juli von 2 zu 2 Stunden von 8 Uhr früh bis 10 Uhr Abends angestellt worden sind. — Sämmtliche benutzte Beobachtungen eignen sich sonach wegen der kleinen Zwischenintervalle, in denen die Beobachtungen geschahen, vorzugsweise zur Ziehung von Resultaten über die tägliche Variation. Carlini legt übrigens der Berechnung eine ähnliche Formel zu Grunde als Bouvard.

3) Eine Arbeit von Römig über die täglichen Oscillationen zu Halle in Schweigg. LIX. 154, nach eigenen dreißigjährigen Beobachtungen, größtentheils von Stunde zu Stunde; oder von 2 zu 2 Stunden am Tage, wobei der Verfasser auch durch Benützung anderer Beobachtungen an anderen Orten allgemeinere Resultate zu ziehen versucht, unter Anwendung einer ähnlichen Berechnungsart als Bouvard und Carlini.

Folgendes dürften die hauptsächlichsten Resultate sein, die sich aus diesen Arbeiten ergeben:

1) Bouvard glaubt aus den von ihm verglichenen Beobachtungen schließen zu können, daß sich die Größe der des Nachts Statt findenden Barometerschwankung *), zur Größe der am Tage Statt findenden Barometerschwankungen nahe constant $= 1 : 1,62$ verhalte; denn er fand für die Orte, für welche er hinreichend genaue Data zu dieser Vergleichung erhalten konnte, das Verhältniß von 1 zu folgenden Zahlen:

Toulouse	1,70
Clermont-Ferrand	1,65

angenommen). Diese Temperaturen sind nach Bouvard's Bemerkung meist nur grobe Annäherungen an die Wahrheit, mit denen man sich jedoch aus Mangel an andern Bestimmungen begnügen mußte.

*) Unter Barometerschwankung wird der Unterschied des Maximums und des darauffolgenden Minimums des Barometerstandes verstanden. Die am Tage Statt findende Barometerschwankung findet von Morgens ungefähr 8 oder 10 Uhr bis Nachmittags 2 oder 4 Uhr, auch wohl noch früher oder später (an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Jahreszeiten verschieden) Statt.

Einfluss des Mondes auf die Barometerschwankungen.

Der Mond übt keinen merklichen Einfluss auf den Stand des Barometers aus. Die Beobachtungen von Flauguergues einen solchen Einfluss nachzuweisen zu erkennen gaben. Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs liegt nach der neuen Erörterung dieses Gegenstandes durch Bouvard in Folgendem: Die Resultate Bouvard's sind in der That correct, dass Voll- und Neumond und beide Viertel auf unsern Atmosphären dieselbe Wirkung besitzen, welches zwar in Bezug auf die Barometerhöhe, die der Mond durch seine Attraction auf dieselbe übt, richtig ist, aber in Bezug auf mögliche Veränderungen, die sein Lichterfluss ausübt, erst noch nachzuweisen gewesen wäre. Die auf dem Pariser Observatorium angestellten Beobachtungen müßten daher erst einer neuen Berechnung für die einzelnen Mondphasen selbst unterworfen werden, um aus ihnen die Zulässigkeit vom Mondeseinfluss abhängiger periodischer Schwankungen widerlegen oder bestätigen zu können, indem wir aus den bis jetzt mitgetheilten Beobachtungen bloß die für Vollmond und Neumond (für die Syzygien) und Quadraturen gemeinschaftlich berechnete mittlere Barometerhöhe kennen lernen, nicht aber die mittleren Barometerhöhen für die 4 Hauptphasen selbst, noch weniger für die dazwischen liegenden Punkte. Da nun aber nach den Untersuchungen von Flauguergues und den eigenen Untersuchungen Schöblier's das monatliche mittlere Minimum der Barometerhöhe, so wie die größte Neigung zu Niederschlägen aus der Atmosphäre in die Nähe des Vollmondes, in den meisten Jahreszeiten zwischen diesen und das erste Viertel, das mittlere Maximum der Barometerhöhe und die größte Neigung zur Aufheiterung zwischen das letzte Viertel und den Neumond fällt, so können die aus den Syzygien und Quadraturen gezogenen Mittelzahlen nur unbedeutende Verschiedenheiten geben. Daß wirklich dem Monde ein Einfluss auf den Stand des Barometers beigemessen werden müsse, läßt sich in der That, nachdem zu den früheren Beobachtungen von Flauguergues über diesen Gegenstand neue desselben Beobachters, so wie andere von Schöblier, Pallaschka und Siber hinzugekommen sind, welche sämmtlich zu übereinstimmenden Resultaten führen, wohl nicht mehr bezweifeln. Wir wollen zuerst diese Resultate mit Worten anführen, dann die Tabellen, welche die mittlern Resultate der Beobachtungen selbst enthalten, hinzufügen.

Aus der Tabelle von Flauguergues, welche aus 20jährigen Beobachtungen zu Viviers abgeleitet ist, ergeben sich folgende Resultate:

Bouvard in *Mém. de l'Acad. T. VII. 287*; Auszug daraus, doch ohne Detail der Beobachtungen in *Pogg. XIII. 137*; dessen Berechnungen des Einflusses in *Schweigg. LIX. 4* oder *Pogg. XIII. 137*. — Flauguergues in *Bibl. univ. XXXVI. 261*; *XL. 265* (*Schweigg. LIX. 11*). — Schöblier in seinen Untersuchungen über den Einfluss des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre; derselbe in *Kasner's Arch. der Met. S. 13, 161*. Pallaschka in *Kasner's Arch. f. Met. II. 81*. Siber ebenb. *IV. 419*. — Boussingault's Beobachtungen, berechnet von Schöblier in des letztern Schrift über den Einfluss des Mondes. — Frühere Literatur s. in *Schweigg. LIX. 1*.

1) Während eines synodischen Umlaufes des Mondes steigt das Barometer vom zweiten Octanten, wo es am niedrigsten steht, bis zur zweiten Quadratur, wo es am höchsten steht; das Quecksilber sinkt darauf bis zum zweiten Octanten. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stande dieser Periode beträgt 1,44 Mill.

2) Die Declination des Mondes hat ebenfalls Einfluß auf die Veränderung des Druckes der Atmosphäre. Diese Wirkung ist zu Biviers bei südlicher Declination der Sonne größer als bei nördlicher, was nothwendig daraus folgt, daß die mittlere Höhe des Barometers bei südlicher Declination der Sonne um 0,27 Millimeter kleiner ist, als bei nördlichem Lunifitium.

3) Die Wirkung des Mondes auf die Veränderung des Druckes ändert sich auch mit der Entfernung dieses Gestirnes von der Erde. Die mittlere Barometerhöhe nimmt zu, oder die Wirkung des Mondes nimmt ab, so wie die Parallaxe kleiner wird, und dieses ohne Ausnahme, welches allerdings dahin zu deuten scheint, daß diese Wirkung mit der Newton'schen Anziehung der Atmosphäre vom Monde in Beziehung steht.

4) In allen Fällen, wo man annehmen darf, daß die Wirkung des Mondes eine mittlere sei, stimmen die erhaltenen Größen (sämmtlich für dieselben Tagesstunden genommen) nahe überein. Bei der mittlern Entfernung des Mondes finden wir 755,46 Millimeter wenn er im Äquator ist, 755,45 Millimeter, und beide fast gar nicht von einander abweichende Größen stimmen auch mit dem allgemeinen Mittel 755,46 Millimeter überein. — Dies dient der Annahme, daß die in den anderen Fällen beobachteten Unterschiede wirklich von der Wirkung des Mondes abhängen, sehr zur Unterstützung.

Die Beobachtungen Hallaschka's stimmen in Folgendem mit denen von Flaugergues überein:

- 1) daß das Minimum des Barometerstandes zur Zeit des zweiten Octav'scheines ist;
- 2) daß der Barometerstand höher zur Zeit der Mondferne, als zur Zeit der Mondnähe ist;
- 3) daß er größer zur Zeit des nördlichen als des südlichen Lunifitiums ist.

Im übrigen zeigt sich bei den Prager Beobachtungen der bemerkenswerthe Umstand, daß der Barometerstand zur Zeit sämmtlicher 4 Octav'scheine tiefer steht als zur Zeit der Syzygien oder Quadraturen, so daß er abwechselnd steigt und fällt. Das absolute Maximum fällt bei den Prager Beobachtungen zur Zeit des Neumondes, und die ganze vom Monde abhängige Variation beträgt bloß 0,76 Linien, ist mithin nur ungefähr halb so groß als zu Biviers.

Eiber, welcher die Beobachtungen, die von 1781—1791 auf dem hohen Prißenberge in Baiern angestellt worden sind, berechnet hat, führt in Betreff unseres Gegenstandes Folgendes an:

26 Formeln für den täglichen Gang des Barometers.

Hienach treten die zwei Minima im Winter eher ein, als im Sommer, während das Morgenmaximum im Winter etwas später kommt. (Schweigg. LIX. 141; Baumg. V. 478, 481, 484).

9) Die Zeit des Eintrittes des täglichen Maximums und Minimums ist nicht bloß in verschiedenen Jahreszeiten, sondern auch an verschiedenen Orten verschieden.

Dieses Sag hatte man zwar schon aus früheren Beobachtungen geschlossen (Biot I. 224), indeß waren die verglichenen Beobachtungen nicht von dem Einflusse der Jahreszeiten gehörig befreit worden; da viele derselben zu verschiedenen Jahreszeiten angestellt waren. Es ergibt sich indeß dieses Resultat neuerdings auch aus den durch Carlini erbrachten gleichzeitigen Beobachtungen in den genannten Städten Italiens. Folgende Tafel giebt an, um wie viel eher oder später an jedem Orte ein Tagesspiel eintrat, wo der Barometerstand gerade das Mittel zwischen dem Maximum und Minimum am Tage hielt, als zu Mailand.

Pavia, früher $1^h,9$ Turin, später $0^h,5$

Padua, später $3^h,4$ Modena, früher $0^h,9$

Bologna, früher $0^h,6$ Florenz, früher $2^h,2$

Durch berechnende Combination dieser Beobachtungen findet Carlini (für Italien):

- a) daß sich die Barometerschwankung von West nach Ost und von Süd nach Nord fortpflanze;
- b) daß die Richtung, in welcher die Eastwelle von Mailand aus fortschreitet, einen Winkel von 24° mit dem Meridian bildet, und daß mithin in der darauf senkrechten durch Mailand gehenden Linie, welche einen Winkel von 66° zur andern Seite mit dem Meridian bildet, die Barometerschwankungen nahe gleichzeitig mit denen zu Mailand erfolgen, welche Richtung nahe mit dem Zuge der Küsten des adriatischen Meeres zusammenfällt;
- c) daß sich die Oscillationen der Atmosphäre in der Richtung der Länge drei bis vier Mal schneller fortpflanzen, als in der Richtung der Breite (Baumg. V. 489).

Mathematische Darstellung des Ganges der täglichen Barometeränderungen an einem Orte.

Hallström, Bouvard, Carlini, Råmø, Dove und überhaupt alle Neuere bedienen sich zu Darstellung des Ganges der täglichen Barometeränderungen der Verknüpfung derselben durch eine (schon vorher von Bessel zu anderm Behuf angewandte) Formel, welche nach allen bisher angestellten Vergleichen vortreflich zur genauen Darstellung der-

*) Hallström Pogg. VIII. 144; XI. 254. — Bouvard Schweigg. LIX. 136. — Carlini Baumg. Zeitschr. V. 472. — Råmø Schweigg. LIX. 157. — Dove in

Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen. 27

selben und auch zu Herleitung der Zeit der Wendestunden und der Größe der Maxima und Minima dienen kann.

Diese Formel ist, wie sie von Hallström, Kämg u. a. dargestellt wird, folgende *):

$$B_t = B + u' \sin(t \cdot 15^\circ + v') + u'' \sin(t \cdot 30^\circ + v'')$$

wo t die Stunde, von Mittag an gerechnet, ist, B_t den dieser Stunde entsprechenden Barometerstand bezeichnet, B , u' , u'' , v' , v'' aber constante, durch die Beobachtungen (am besten mittelst der Methode der kleinsten Quadrate) näher zu bestimmende Größen sind **).

B ist das, was man mittlern Barometerstand nennt. Das Glied $u' \sin(t \cdot 15^\circ + v')$ nennt Carlini die physische und das Glied $u'' \sin(t \cdot 30^\circ + v'')$ die dynamische Fluth der Atmosphäre.

Die Zeiten der Maxima und Minima werden durch die Wurzeln der Gleichung gegeben, die man erhält, wenn man das Differenzial des zweiten Gliedes dieser Formel $= 0$ setzt, und die auf diese Art gefundenen Werthe von t , in die allgemeine Formel gesetzt, geben dann die Größe der Extreme selbst.

Um den Unterschied zwischen dem Mittel der beiden Maxima und dem Mittel der beiden Minima, die binnen 24 Stunden eintreten, als Function der geographischen Breite auszudrücken, bedient sich Kämg (Schweigg. LIX. 163) folgender empirischer Formel:

$$D_\varphi = A + B \cos(\varphi + v) + C \cos^2 \varphi$$

worin D_φ die Größe dieses Unterschiedes in der Breite φ bedeutet; A , B , C , v aber constante, durch die Beobachtungen zu bestimmende, Größen sind.

Er hat Schweigg. LIX. 164 eine Vergleichung der hienach berechneten Werthe mit beobachteten Werthen für verschiedene Orte gegeben, welche allerdings keine recht genaue Übereinstimmung zeigt, was indeß der Verfasser zum Theil auf Rechnung dessen schreibt, daß er zur Bestimmung der Constanten Orte nahm, die unter verschiedenen Climates liegen, während er es wahrscheinlich findet, daß Continental- und See-Climate sich hiebei verschieden verhalten.

über den Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen ***).

Bekanntlich hat Bouvard (Biot I. 228) aus Berechnungen 15jähriger, zu Paris angestellter, Beobachtungen gefolgert, daß der Mond in

*) Bouvard wendet noch ein Glied mehr an, als in folgender Formel mitgetheilt ist.

**) Man findet diese Bestimmung für verschiedene Orte von Hallström in Pogg. XI. 261; für Halle in Kämg in Schweigg. LIX. 167; für Mailand, Padua, Turin, Padua, Modena, Bologna, Florenz von Carlini in Baumg. Zeitschr. V. 467.

***), Neuere Literatur: Laplace in Comptes. du tems pour 1826. 278. —

28 Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen.

unsern Klimaten keinen merklichen Einfluß auf den Stand des Barometers äußere, da hingegen die Beobachtungen von Flauguergues einen solchen Einfluß entschieden zu erkennen gaben. Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruches liegt nach der neuen Erörterung dieses Gegenstandes durch Schöbler in Folgendem: Die Resultate Bouvard's sind in der Annahme berechnet, daß Voll- und Neumond und beide Viertel auf unserer Atmosphäre dieselbe Wirkung besäßen, welches zwar in Bezug auf die Veränderungen, die der Mond durch seine Attraction auf dieselbe äußert, richtig sein muß, aber in Bezug auf mögliche Veränderungen, die sein Lichtfluß äußert, erst noch nachzuweisen gewesen wäre. Die auf dem Pariser Observatorium angestellten Beobachtungen müßten daher erst einer neuen Berechnung für die einzelnen Mondphasen selbst unterworfen werden, um aus ihnen die Zulässigkeit vom Mondeseinfluß abhängiger periodischer Schwankungen widerlegen oder bestätigen zu können, indem wir aus den bis jetzt mitgetheilten Beobachtungen bloß die für Vollmond und Neumond (für die Syzygien) und Quadraturen gemeinschaftlich berechnete mittlere Barometerhöhe kennen lernen, nicht aber die mittleren Barometerhöhen für die 4 Hauptphasen selbst, noch weniger für die dazwischen liegenden Punkte. Da nun aber nach den Untersuchungen von Flauguergues und den eigenen Untersuchungen Schöbler's das monatliche mittlere Minimum der Barometerhöhe, so wie die größte Neigung zu Niederschlägen aus der Atmosphäre in die Nähe des Vollmondes, in den meisten Jahreszeiten zwischen diesen und das erste Viertel, das mittlere Maximum der Barometerhöhe und die größte Neigung zur Aufheiterung zwischen das letzte Viertel und den Neumond fällt, so können die aus den Syzygien und Quadraturen gezogenen Mittelzahlen nur unbedeutende Verschiedenheiten geben. Daß wirklich dem Monde ein Einfluß auf den Stand des Barometers beigemessen werden müsse, läßt sich in der That, nachdem zu den früheren Beobachtungen von Flauguergues über diesen Gegenstand neue desselben Beobachters, so wie andere von Schöbler, Hallaschka und Eiber hinzugekommen sind, welche sämmtlich zu übereinstimmenden Resultaten führen, wohl nicht mehr bezweifeln. Wir wollen zuerst diese Resultate mit Worten anführen, dann die Tabellen, welche die mittleren Resultate der Beobachtungen selbst enthalten, hinzufügen.

Aus der Tabelle von Flauguergues, welche aus 20jährigen Beobachtungen zu Biviers abgeleitet ist, ergeben sich folgende Resultate:

Bouvard in *Mém. de l'Acad. T. VII. 287*; Auszug daraus, doch ohne Detail der Beobachtungen in *Pogg. XIII. 137*; dessen Berechnungen des Einflusses in *Schweigg. LIX. 4* oder *Pogg. XLII. 137*. — Flauguergues in *Bibl. univ. XXXVI. 264*; *XL. 265* (*Schweigg. LIX. 11*). — Schöbler in seinen Untersuchungen über den Einfluß des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre; derselbe in *Kästner's Arch. der Met. S. 12, 161*. Hallaschka in *Kästn. Arch. f. Met. II. 61*. Eiber ebend. *IV. 419*. — Boussingault's Beobachtungen, berechnet von Schöbler in der letztern Schrift über den Einfluß des Mondes *S. 22*. Frühere Literatur s. in *Schweigg. LIX. 1*.

Einfluß des Mondes auf die Barometerschwankungen. 29

1) Während eines synodischen Umlaufes des Mondes steigt das Barometer vom zweiten Octanten, wo es am niedrigsten steht, bis zur zweiten Quadratur, wo es am höchsten steht; das Quecksilber fällt darauf bis zum zweiten Octanten. Der Unterschied zwischen dem höchsten und niedrigsten Stande dieser Periode beträgt 1,44 Mill.

2) Die Declination des Mondes hat ebenfalls Einfluß auf die Verminderung des Druckes der Atmosphäre. Diese Wirkung ist zu Biviers bei südlicher Declination der Sonne größer als bei nördlicher, was nothwendig daraus folgt, daß die mittlere Höhe des Barometers bei südlicher Declination der Sonne um 0,27 Millimeter kleiner ist, als bei nördlichem Lunifitium.

3) Die Wirkung des Mondes auf die Veränderung des Druckes ändert sich auch mit der Entfernung dieses Gestirnes von der Erde. Die mittlere Barometerhöhe nimmt zu, oder die Wirkung des Mondes nimmt ab, so wie die Parallaxe kleiner wird, und dieses ohne Ausnahme, welches allerdings dahin zu deuten scheint, daß diese Wirkung mit der Newton'schen Anziehung der Atmosphäre vom Monde in Beziehung steht.

4) In allen Fällen, wo man annehmen darf, daß die Wirkung des Mondes eine mittlere sei, stimmen die erhaltenen Größen (sämmtlich für dieselben Tagesstunden genommen) nahe überein. Bei der mittlern Entfernung des Mondes finden wir 755,46 Millimeter wenn er im Äquator ist, 755,45 Millimeter, und beide fast gar nicht von einander abweichende Größen stimmen auch mit dem allgemeinen Mittel 755,46 Millimeter überein. — Dies dient der Annahme, daß die in den anderen Fällen beobachteten Unterschiede wirklich von der Wirkung des Mondes abhängen, sehr zur Unterstützung.

Die Beobachtungen Hallaschka's stimmen in Folgendem mit denen von Flauguergues überein:

- 1) daß das Minimum des Barometerstandes zur Zeit des zweiten Octav-scheines ist;
- 2) daß der Barometerstand höher zur Zeit der Mondferne, als zur Zeit der Mondnähe ist;
- 3) daß er größer zur Zeit des nördlichen als des südlichen Lunifitiums ist.

Im übrigen zeigt sich bei den Prager Beobachtungen der bemerkenswerthe Umstand, daß der Barometerstand zur Zeit sämmtlicher 4 Octav-scheine tiefer steht als zur Zeit der Syzygien oder Quadraturen, so daß er abwechselnd steigt und fällt. Das absolute Maximum fällt bei den Prager Beobachtungen zur Zeit des Neumondes, und die ganze vom Monde abhängige Variation beträgt bloß 0,76 Linien, ist mithin nur ungefähr halb so groß als zu Biviers.

Obier, welcher Beobachtungen, die von 1781—1791 auf dem hohen Peissenberge in Baiern angestellt worden sind, berechnet hat, führt in Betreff unseres Gegenstandes Folgendes an:

und in Zürich, das Mal im Winter (Januar 1827), das andere Mal im Sommer (Juni desselben Jahres) angestellt haben, bestätigen diesen Umstand aufs Neue, und erlauben einige allgemeine Bemerkungen daraus zu ziehen; auch verdienen in diesem Bezuge die, zwar nicht einmal einen ganzen Tag umfassenden, aber bei besonders schönem Wetter und hohem Barometerstande angestellten correspondirenden Beobachtungen von Gautier (Verbindung mit Horner auf dem Rigi und in Zürich*) nicht überlassen zu werden.

Wir wollen hier zuvörderst die Tabellen der Resultate, berechnet nach dem in der Littrow'schen Astronomie enthaltenen, auf der Formel von Laplace beruhenden, Tafeln mittheilen**); dann die Bemerkungen, die sich daran knüpfen lassen.

Die Beobachtungen Horner's und Eschmann's waren stündliche von 7 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends; die Winterbeobachtungen 11 Tage, die Sommerbeobachtungen (die bei sehr unregelmäßigem schlechten Wetter eingestellt waren) 15 Tage hindurch fortgesetzt, woraus nachstehende die Mittel folgen. Die Beobachtungen Gautier's und Horner's wurden am 18. Juni 1831 von 9 Uhr Abends bis zum 19. Juni 12 Uhr Mittags angestellt. Die trigonometrisch bestimmte Höhe des Rigi über Zürich ist 706,8 Toissen.

Beobachtungen von Horner und Eschmann.

Stunde.	I. Winterbeobachtungen.			II. Sommerbeobachtungen.		
	Thermometerstand C.		Niveau- differenz in Toissen †).	Thermometerstand C.		Niveau- differenz in Toissen †).
	Zürich.	Rigi.		Zürich.	Rigi.	
7	— 3°, 7	— 5°, 5	693,6	+ 10°, 3	+ 3°, 5	704,2
8	3, 5	5, 2	694,6	10, 9	3, 8	706,0
9	2, 9	4, 4	697,2	11, 7	4, 4	707,9
10	2, 3	3, 5	699,5	12, 2	4, 6	708,6
11	1, 6	2, 2	702,2	12, 7	5, 2	709,3
12	0, 4	2, 3	703,1	13, 1	5, 3	709,1
1	0, 5	2, 0	703,6	13, 4	5, 0	708,3
2	0, 3	1, 9	703,4	13, 6	4, 7	707,8
3	0, 7	2, 4	702,0	13, 6	4, 6	707,0
4	1, 2	3, 3	699,5	13, 6	4, 5	706,1
5	1, 6	4, 0	697,7	13, 3	4, 1	704,7
6	1, 9	4, 4	696,3	12, 8	3, 7	703,6
7	2, 0	4, 6	695,0	12, 4	3, 6	703,0
8	2, 2	4, 7	695,7	11, 8	3, 4	701,2
9	2, 1	5, 0	694,8	11, 3	3, 2	701,0
10	2, 2	5, 0	693,6			

*) Bibl. genév. 1832. Annot. p. 337.

**) Hier haben die Barometerstände des Rigs halber nicht beigefügt, sondern nur die daraus mit allen Correctionen berechneten Höhen.

†) Mit allen Correctionen berechnet.

Beobachtungen von Gautier und Horner.

Stunden.	Niveaudifferenz in Loissen.	Niveaudifferenz vernachlässigter tion der Barome- ter wegen der zu Temperatur
9 Uhr Abends . . .	689,4	653,5
10½ — — . . .	687,8	654,4
5 Uhr Morgens . .	685,7	656,9
6 — — . . .	687,7	656,4
7 — — . . .	690,8	655,5
8 — — . . .	692,2	655,2
9½ — — . . .	694,8	653,3
11 — — . . .	698,5	651
12 — — . . .	700	649,1

Die Tabellen von Eschmann und Horner führen zu folgenden Folgerungen:

- 1) bei den Winterbeobachtungen fand zwischen dem Maximum und Minimum der gefundenen Höhe ein Unterschied von 10 Loissen, ungefähr $\frac{1}{10}$ der Totalhöhe, bei den Sommerbeobachtungen ein Unterschied von 8,3 Loissen Statt;
- 2) das Wachsthum der beobachteten Höhen nimmt ziemlich regelmäßig mit der mittlern Wärme zwischen beiden Stationen im Laufe des Jahres zu;
- 3) Die mittlere Höhe im Sommer ergibt sich um 7½ Loissen größer (im Winter*);
- 4) daß der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum im Winter als im Sommer gefunden wurde, coincidirte mit wahrscheinlich damit zusammenhängenden, Umstände, daß der Unterschied zwischen dem Maximum und Minimum der Temperatur mittlern zwischen beiden Stationen im Winter größer als im Sommer, nämlich dort 3°,5, hier nur 2°,3 war;
- 5) der in den beobachteten Höhen des Rigi bemerkte Gang kam auf Rechnung der täglichen Variation des Barometers geschriebe; denn die Bergeshöhe erreicht ihr Maximum um Mittag Minimum des Morgens und Abends; während die Extreme be

* Horner geht hierbei in einiges Detail ein, um zu beweisen, daß ausserhalb der Verhältnisse der Beobachtung noch vom relativen des Barometers abhängen konnte, als wodurch nur ganz kleine Differenz entsteht werden konnten. Die Luftfeuchtigkeit jedoch konnte nicht in Rücksicht genommen werden, da bei den Winterbeobachtungen kein Oegrometer beobachtet

metrischen Beobachtungen um 9 Uhr Morgens und 3 bis 4 Uhr Nachmittags fallen;

6) Da die Beobachtungen bei sehr ungünstigem Wetter, Nebel, Schnee, Regen, Wind angestellt wurden, so erhellt, daß diese das Phänomen der Variation der Bergeshöhe nicht verhindern.

Diese Resultate zeigen mit großer Bestimmtheit einen Zusammenhang des Phänomens mit dem Gange der Temperatur an.

Einfluß der Windesrichtung. Dove *) bemerkt, daß in der gemäßigten Zone, da die Atmosphäre hier nicht im Zustande des Gleichgewichtes sei, das barometrische jährliche Mittel für den Einfluß der mittleren Windesrichtung corrigirt werden müsse, und schlägt zu diesem Behufe vor, statt des barometrischen Mittels die Summe der barometrischen Windmittel zu nehmen, da, wenn die Intensität gleich gesetzt wird, so lange kein Maß für dieselbe vorhanden, der Zustand des Gleichgewichtes verglichen werden kann dem Zustande der Atmosphäre, wenn alle Winde gleich lange wehen. Welchen Einfluß die Windesrichtung auf den Barometerstand haben kann, wird man durch Vergleichung nachstehender Beobachtungen erkennen können.

	Nicht corr. Barom. Mittel.	Corrig. Mittel.	Zahl der Beobachtungsjahre.
Berlin	335 ⁷ ,14	333 ⁷ ,19	5
Hamburg	335 ,8	335 ,86	18
Niðelburg	336 ,34	336 ,22	5
Paris	335 ,85	335 ,50	10

Man sieht, daß die Correctionen fast nirgends groß ausfallen, aber doch Beachtung verdienen.

IV. Vom Winde.

über die Abhängigkeit der atmosphärischen Electricität von der Windesrichtung nach Schüller's Untersuchungen vgl. Kapitel VIII.

über den Einfluß der Windesrichtung auf die mittlere Temperatur vgl. Kapitel XI.

über den Einfluß des Windes auf den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre vgl. Kapitel VII.

über die Windverhältnisse in Europa im Allgemeinen.

Berianlaßt durch Gegenbemerkungen Schouw's (Vogg. XIV. 541) gegen die von Dove aufgestellten Ansichten über die Windverhältnisse in Europa hat letzterer in Vogg. XV. 53 eine neue Erörterung seiner Ansich-

*) Vogg. XIV. 219.

ten und der Gründe, auf die sie sich stützen, gegeben die als eine Art Résumé seiner früheren Abhandlungen über diesen Gegenstand *) betrachtet werden kann. Auch hat er Schouw's Bemerkungen noch weiter berücksichtigt in Pogg. XXIII. 65.

über die jährliche Variation der mittlern Windrichtung in Deutschland, von Schöbler **).

Schöbler hat durch Berechnung 14jähriger Beobachtungen, welche an einem Orte im südlichen Deutschland, und 30jähriger Beobachtungen, welche an einem Orte im nördlichen Deutschland angestellt waren, gefunden, daß für beide Gegenden ein in der Hauptsache übereinstimmender periodischer Wechsel der Winde Statt findet, der Art, daß die südlichen Winde am häufigsten in den Herbst- und Wintermonaten, die nördlichen in den Frühlings- und Sommermonaten wehen; ferner die westlichen Winde das Maximum der Häufigkeit im Sommer, namentlich den Monaten Juni, Juli und August erreichen, die östlichen dagegen im April und den Wintermonaten. Die nachfolgenden Tabellen werden die Belege hierzu liefern.

Bemerkung verdient, daß wenn man Resultate über die Windrichtung in einer größeren Landstrecke wie Deutschland aus Beobachtungen an einzelnen Orten ableiten will, man sich hüten muß, dazu Beobachtungen anzuwenden, welche in Thälern und Gebirgsgegenden angestellt sind, da hier die Localverhältnisse so viele Modification in das allgemeine Gesetz bringen können, daß sich nicht mit Sicherheit allgemeine Resultate aus solchen Beobachtungen ziehen lassen. Schöbler beweist dies näher durch Vergleichung von Windbeobachtungen, welche im Jahr 1827 in mehreren Gegenden Württembergs, eines von Thälern und Bergketten durchschnittenen Landes, gleichzeitig angestellt worden sind, wo sich für die verschiedenen Orte abnehmend von einander abweichende Resultate ergeben.

Deshalb wählte Schöbler mit Bedacht zur Herleitung obiger Resultate zwei Orte, welche nach allen Seiten frei dem Winde ausgesetzt sind. Die 14jährigen Beobachtungen im südlichen Deutschland wurden nämlich zu Wöringen (48° 29' N. B. und 27° 11' Länge) auf dem Plateau der schwäbischen Alp, 2867 Pariser Fuß über dem Meere, in einer, dem Zuge der Winde ringsum nirgends ein Hinderniß entgegensetzenden, Gegend vom Pfarrer Spölin in den Jahren 1764 — 1778; die 30jährigen Beobachtungen im nördlichen Deutschland aber in Hamburg (53° 34' N. B. und 27° 35' Länge) von Bueß angestellt.

Folgendes sind die Tabellen, welche die Schlusresultate der Berechnungen Schöbler's enthalten, welche in der Originalabhandlung noch für die einzelnen Winde specificirt und denen graphische Verzeichnungen beigelegt sind.

*) Pogg. XI. 545; XIII. 305, 419, 503, 504.

**) Schweigg. LV. 135.

***) Ebend. 144.

metrischen Beobachtungen um 9 Uhr Morgens und 3 bis 4 Uhr Nachmittags fallen;

- 6) Da die Beobachtungen bei sehr ungünstigem Wetter, Nebel, Schnee, Regen, Wind angesetzt wurden, so erhellt, daß diese das Phänomen der Variation der Bergeshöhe nicht verhindern.

Diese Resultate zeigen mit großer Bestimmtheit einen Zusammenhang des Phänomens mit dem Gange der Temperatur an.

Einfluß der Windesrichtung. Dove *) bemerkt, daß in der gemäßigten Zone, da die Atmosphäre hier nicht im Zustande des Gleichgewichtes sei, das barometrische jährliche Mittel für den Einfluß der mittleren Windesrichtung corrigirt werden müsse, und schlägt zu diesem Behufe vor, statt des barometrischen Mittels die Summe der barometrischen Windmittel zu nehmen, da, wenn die Intensität gleich gesetzt wird, so lange kein Maß für dieselbe vorhanden, der Zustand des Gleichgewichtes verglichen werden kann dem Zustande der Atmosphäre, wenn alle Winde gleich lange wehen. Welchen Einfluß die Windesrichtung auf den Barometerstand haben kann, wird man durch Vergleichung nachstehender Beobachtungen erkennen können.

	Nicht corr. Barom. Mittel.	Corrig. Mittel.	Zahl der Beobachtungsjahre.
Berlin	335",14	333",19	5
Hamburg	335 ,8	335 ,86	18
Widderburg	336 ,34	336 ,22	5
Paris	335 ,85	335 ,50	10

Man sieht, daß die Correctionen fast nirgends groß ausfallen, aber doch Beachtung verdienen.

IV. Vom Winde.

Über die Abhängigkeit der atmosphärischen Electricität von der Windesrichtung nach Schädler's Untersuchungen vgl. Kapitel VIII.

Über den Einfluß der Windesrichtung auf die mittlere Temperatur vgl. Kapitel XI.

Über den Einfluß des Windes auf den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre vgl. Kapitel VII.

Über die Windverhältnisse in Europa im Allgemeinen.

Beranlaßt durch Gegenbemerkungen Schouw's (Vogg. XIV. 541) gegen die von Dove aufgestellten Ansichten über die Windverhältnisse in Europa hat letzterer in Vogg. XV. 53 eine neue Erörterung seiner Ansch-

*) Vogg. XIV. 219.

Tabelle für Hamburg.

	Verhältnisse der		Mittlere Windrichtung.
	südlichen zu den nördlichen Winden.	östlichen zu den westlichen Winden.	
Januar . . .	100 : 60	100 : 158	60° 55' ober SW
Februar . . .	100 : 63	100 : 203	68 12 — SW
März	100 : 135	100 : 119	136 22 — SW
April	100 : 127	100 : 109	145 48 — SW
Mai	100 : 167	100 : 124	141 52 — SW
Juni	100 : 172	100 : 286	109 28 — SW
Juli	100 : 76	100 : 322	89 31 — SW
August	100 : 70	100 : 280	78 23 — SW
September . .	100 : 77	100 : 226	78 31 — SW
October	100 : 40	100 : 155	57 43 — SW
November . . .	100 : 47	100 : 170	49 45 — SW
December . . .	100 : 50	100 : 163	45 41 — SW
Mittel	100 : 81,9	100 : 178,7	77 42 — SW

Einfluß der Windrichtung auf den Druck der trockenen Luft und des atmosphärischen Wasserdampfes, so wie auf den ganzen Barometerstand, von Dove*).

Dove hat aus dreißährigen Beobachtungen Daniell's, mit seinem Schwefelätherhygrometer in London angestellt, folgende allgemeine Resultate abgeleitet, für die es allerdings wünschenswerth wäre, noch ausgebehntere Bestätigungen an anderen Orten und für mehrere Jahre zu erhalten, um ihre Allgemeinheit sicher verbürgen zu können.

- 1) Die Abhängigkeit des Druckes der trockenen Luft **) und der Elasticität des Dampfes in der Atmosphäre von der Windesrichtung ist eine umgekehrte, indem den Winden, welchen ein höherer Grad des Druckes der trockenen Luft entspricht, zugleich ein niedrigerer Grad der Elasticität des Dampfes entspricht.
- 2) Der größte Druck der trockenen Luft und die kleinste Elasticität des Dampfes entspricht nach den Daniell'schen Beobachtungen dem Nordostwinde, der kleinste Druck der trockenen Luft und die größte Elasticität des Dampfes dem Südwinde. In dem Maße als sich der

*) Pogg. XVI. 385; XXIV. 311.

**) d. h. des barometrischen Druckes nach Abzug des Druckes, welcher zufolge der Angabe des Hygrometers auf Rechnung der in der Luft vorhandenen Wasserdämpfe zu schreiben ist.

Wind von Süd durch West nach Nordost dreht, steigt der Druck der trockenen Luft und fällt die Elasticität des Dampfes; in dem Maße, als sich der Wind von Nordost durch Ost nach Süd dreht, findet das umgekehrte Statt:

- 3) Auf der Westseite der Windrose nimmt der Druck der trockenen Luft im Laufe des Tages zu, auf der Ostseite ab; während die Elasticität des Dampfes das umgekehrte Verhältniß befolgt.
- 4) Auf der Westseite ist das Wachsthum des Druckes der trockenen Luft im Laufe des Tages größer als die Abnahme der Elasticität des Wasserdampfes, und auf der Ostseite die Zunahme der Elasticität des Wasserdampfes geringer, als die Abnahme des Druckes der trockenen Luft; daher steigt das Barometer, welches beide Veränderungen zugleich anzeigt, mit westlichen Winden und fällt mit östlichen.
- 5) Die Differenz der Elasticität des Wasserdampfes zwischen nördlichen und südlichen Winden ist im Sommer größer als im Winter; dasselbe gilt von der Differenz des Druckes der trockenen Luft zwischen diesen Winden.

Die tabellarischen Belege zu diesen Sätzen findet man in Pogg. XVI. 288 und 290.

Über den verschiedenen Einfluß, den die Windesrichtung in den verschiedenen Klimaten auf den Stand des Barometers hat, bringt Dove (Pogg. XXIV. 211) folgende allgemeine Resultate bei.

Für die heiße Zone zeigt die in Pogg. XIII. 588 von Dove mitgetheilte barometrische Windrose für Calcutta, daß die in den Wintermonaten wehenden Winde zur Erhebung des Barometerstandes, die in den Sommermonaten herrschenden zur Erniedrigung desselben wirken.

In der gemäßigten Zone sind erhebende Winde in den wärmeren Monaten die vorherrschenden, deprimirende im Winter. Dove bezieht sich hiesel auf die Bestimmung des Einflusses des Windes auf den Barometerstand, die er für Paris (Pogg. XI. 583 oder XXIV. 112) gegeben hat.

Für die kalte Zone hat Dove durch Berechnung der barometrischen Windrosen für Melville-Insel, Winter-Insel, Port-Bowen u. a. Orte der Parry'schen Expeditionen folgende Sätze ermittelt:

- 1) der Wind hat auf das Barometer einen unerheblichen Einfluß;
- 2) seine Richtung ist innerhalb der jährlichen Periode sehr geringen Änderungen unterworfen;
- 3) während die mittlere Windesrichtung in Port-Bowen auf die Südostseite fällt, in Melville dagegen auf die Nordwestseite, stimmt doch der Gang der monatlichen barometrischen Mittel an beiden Orten überein.

Formeln für die Abhängigkeit des Druckes der trockenen Luft, der Elasticität des atmosphärischen Wasserdampfes und des Barometerstandes von der Windrichtung, von Dove *).

Dove legt hierfür ähnliche empirische Formeln zu Grunde, als man für die Abhängigkeit des Barometerstandes und Thermometerstandes von der Zeit anzunehmen pflegt, und zeigt durch Vergleichung mit vorhandenen Beobachtungen, daß sie denselben hinlänglich genügen.

Es bezeichne x den vom Nullpuncte der Windrose (von N. nach D.) in ihr gerechneten Winkel, p_x den zugehörigen Druck der trockenen Luft in der Atmosphäre, e_x die zugehörige Elasticität des Wasserdampfes in der Atmosphäre, B_x den zugehörigen Barometerstand, $= p_x + e_x$, die übrigen Größen in nachfolgenden Formeln Constanten, die aus den Beobachtungen zu bestimmen sind, so ist:

$$p_x = a + a' \sin(x + \alpha') + a'' \sin(2x + \alpha'')$$

$$e_x = b + b' \sin(x + \beta') + b'' \sin(2x + \beta'')$$

$$B_x = c + c' \sin(x + \gamma') + c'' \sin(2x + \gamma'')$$

Die dritte Gleichung ist aus den beiden ersten unmittelbar gegeben, indem man hat:

$$c = a + b$$

$$c' \cos \gamma' = a' \cos \alpha' + b' \cos \beta'$$

$$c' \sin \gamma' = a' \sin \alpha' + b' \sin \beta'$$

$$c'' \cos \gamma'' = a'' \cos \alpha'' + b'' \cos \beta''$$

$$c'' \sin \gamma'' = a'' \sin \alpha'' + b'' \sin \beta''$$

Dove hat die Constanten in den obigen Formeln aus den Daniell'schen Beobachtungen (für London und englisches Maß) bestimmt, wo dann die Formeln zu folgenden werden:

$$p_x = 29^{\circ}.52387 + 0^{\circ}.18314 \sin(x + 58^{\circ} 16')$$

$$+ 0^{\circ}.05373 \sin(2x + 290^{\circ} 43')$$

$$e_x = 0^{\circ}.36687 + 0^{\circ}.06675 \sin(x + 254^{\circ} 58')$$

$$+ 0^{\circ}.01172 \sin(2x + 123^{\circ} 41')$$

$$B_x = 29^{\circ}.89075 + 0^{\circ}.12089 \sin(x + 49^{\circ} 10')$$

$$+ 0^{\circ}.04239 \sin(2x + 287^{\circ} 9')$$

Eine Vergleichung der hienach berechneten Werthe mit den beobachteten Mittelwerthen ist in folgender Tabelle enthalten, wo jedoch der Kürze halber statt der beobachteten Werthe selbst bloß die Differenzen derselben von den berechneten beigelegt sind.

*) Pogg. XVI. 266. Vergl. hiebei frühere Untersuchungen von Dove in Pogg. XI. 545.

	Berechnete Werthe.			Unterschied der beobachteten und berechneten Werthe.		
	P_x	e_x	B_x			
N.D.	29,7211	0,3027	30,0238	-0,005	+0,004	-0,004
D.	29,6704	0,3398	30,0103	+0,004	-0,006	-0,002
Ö.D.	29,4523	0,4066	29,8694	0,000	+0,007	+0,007
Ö.	29,3179	0,4409	29,7588	-0,004	-0,005	-0,009
Ö.B.	29,3546	0,4180	29,7827	+0,005	-0,000	+0,005
B.	29,4778	0,3744	29,8522	-0,004	+0,006	+0,001
W.B.	29,5469	0,3401	29,8871	0,000	-0,006	-0,006
W.	29,6293	0,3123	29,9417	+0,004	+0,004	+0,008

Die Geringfügigkeit der Differenzen spricht allerdings für die Anwendbarkeit der Formeln.

Überhaupt muß bemerkt werden, daß die Abhängigkeit der obgenannten Umstände von der Windesrichtung eine verschiedene ist, je nach den Jahreszeiten, so daß, wenn man diese Abhängigkeit nicht für das Mittel des ganzen Jahres, sondern für gewisse Jahreszeiten bestimmen will, die Constanten für dieselben besonders zu bestimmen sind, wie Dove (in der Originalexhandlung) für die 4 Jahreszeiten nach den Daniell'schen Beobachtungen gethan.

Einfluß des Mondes auf die Windesrichtung.

Schäbler hat in seiner Schrift: „Untersuchungen über den Einfluß des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre“ auch den Einfluß des Mondes auf die Windesrichtung untersucht, indem er dabei 16jährige Beobachtungen, von 1813 — 1828 zu Augsburg angestellt, zu Grunde legte. Die Hauptresultate sind in folgenden zwei Tabellen enthalten*). Hier sind zu den nördlichen Winden gerechnet: NW., N. und ND., zu den westlichen SW., W. und NW. u. f. w.; und die mittlere Windesrichtung ist nach Lambert's Formel berechnet.

Am Tage des	Verhältniß der nördlichen zu den südlichen Winden.	Verhältniß der östlichen zu den westlichen Winden.	Mittlere Windrichtung.
Neumonds . .	100 : 108,4	100 : 120,4	19° 0' oder ÖSW.
1ten Viertels .	100 : 108,8	100 : 149,4	55 58 oder ÖWB.
2ten Octanten .	100 : 118,8	100 : 160,4	78 34 oder WÖ.
Vollmondes . .	100 : 106,9	100 : 159,2	85 37 oder nahe W.
letzten Viertels	100 : 98,8	100 : 112,8	90 0 völlig W.

*) Im Original sind auch Tabellen für die einzelnen Winde vorhanden, von denen die oben gegebenen Tabellen nur die Zusammenfassung sind.

In den Tagen	Verhältniß der nördlichen zu den südlichen Winde.	Verhältniß der östlichen zu den westlichen Winde.	Mittlere Winde-richtung.
der Erndthe . .	100 : 138,0	100 : 142,3	72° 28' ober NNE.
am folgenden Tag	100 : 93,8	100 : 160,5	90 10 ober N.
der Erderne . .	100 : 138,0	100 : 147,4	54 8 ober ENE.
am folgenden Tag	100 : 104,7	100 : 123,0	78 16 ober NE.
2 Tage nachher	100 : 100,0	100 : 119,4	97 46 ober NE.
3 Tage nachher	100 : 88,0	100 : 107,8	126 14 ober NNE.

Zufolge der ersten Tabelle nehmen die südlichen und westlichen Winde bis zum zweiten Octanten zu, wo sie am häufigsten weheten, wurden dagegen zur Zeit des letzten Viertels am seltensten, wo dagegen verhältnißmäßig die meisten nördlichen und östlichen Winde weheten. Die allgemeine mittlere Winde-richtung war beim Neumond am südlichsten, erhielt zur Zeit des zweiten Octanten beim Maximum des Regens eine mehr südwestliche Richtung, wurde mit dem Vollmond beinahe West und fing mit dem letzten Viertel an, in eine etwas nordwestliche Richtung überzugehen.

Zufolge der zweiten Tabelle hatten die Winde einen Tag nach der Erndthe am häufigsten eine westliche Richtung; am Tage der Erndthe selbst hatten sie noch mehr eine südwestliche Richtung, die wenigsten westlichen und relativ die meisten östlichen Winde weheten einige Tage nach der Erderne, an welchen Tagen die Winde zugleich eine mehr nördliche Richtung annahmen.

V. Hygrometrischer Zustand der Luft.

Abhängigkeit des atmosphärischen Feuchtigkeitszustandes von der Zeit und der Höhe, von Dove *).

Dove hat theils aus Saussure's, theils aus Daniell's Beobachtungen, theils aus Beobachtungen Deluc's in seinen Idées sur la météorologie und Dalton's in den Manch. Mém. 1824, folgende Bestimmungen über die von der Zeit oder Höhe abhängigen Veränderungen des Feuchtigkeitszustandes der Atmosphäre abgeleitet. Wir werden in Folgendem unter relativem Feuchtigkeitsgrade oder relativem Feuchtigkeitszustande den, vom Haarygrometer angezeigten, Grad der Feuchtigkeit verstehen, der mithin nicht die absolute Quantität der Feuchtigkeit,

*) Pogg. XVI. 383. über die Abhängigkeit von der Winde-richtung vgl. S. 40.

sondern nur die größere oder geringere Annäherung derselben an den Sättigungszustand für die bestehende Temperatur bezeichnet. Die tabellarischen Belege sind zuletzt beigelegt. (Für Saz 9), 10), 11) bezieht sich der Verfasser auf nicht beigelegte Beobachtungen der genannten Beobachter).

- 1) Das Maximum der relativen Feuchtigkeit fällt (nach Saussure) in der Ebene in der Regel eine Stunde nach Sonnenaufgang, das Minimum um 3 oder 4 Uhr Nachmittags. Der Gang der täglichen relativen Feuchtigkeitsänderungen ist mithin der umgekehrte, als der thermischen (Tabelle I.).
- 2) Die täglichen Veränderungen des relativen Feuchtigkeitszustandes sind gleich den Temperaturveränderungen im Winter am kleinsten, heißen aber im Frühjahr noch bedeutender zu sein als im Sommer (Tabelle I.).
- 3) Auch in Bezug auf die jährlichen Perioden entsprechen der wärmern Jahreszeit im Allgemeinen höhere Grade des relativen Feuchtigkeitszustandes, der kältern geringere (Tabelle I.).
- 4) Die Elasticität des Dampfes in der Atmosphäre ist in der Ebene in den Frühlingsmonaten (Februar, März, April, Mai) des Morgens größer als Nachmittags, in allen übrigen Monaten des Morgens kleiner als Nachmittags, während der Druck der trocknen Luft (zu gleichen Tageszeiten beobachtet) durch das ganze Jahr größer Vormittags als Nachmittags ist. Mithin erfolgen in diesen übrigen Monaten die Änderungen des Druckes der trocknen Luft und der Elasticität des Dampfes nach entgegengesetzter Richtung, und es sind in diesen Monaten, so wie auch im jährlichen Mittel die täglichen Veränderungen des ganzen Barometerstandes geringer, als die Änderungen des Druckes der trocknen Luft (Tabelle II.).
- 5) Bei Sonnenaufgang nimmt der relative Feuchtigkeitsgrad mit Erhebung über das flache Land ab, und zwar im Sommer stärker als im Winter (Tabelle III.).
- 6) Nachmittags um 2 Uhr nimmt, außer im Januar und Februar, der relative Feuchtigkeitsgrad mit Erhebung über die Erdoberfläche zu (Tabelle III.).
- 7) Unter Voraussetzung, daß das Mittel der Beobachtungen bei Sonnenaufgang und um 2 Uhr den mittlern relativen Feuchtigkeitszustand angiebt, nimmt dieser das ganze Jahr hindurch nach der Höhe ab, außer im Frühling (März, April, Mai) (Tabelle III.).
- 8) Sowohl die täglichen als jährlichen Veränderungen des relativen Feuchtigkeitszustandes nehmen ab mit zunehmender Höhe (Tabelle III.).
- 9) Überall, wo eine dichte Wolke oder ein Nebel sich befindet, ist der Hauptpunct des Daniell'schen Hygrometers gleich der Temperatur der Atmosphäre, die Luft mithin mit Feuchtigkeit gesättigt.
- 10) Wenn ein Gebirge ganz oder größtentheils durch einen Nebel einge-

hört ist, so ist der Unterschied zwischen der Lufttemperatur und dem Thaupunkte gering.

- 11). Die mittlere Wärmeabnahme der Atmosphäre ist 1° F. für 240 Fuß in den wärmsten Stunden des Tages, während die mittlere Abnahme des Thaupunktes 1° F. für 390 Fuß ist.

Die Ursache der Erscheinung, daß es (in der Ebene) Zeiten giebt, wo die Elasticität und relative Menge des in der Luft enthaltenen Wasserdampfes abnimmt, während die Temperatur und mit ihr die Verdunstung doch zunimmt (1 und 4), scheint in dem aufsteigenden Luftstrom gesucht werden zu müssen. Wenn nämlich die am Boden erwärmte Luft als specifisch leichter in die Höhe steigt, so läßt sich einsehen, wie, wenn diese Strömung recht lebhaft ist, dadurch mehr Feuchtigkeit nach Oben abgeführt werden kann, als durch die gesteigerte Verdampfung ersetzt wird, was ganz in Übereinstimmung mit 6) ist, wonach nämlich in der wärmsten Tageszeit die Feuchtigkeit mit der Höhe zunimmt, während sie bei Sonnenaufgang und überhaupt im Mittel (nach 5) und 6) mit der Höhe abnimmt.

Tabelle I.

Enthaltend die Mittel aus 34jährigen Beobachtungen von 1818 bis 1825 mit dem Faarhygrometer in Paris; wo — Stiegen, + Fallen bedeutet.

	Mittel		3 Uhr Nachm.		9 u. M.		3 u. N.		9 u. N.	
	Hygro- meter.	Therm. C.	Hygro- meter.	Therm. momet.	Hygro- meter.	Thermo- meter.	Hygro- meter.	Thermo- meter.	Hygro- meter.	Thermo- meter.
Januar	83,2	3,3	81,5	4,4	+ 8	- 2,3	- 8,3	+ 2		
Februar	81,7	4,8	76	6,7	+ 14,2	- 3,2	- 18	+ 3		
März	74,9	7,9	66,1	9,7	+ 15,5	- 2,9	- 16,7	+ 3,7		
April	67,1	12,9	57,3	14,9	+ 14,7	- 2,9	- 21,1	+ 4,2		
Mai	69,4	18,2	62,3	17,9	+ 9,7	- 2,1	- 17	+ 4,6		
Juni	67,4	19,2	60	21,1	+ 9,1	- 2,4	- 18,1	+ 5,0		
Juli	62,3	20,8	59,6	22,5	+ 11	- 2,4	- 17,5	+ 5,0		
August	69,8	21,1	61,5	23,1	+ 9,8	- 2,7	- 17,4	+ 5,1		
Sept.	74,1	17,9	64,3	20,1	+ 13,6	- 3,2	- 19,6	+ 5,0		
October	83,1	12,9	73,9	14,7	+ 15,6	- 2,3	- 16,6	+ 4,2		
Nov.	88,4	8,3	82,8	9,7	+ 10,3	- 2,8	- 9,1	+ 2,5		
Decemb.	88,8	4,8	85	5,9	+ 6,9	- 2,3	- 6,6	+ 1,8		

Tabelle II.

Extrakt aus *Sitzberichten*, von Dr. F. B. in Bern, aus einem Hygrometer angestellten Beobachtungen, nach der von ihm in seinem Nat. Anz. p. 157 angegebenen Tabelle, in englischem Maße.

	Mittel		Druck der trockenen Luft			Elast. des Dampfes		
	trockene Luft	Dampf	Morgens	Nachmittags	Abends	Morgens	Nachmittags	Abends
Jan.	29,672	0,251	29,682	29,668	29,679	0,247	0,256	0,251
Febr.	809	0,257	824	796	806	0,258	0,257	0,253
März	539	0,301	548	527	543	0,305	0,304	0,295
April	541	0,342	544	529	549	0,347	0,345	0,335
Mai	527	0,373	535	514	533	0,377	0,374	0,369
Juni	572	0,449	583	553	581	0,447	0,461	0,439
Juli	382	0,495	390	369	386	0,494	0,502	0,490
Aug.	377	0,514	381	353	392	0,513	0,526	0,504
Sept.	452	0,469	447	425	485	0,476	0,480	0,452
Okt.	403	0,369	409	382	419	0,373	0,379	0,357
Nov.	461	0,316	467	445	472	0,314	0,323	0,310
Dec.	403	0,292	410	393	405	0,284	0,293	0,293

enthaltend die Mittel aus 4jährigen Beobachtungen von 1822 bis 1825 mit dem Saaryhygrometer in Genf und auf dem St. Bernhard.

	Sonnenaufgang			Nachmittag 2 Uhr			Mittel		
	Genf.	Bernsharb.	Unterschied.	Genf.	Bernsharb.	Unterschied.	Genf.	Bernsharb.	Unterschied.
Januar	93,4	86,8	+ 6,6	86,0	82,5	+ 3,5	89,7	84,6	+ 5,1
Februar	93,0	87,8	+ 5,2	80,9	80,5	+ 0,4	86,9	84,1	+ 2,8
März	98,7	86,3	+ 2,4	74,4	81,5	+ 7,1	81,5	83,9	- 2,4
April	91,5	85,5	+ 6,0	72,3	82,3	- 10	81,9	88,9	+ 2,0
Mai	92,6	85	+ 7,6	71,0	81,3	- 10,3	81,8	83,4	- 1,6
Juni	93,8	83,5	+ 10,3	71,5	79	- 7,5	82,6	81,2	+ 1,4
Juli	94,1	83,3	+ 10,8	71,4	80,8	- 9,4	82,7	82,0	+ 0,7
August	94,7	85,5	+ 9,2	74,6	83,5	- 8,9	84,6	84,5	+ 0,1
September	96	85,5	+ 10,5	77,9	80,5	- 2,6	86,9	83	+ 3,9
October	95,9	86	+ 9,9	82,3	83	- 0,7	89,1	84,5	+ 4,6
November	93,6	85,3	+ 8,3	79,8	83,8	- 4	86,8	84,5	+ 2,3
December	91,6	88,5	+ 3,1	86,2	87,1	- 0,9	89	87,8	+ 1,2

VI. Wässerige Niederschläge aus der Atmosphäre.

Regenmesser oder Syetometer.

Ein Syetometer von Hörner findet sich beschrieben und abgebildet in Schweigg. J. LIX, 363 ein anderes von Schrön im Laboratorium, Bismarck Fest. XIII. Abt. III. Da die Beschreibung und Abbildung von beiden zu viel Raum einfordern würde, so verweise ich hinsichtlich derselben auf die Originalabhandlungen. Auch Adam hat in Bertram's Edinburgh. J. of sc. 1830. July. 53 ein Syetometer beschrieben und abgebildet, welches jedoch keine sonderlichen Vorzüge zu besigen scheint.

Regenmenge in verschiedenen Höhen.

Wenn man das Regenmesser in verschiedenen Höhen aufstellt, so findet man die Quantität des gesammten Regens größer in den unteren als in den oberen. (S. 12.) *) stellt in diesem Bezuge folgende Beispiele zusammen.

Bugge (Nye Samling af Kiøbenhavn Vidensk. Selskabs Skrifter, Bind II. p. 227) fand folgende Regenhöhen:

1783 in 7 Monaten im Garten 1250**)	120' höher	951
1784 — 12 — — — — — 2468	—	2140
1785 — — — — — — — — — 2804	—	2274
1786 — — — — — — — — — 2671	—	1921
1787 — — — — — — — — — 2985	—	2193
1788 in 6 Monaten — — — — — 944	—	650

So daß auf eine Höhe von 120' eine Zunahme von $\frac{1}{4}$ des Ganzen kommt. Heberden (Philosoph. transact. Vol. LIX. p. 1) sagt, daß die Mengen des Wassers, welches nach Angabe des Syetometer auf die Westminsterabtei in London, auf ein Haus ganz in der Nähe derselben und 15,6 tiefer herabfiel, sich wie 3 : 8 : 10 verhielten. In Paris fällt im Hofe des Observatoriums 664^m, 72, auf der Terrasse 23^m höher 482^m, 41 Regen, also $\frac{1}{10}$ mehr auf 58' (Bouvard, Mémoire sur les observations météorologiques faites à l'observatoire royal de Paris, p. 41 seq.)

über den Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge aus der Atmosphäre.

Schäbler hat hierüber in seiner S. 43 erwähnten Schrift ausführliche Untersuchungen mitgetheilt, wovon wir uns begnügen, die in Worten ausgesprochenen Resultate nebst einigen tabellarischen Belegen auszugiehn,

*) Pogg. XVII. 471.

**) In $\frac{1}{4}$ Theilen des Pariser Cubitzollens ausgebrächt.

Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge. 49

mit der Bemerkung, daß in der Originalschrift noch viele andere Tabellen und instructive graphische Darstellungen beigelegt sind, die wir hier nicht alle mittheilen können. Daß für manche der nachfolgenden Resultate die Zahl der Beobachtungen, aus denen sie abgeleitet sind, bis jetzt noch zu gering ist, um ihnen jetzt schon völlige Sicherheit beilegen zu können, bedarf wohl keiner Erinnerung. Die Resultate sind fast sämmtlich (außer wo es bemerkt ist) aus 28jährigen Beobachtungen hergeleitet, während welcher Zeit 4298 Niederschläge fielen.

Von diesen Beobachtungen wurden 16jährige zu Augsburg von Starf in den Jahren 1813 bis 1828 angestellt, 4jährige in den Jahren 1809 bis 1812 in Stuttgart, theils vom Verfasser selbst, theils von seinem Bruder, endlich 8jährige in den Jahren 1781 bis 1788 in München, welche in den Mannheimer meteorologischen Ephemeriden im Druck erschienen sind.

1) Das Maximum des Regens aus allen Beobachtungen des Jahres fällt nahe hin in die Mitte zwischen das erste Viertel und den Vollmond in den zweiten Octanten; die Neigung zu Niederschlägen vermindert sich mit dem Vollmond und zunächst nach diesem, anfangs langsamer, dann schneller; das Minimum der Niederschläge liegt zwischen dem letzten Viertel und vierten Octanten, von da an nimmt die Regenmenge wieder langsam gegen den Neumond zu, vermehrt sich am langsamsten gegen den ersten Octanten, schneller gegen das erste Viertel, wo sie ihrem gegen den zweiten Octanten eintretenden Maximum zueilt.

2) Der Zeitraum der abnehmenden Regenmenge vom Maximum zum Minimum ist im Mittel etwas kürzer, als der Zeitraum der zunehmenden Regenmenge, nach den mittlern Jahresresultaten im Verhältniß von 14 : 13 oder $\approx 7 : 9$; (auch die Beobachtungen von Flaugergues gaben für das monatliche periodische Steigen und Fallen des Barometers ein entsprechendes verschiedenes Verhältniß; es steigt schneller und fällt langsamer).

3) Das mittlere Maximum des Regens aus allen Jahreszeiten fällt auf den zweiten Octanten, bei Annäherung zu den Solstitien entfernt es sich von dieser mittlern Richtung in entsprechendem Verhältniß nach beiden Seiten, in den Sommermonaten rückt es dem Vollmond, in den Wintermonaten dem ersten Viertel näher, im Sommerföstitium selbst fällt es mit dem Vollmonde, im Winterföstitium nahe hin mit dem ersten Viertel zusammen.

4) Der Eintritt des mittlern Minimums des Regens zeigt in den verschiedenen Jahreszeiten entsprechende Verschiedenheiten, es nähert sich im Sommer mehr dem Neumonde, in der Mitte des Winters mehr dem letzten Viertel.

5) Das Maximum des Regens im Sommer ist gerade um die Hälfte eines synodischen Umlaufes von dem Eintritte des Minimums entfernt. Ersteres fällt zur Zeit des Vollmondes, letzteres zur Zeit des Neumondes.

III. Einfluss des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederf.

1) Das Maximum des Regens im Winter tritt einem Monat vorregelmässig gegenüber, beginnt sich dem letzten Viertel des Monats annähernd gleichmässig mit steigendem Fortschritt zu nähern (s. Taf. 1).

2) Im Sommer tritt zur Zeit des Vollmonds an den Tagen 1 und 2 während der Sommermonate ein kleines Maximum des Regens ein, welches in der Mitte des Sommers nicht bemerkt wird: der Regen in den Sommermonaten ganz kurz vor Ende des Jahres vermindert, dessen Wirkung im Winter geringer ist. Im Sommer bestehend, im Winter der Neumond im ersten (letzten), und sich mit dem wechselnden Verlaufe der Wirkung des Neumonds verändernd in Beziehung steht: es war gleich nach der Annahme zum Vollmonde während eines ersten Grades im Winter, im Sommer während eines ersten Grades im Sommer gerade um den ersten folgenden d. letzten Grades vermindert sein.

3) Das Maximum des Regens im Sommerhalbjahre (zur 3. Annahme) ist von dem Maximum des Regens zur Zeit des Vollmonds (zur Zeit des ersten Viertels) nahe bis um $\frac{1}{2}$ des Maximums entfernt: in entsprechendem Verhältnisse stehen im Sommer Minimum des Regens vom Sommer (im Neumond) bis zum ersten Viertel. Nach der Annahme des Regens (nach sich um $\frac{1}{2}$ des Maximums entfernt) zu sehen: es ist aber so bestimmt und eine, den Beobachtungen gemäss, dass kein Grund vorhanden ist, an der Regel zu zweifeln.

4) Betrachtet man den jährlichen Verlauf des Mondes seiner verschiedenen Regenmenge entsprechend in zwei Hälften, so fällt im Mittel der Regen in die Hälfte vom ersten Decanzen durch das erste Viertelmond bis zum dritten Decanzen (den letzten Tag noch dazu gerechnet) der wenigste Regen fällt dagegen in der andern Hälfte vom dritten Decanzen durch das letzte Viertel, Neumond bis zum ersten Decanzen. Die Menge der Regentage während der einen Hälfte verhält sich zur der Regentage während der andern Hälfte = 100 : 111. Die Regenmenge fällt daher im Mittel während des zunehmenden Mondes sich jedoch nach einige Tage nach dem Vollmonde fort.

10) Die Schwankungen vieler grössern und geringeren monatlichen Grösse sind in den verschiedenen Jahreszeiten einem dem Maximum Minimum entsprechenden Wechsel unterworfen. Im Sommer fällt der Regen von der Mitte zwischen dem ersten Decanzen und ersten Viertel, den Vollmond bis zur Mitte zwischen dem dritten Decanzen und Viertel; in der Mitte des Winters fällt umgekehrt der meiste Regen der Hälfte, in welche der Neumond fällt, in die Hälfte vom dritten Decanzen durch den Neumond und das erste Viertel bis zum dritten Decanzen. Im Sommer verhält sich die Zahl der Regentage in der kleineren Hälfte zur grössern = 100 : 110,3, im Winter = 100 : 107.

Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge. 61

11) Die meisten vollkommen heitern Tage fanden zur Zeit des letzten Viertels statt; die meisten vollkommen trüben zur Zeit des zweiten Octanten, und nächst diesem zur Zeit des Vollmondes; das meiste meteorische Wasser (quantitativ bestimmt) fiel zur Zeit des zweiten Octanten, das wenigste zur Zeit des letzten Viertels; die am Tage des zweiten Octanten gefallene Regenmenge verhält sich zur Regenmenge am Tage des letzten Viertels = 100 : 136. Folgende, aus 16jährigen Beobachtungen abgeleitete, Tabelle wird dies näher erläutern:

In den Tagen	Zahl der heiteren Tage.	Zahl der trüben Tage.	Verhältniß der trüben zu den heiteren Tagen.	Regenmenge	
				Regentage.	Menge des Regens in Par. Lin.
des Neumonds .	31	61	= 100 : 52	95	298,89
ersten Viertels .	38	57	= 100 : 66	92	276,55
zweiten Octanten	25	65	= 100 : 38	97	301,44
Vollmondes . . .	26	61	= 100 : 42	96	278,36
letzten Viertels .	41	53	= 100 : 77	76	220,90

12) Es findet eine größere Neigung zu Niederschlägen zur Zeit der Erdnähe als zur Zeit der Erdferne Statt, obgleich die Wirkung des anomalistischen Umlaufes weniger stark zu sein scheint, als die des synodischen. Der meiste Regen fällt am Tage der Erdnähe, der wenigste zwei Tage nach der Erdferne, die mittlere, am letzten Tage fallende, Regenmenge verhält sich zur mittlern Regenmenge am Tage der Erdnähe = 100 : 118,9.

13) Der vorige Satz gilt für das allgemeine Mittel der Beobachtungen. Auch wenn man die Beobachtungen bloß aus den Jahren zusammennimmt, wo die Erdnähe bei südlicher, die Erdferne bei nördlicher Abweichung eintritt, fallen die Regentage häufiger bei der Erdnähe als bei der Erdferne; das Verhältniß war hier (nach 12jährigen Beobachtungen) = 111,2 : 100. Nimmt man dagegen die Beobachtungen bloß aus den (wenigen) Jahren zusammen, wo die Erdnähe bei nördlicher, die Erdferne bei südlicher Abweichung eintritt, so erhält man ein entgegengesetztes Resultat, indem sich hier die Zahl der Regentage während der Erdferne im Verhältniß von 100 : 94,5 stärker zeigt, als während der Erdnähe. Die Ursache dieser Abweichung vom allgemeinen Mittel scheint sich einfach aus dem Umstande zu erklären, daß in Jahren, in welchen die Erdferne bei südlicher Abweichung eintritt, zugleich auch der Vollmond (die Zeit des Maximums der monatlichen Regenmenge im Sommer) in die Nähe der Erdferne fällt, wodurch bei der mächtigern Einwirkung des Vollmondes sich die Regenverhältnisse leicht auf diese Art abändern können. In den (sieben) Jahren, während welcher die Erdnähe und Erdferne mehr in der

52 Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge

Nähe des Äquators eintreten, verhält sich die Zahl der Regentage zur Zeit der Erdferne zur Zahl der Regentage zur Zeit der Erdnähe $\equiv 100 : 116,4$

Die Apfiden scheinen hiernach die größte Wirkung auf unsere Atmosphäre zu besitzen, wenn sie in der Nähe des Äquators eintreten.

14) In den (zwoölf) Jahren, wo die Erdnähe während südlicher Abweichung und die Erdferne während nördlicher Abweichung eintritt, vermehrte sich die Zahl der Regentage beim Durchgange durch die Erdnähe dem Verhältnisse von 100 : 102,8, verminderte sich dagegen beim Durchgange durch die Erdferne in dem Verhältnisse von 100 : 90,4 (wobei die Summen der Regentage in den zwei der Erdnähe und Erdferne zunächst vorausgehenden und folgenden Tagen zur Vergleichung gewählt sind). In den Jahren bei nördlich eintretender Erdnähe und südlich eintretender Erdferne zeigte sich zwar gleichfalls am Tage der Erdnähe selbst eine Zunahme der Regenmenge; im Ganzen war jedoch die Wirkung weit geringer und die mittlere Zunahme an dem zur Vergleichung angewandten Tage nur $\equiv 100 : 100,2$; bei der Erdferne war die Verminderung der Regentage gleichfalls geringer, sie verminderte sich in dem Verhältnisse von 100 : 98,1.

15) Die Apfiden wirken in den sechs Sommermonaten (April bis September) stärker und regelmäßiger auf die Veränderungen in unserer Atmosphäre, als in den sechs Wintermonaten (Oktober bis März); die mittlere Zahl der Regentage in den drei zunächst auf die Erdferne folgenden Tagen verhielt sich zur Zahl der Regentage in den drei zunächst auf die Erdnähe folgenden:

im Sommer $\equiv 100 : 125,7$,

im Winter $\equiv 100 : 107,1$.

Die Zahl der Regentage vermehrte sich beim Durchgange durch die Erdnähe im Sommer in dem Verhältnisse von 100 : 111,4; sie vermehrte sich dagegen bei der Erdferne in dem Verhältnisse von 100 : 88,4. Beide Verhältnisse sind bedeutend größer, als die oben aus dem Mittel der Beobachtungen aller Jahreszeiten erhaltenen; in den Wintermonaten verminderte sich die Zahl der Niederschläge beim Durchgange des Mondes durch seine Erdferne nur in dem Verhältnisse von 100 : 98,5 und bei der Erdnähe trat nur am Tage der Erdnähe selbst einige Vermehrung der Regenmenge ein.

16) Vergleichen wir die im Mittel auf 100 Erdnähen und Erdfern des Mondes erfolgenden Niederschläge nach den aus dem Mittel der zu zunächst angrenzenden Tage berechneten Mittelzahlen, so ergeben sich zu schon Sommer und Winter entsprechende Verschiedenheiten. Es ereignet sich im Mittel

Niederschläge an 100 Tagen:	im Sommer.	im Winter.
der Erbnähe	53,9	41,7
der Erbfeme	45,9	38,5
2 Tage nach der Erbfeme	43,1	37,4
3 Tage nach der Erbfeme	39,2	37,1

In diesen Tagen der Extreme verhielt sich daher das Minimum zum Maximum der Regenmenge

im Sommer = 100 : 137,5,

im Winter = 100 : 112,4.

Werden die Tage der Erbfeme zwischen Sommer und Winter für sich verglichen, so fällt an den einzelnen Tagen im Sommer etwas häufiger Regen als im Winter, was sich genügend aus der größern Neigung zu Niederschlägen in der wärmern Jahreszeit überhaupt erklärt, ohne dem erhaltenen allgemeinen Resultate zu widersprechen.

17) Durch das Zusammentreffen der Erbnähe mit den Hauptpunkten des synodischen Umlaufes (Voll- und Neumond, die Viertel, der zweite Octant) vermehrt sich im Allgemeinen die Menge der Niederschläge, durch das Zusammentreffen mit der Erbfeme vermindert sie sich (vergl. Schaub. Seite 37).

In Übereinstimmung hiemit sind Gronau's Resultate (Kastn. R. Arch. für Met. IV. 164).

18) Die Neigung zu trüben Tagen war zur Zeit der Erbnähe bedeutend größer als zur Zeit der Erbfeme; sie war an dem auf die Erbnähe folgenden Tage selbst noch etwas größer, als zur Zeit des zweiten Octanten beim synodischen Umlauf. Das meiste meteorische Wasser fiel am Tage der Erbnähe, das wenigste zwei Tage nach der Erbfeme. Folgende Tabelle, aus 16jährigen Beobachtungen abgeleitet, wird dies näher darlegen:

An den Tagen	Zahl der heiteren Tage.	Zahl der trüben Tage.	Verhältnis der trüben zu den heiteren Tagen.	Regenmenge	
				Regen-tage.	Menge des Regens in Par. Lin.
der Erbnähe . .	32	83	100 : 33,5	109	333,49
am folgenden Tage	21	85	100 : 24,7	102	300,53
der Erbfeme . .	41	75	100 : 54,6	103	283,91
am folgenden Tage	40	72	100 : 55,5	99	277,57
zwei Tage nachher	36	56	100 : 64,3	95	247,63
drei Tage nachher	45	46	100 : 97,9	90	295,35

54 Einfluß des Mondes auf die Menge der wässerigen Niederschläge.

19) Der wenigste Regen fällt im Mittel zur Zeit des nördlichen Lunifitiums, er vermehrt sich beim Herabsteigen des Mondes durch den Äquator und wird am häufigsten zur Zeit des südlichen Lunifitiums und kurz Zeit nachher. Im Allgemeinen ist der Einfluß dieser monatlichen periodischen Veränderung des Mondes auf die Bitterung geringer, als der Einfluß des synodischen und anomalistischen Umlaufes; das Minimum der Niederschläge verhält sich zum Maximum bei dieser monatlichen Periode = $100 : 120,6$. Während des Aufsteigens des Mondes durch den Äquator fällt mehr Regen, als während des Absteigens durch denselben nach dem nördlichen Lunifitium. — Vergleicht man die Summe der Niederschläge, welche sich in den sieben Tagen ereigneten, während welcher der Mond eine aufsteigende Bewegung hatte, mit der Summe der Niederschläge an den sieben Tagen, während welchen er täglich tiefer sank, so findet man das Verhältniß der Zahlen = $103,7 : 100$.

20) Im Sommer fällt im Verhältniß von $113,6 : 100$ mehr Regen während des südlichen Lunifitiums, als während des nördlichen; im Winter fällt umgekehrt im Verhältniß von $103,6 : 100$ mehr Regen während des nördlichen als südlichen Lunifitiums. Ersteres erklärt sich aus der immer südlichen Stellung des Vollmondes im Sommer, wo das Maximum des Regens nach den oben gefundenen Verhältnissen eintritt, während das nördliche Lunifitium im Sommer in die Nähe des Neumondes fällt, wo im Mittel das monatliche Minimum des Regens eintritt; letzteres (die größere Regenmenge während dem nördlichen Lunifitium im Winter) erklärt sich aus der in dieser Jahreszeit nördlichen Stellung des Vollmondes, während der Neumond ins südliche Lunifitium fällt, welcher im Winter nur ein kleineres Maximum des Regens bildet; es erklärt sich zugleich aus diesem Umstande, warum das Verhältniß der Regenmenge bei der Lunifitien im Sommer, wo das kleinere durch den Neumond veranlaßte Minimum des Regens beinahe völlig verschwindet, bedeutend größer ist als im Winter.

Im Winter fällt bei Weitem der meiste Regen während des Aufsteigens des Mondes durch den Äquator zwischen dem südlichen und nördlichen Lunifitium, der wenigste beim Abwärtssteigen des Mondes durch den Äquator. Im Sommer fällt beim Durchgange durch den Äquator, beim Auf- und Absteigen beinahe dieselbe Regenmenge; sie ist (auf eine gleiche Anzahl Tage reducirt) geringer, als im südlichen, aber größer als im nördlichen Lunifitium.

Werden die bei verschiedener Abweichung des Mondes im Winter und Sommer und nach den in allen Jahreszeiten überhaupt sich ereignenden Niederschläge auf dieselbe Summe von je 100 Beobachtungen reducirt, so erhält man folgende Resultate, wenn der Berechnung die Menge der Niederschläge zu Grunde gelegt wird, welche sich an den Tagen des Durchganges des Mondes durch die Lunifitien und den Äquator und an dem zunächst vorausgehenden und nachfolgenden Tage ereigneten.

Zahl der Niederschläge auf 100 Beobachtungen reducirt.	Im Sommer.	Im Winter.	Mittel aus allen Jahreszeiten.
Während dem südlichen Lunistitium	46,8	38,1	42,6
Während dem Aufsteigen durch den Äquator	43,3	42,9	43,2
Während dem nördlichen Lunistitium	41,3	40,9	41,1
Während dem Absteigen durch den Äquator	43,4	37,2	40,4

Im Sommer fallen die Maxima und Minima auf die Lunistitien selbst, im Winter, wegen des überwiegenden Einflusses des synodischen Umlaufes, auf den Durchgang durch den Äquator.

21) Die Zahl der Niederschläge ist größer in den Monaten, in welchen Sonnen- und Mondfinsternisse eintreten, als in den übrigen. Die Summe der Regentage in den Monaten, in welchen die Egypten in die größte Breite des Mondes fielen, verhielt sich zur Summe der Regentage in den Monaten, in welchen sie in die Knoten fielen = 10 : 11. (Das Nähere über dieses Verhältniß s. in Schöbler S. 51 ff.).

22) Schließlich füge ich noch eine Tabelle hinzu, welche eine nähere Übersicht der mittlern Menge der Niederschläge, welche sich für die Hauptstellungen des Mondes ergeben, enthält. Die Beobachtungen sind sämtlich auf 100 reducirt.

Es erfolgten je auf 100 Tage, an welchen der Mond folgende Stellungen hatte, Regentage, nach dem Mittel der zu allen Jahreszeiten angekauften Beobachtungen:

Im Tage des Neumondes	23	Anomistischer Umlauf.
Im Tage des ersten Strahlen	24	
Im Tage des ersten Viertel	25	
Im Tage des zweiten Strahlen	26	
Im Tage des Vollmonds	27	
Im Tage des dritten Strahlen	28	
Im Tage des letzten Viertel	29	
Im Tage des ersten Strahlen	30	Anomalistischer.
Im Tage der Finsternis	31	
Im folgenden Tage	32	
Im Tage der Finsternis	33	
Im folgenden Tage	34	
Nach zwei Tagen	35	Abweichung.
Im üblichen Lunistrium	36	
Beim Aufsteigen durch den Januar	37	
Im vorläufigen Lunistrium	38	
Beim Aufsteigen durch den Januar	39	Breite.
Beim Eintritt in die Knoten	40	
Beim Eintritt in die größte Breite	41	Zusammen- setzen verschiedener Punkte.
Auf die Finsternis im ersten Viertel	42	
Auf die Finsternis im zweiten Strahlen	43	
Auf die Finsternis im Vollmond	44	
Auf die Finsternis im Neumond	45	
Auf die Finsternis im letzten Viertel	46	
Auf den Vollmond in den Knoten	47	
Auf den Neumond in den Knoten	48	
Auf die letzte Viertel in die größte Breite	49	
Auf die Finsternis in den Knoten	50	
Auf die Finsternis in den Knoten	51	
Nach zwei folgenden Tagen	52	

Über den Fagel.

Am Fagel, welche beim Fagel beobachtet werden. Eine
Fagel nach Vergleichung einer großen Menge von Beschreibungen,
welche hauptsächlich betreffen, den Fagel, der sich die wichtigsten hierauf
beziehenden Beschreibungen auf folgende Punkte zurückführen lassen.

7. Fagel hierüber besonders Schuler's Wörterbuch Artikel Fagel. Die
nachfolgenden bekannten Abhandlungen von Fagel sind in Poeg. XVII. 415, von
Fagel in Schweigg. LXI. 134 oder Fagel's Notizen Nr. 8. des XXVIII.
Bandes enthalten.

1) Heftige Hagelwetter werden durch das Zusammen-
treffen aller, die Gewitter gewöhnlich begleitenden, Ele-
mente charakterisirt; sehr schwarze, heftig bewegte Wolken ziehen
mit der größten Schnelligkeit durch die Luft und fahren noch häufiger mit
Heftigkeit gegen einander, begleitet von mächtigen (high) Winden, von
furchtbarem Donnern und Blitzen*).

2) Die Hagelwetter vorgenannter Natur sind auf die
gemäßigten Zonen beschränkt; sie kommen nur selten in irgend
einer Form in der heißen Zone vor.**), und wenn es geschieht, so ist es
nur in gebirgigen Gegenden. Der Hagel ist zwar häufig in den Polarge-
genden, jedoch größtentheils von der Beschaffenheit gefrorener Regentropfen.
Unter allen Erdstrichen zeichnet sich das südliche Frankreich am meisten
durch häufige und heftige Hagelwetter aus.

3) Die heftigsten Hagelstürme kommen vorzüglich in der
wärmern Hälfte des Jahres und am häufigsten in den hei-
ßesten Monaten vor.

4) Die Hagelkörner, welche während der Dauer eines
und desselben Wetters fallen, werden auf den Bergen viel
kleiner als in der nahen Ebene gefunden.

5) Obgleich die Hagelkörner in sehr verschiedener Form erscheinen, so
besteht doch sehr häufig der Mittelpunkt derselben aus
einem weissen und porösen Kerne, um welchen sich concentrische
Eisrindungen gelagert haben, welche entweder durchsichtig oder undurchsich-
tig weiß, oder wohl auch abwechselnd durchsichtig und undurchsichtig sind.

5) Nach einem Hagelfalle in warmer Jahreszeit folgt
häufig kühles Wetter; zu Frühlings- und Herbstzeiten ist der Hagel
als Vorbote von Kälte besonders bekannt.

Nach Ideler hat die Hauptumstände, welche den Hagelfall betreffen,
nach Beobachtungen zusammengestellt***), und zwar in folgenden Punkten:

1) Der Hagel kommt zu allen Tageszeiten vor, am Ta-
ge und bei Nacht. Letzteres ist seltener, mag aber wohl öfterer gesche-
hen, als man glaubt, da es zu dieser Zeit gemeinlich an Beobachtern
fehlt.

2) Hagel kommt bei allen Temperaturen über 0° und
selbst unter dem Gefrierpunkte vor.

*) Phil. transact. Vol. IV. et V.

**) Rees leugnet ihr Vorkommen gänzlich, dagegen sagt der Verfasser des
Artikels Phys. Geogr. in der Edinb. Encycl., daß sie allerdings in einer Höhe
von mindestens 1500 bis 2000 Fuß Statt finden. (Willoughby's Magaz. Vol.
XLIII. S. 191.

***) Pogg. XVII. 443 ff. Es ist zugleich die Literatur der Beobachtungen,
nebst dem hauptsächlichsten daraus entnommenen Belegen, beigelegt, aus denen
obige Punkte hergeleitet sind, worüber ich auf die Originalabhandlung verweise.

3) Der Hagel ist ein den gemäßigten Zonen eigen thümliches Phänomen. In den Äquatorialgegenden macht nach Humboldt ein Hagelfall einen größern Eindruck auf das Volk, als bei uns das Herabstürzen von Meteorsteinen. Indessen sind einige Beispiele von Hagelwetter in Höhen unter 850 Toisen zwischen den Tropen aufgezchnet. Peron erzählt, daß sich die ältesten Einwohner in Chile de Francia nur eines einzigen Hagelwetters entsinnen konnten. In höheren Regionen, über 850 Toisen dagegen ist Hagel nicht seltenes. Den öfters in Polar-gegenden beobachteten Hagel hält Ideler ebenfalls bloß für gefrorene Regentropfen.

4) Regen und Hagel, Schnee und Hagel, ja alle drei Arten von Niederschlägen fallen oft zu gleicher Zeit herab.

5) Bei dem Hagel findet gemeiniglich ein plötzliches Hervortreten der Wolke Statt.

6) Der Hagel pflegt, wo nicht immer, doch sehr häufig, von einem sogenannten vent par rafales begleitet zu sein, welcher Luftschichten von sehr verschiedener Temperatur schnell nach einander herbeiführt.

7) Die Höhe der Hagelwolke ist gemeiniglich sehr niedrig, wie dies Frago aus dem Zeitintervalle erwiesen hat, welches zwischen Blitz und Donner bei ihrer Entladung verfließt. Indes ist dies nicht immer der Fall.

8) Hagel ist ein gewöhnlicher Begleiter der Wasserhosen.

Theorien der Hagelbildung: Es kann kein Zweifel sein, daß der plötzliche Eintritt einer großen Kälte in den Regionen, wo die Hagelbildung beginnt, als die unmittelbare Ursache dieser Erscheinung angesehen werden müsse; die Frage ist nur, wodurch diese große Kälte hervorgerufen wird. Mit Beiseitlassung anderwärts hierüber aufgestellter Theorien *) wollen wir hier nur die von Leopold v. Buch **), als welche neuerdings von Ideler besonders erörtert und mit Gründen unterstützt worden ist, und die von Olmsted anführen. Beide unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß der erstere Vermischung von Luftschichten ungleicher Temperatur in verticaler, letzterer in horizontaler Richtung bei der Erzeugung zuzieht. Zwischen beiden zu entscheiden, überlassen wir gebildeten Meteorologen.

Theorie von Leopold v. Buch. Im Wesentlichen kommt sie auf Folgendes zurück:

„Der Hagel entsteht dadurch, daß über stark von der Sonne beschienenen und dadurch sehr erhitzten Gegenden starke Strömungen von Luft und Dampf bis zu beträchtlichen Höhen aufsteigen, aus denen Wasser

*) Vgl. darüber Gehtler's Wörterb. Art. Hagel oder Pogg. XVII. 458.

**) Abhandl. des Berl. Acad. phys. Kl. 1814 — 15. 73 ff.

stropfen niedergeschlagen werden, welche beim Fallen so viel mehr verdampfen, je mehr sie aufsteigenden Luftströmungen begegnen, wodurch sie sehr erkalten, gefrieren und dann im Fallen durch die Aufnahme des Wasserdampfes der Wolken vergrößert werden." (Nach Gehlé's Wort).

Ibeler hat durch größtentheils theoretische Erörterungen, die zu ausföhrlich sind, um hier Platz zu finden, die Statthastigkeit dieser Theorie nachzuweisen gesucht, nur glaubt er folgende Restriction machen zu müssen: „Die Hagelbildung geht in den höheren, unmittelbar unter den Wolken liegenden, Schichten beim Durchfallen der Tropfen durch dieselben vor sich; nicht durch die ganze verticale Luftsäule bis zur Erdoberfläche. Borgüglicb günstige Bedingungen für die Entstehung des Hagels sind: große Trockenheit in diesen Schichten, kältere Luftströmungen, welche wärmere Luftsäulen in bedeutender Ausdehnung unterbrechen, ein vent par rafales u.“

Theorie von Dirmsted.

„Die Ursache der Hagelwetter ist das Gefrieren des in einer kalten und feuchten Luftmasse enthaltenen Wasserdampfes durch die jählunge Vermischung mit einem kalten Winde in den oberen Regionen der Atmosphäre.“

Unmittelbar beim Zusammentreffen dieser Winde gefriert der Wasserdampf des warmen Windes mit einer, der Temperatur des kältern Windes entsprechenden Intensität, die also gebildete und mit einer außerordentlichen Kälte begabten Hagelkörner beginnen sogleich ihren Fall und vergrößern innerhalb desselben ihren Umfang, um so mehr, je niedriger die Temperatur war, welche die Hagelkörner beim Beginnen des Fallens besaßen; je größer der Fallraum ist und je mehr Feuchtigkeit die Luft enthält. Diese Theorie erklärt sehr wohl, warum die eigentlichen Hagelwetter eine Eigenthümlichkeit gemäßigter Zonen sind; da nämlich diese zwischen der heißen und kalten Zone eingeschlossen sind, so kann hier leicht ein sehr warmer Wind von einer Seite einem sehr kalten von der andern entgegenkommen, woyu weder in der kalten noch heißen Zone dieselben günstigen Bedingungen vorhanden sind. In der kalten Zone wird allerdings der Regen oft in Gestalt von Hagel herabfallen können, dieser aber nothwendigerweise zu jener kleinen Art von Hagel gehören, welcher sich in der Nähe der Erde bildet und den Polargegenden eigenthümlich ist; in der heißen Zone möchte nur in der Nähe der mit Schnee bedeckten niederen Gebirge eine Möglichkeit der Hagelbildung anzunehmen sein, wo es in der That zuweilen hagelt.

Frankreich ist durch seine Lage zwischen den Alpen und Pyrenäen ganz besonders den Hagelwettern ausgesetzt. Zudem nämlich das zwischen diesen hohen Gebirgen gelegene Land im Sommer durch die Sonne erwärmt wird, so müssen die aus der Schnee- und Eisregion kommenden kalten Luftströme bei ihrer Vermischung mit der warmen und gleichzeitig feuchten Luft dieser Gegenden, welche sie durchziehen, in übereinstimmung mit den festgestellten Principien, häufige Hagelwetter hervorbringen.

Die heftigsten Hagelwetter kommen in der wärmern Jahreszeit vor, und gewöhnlich auch in den heißesten Monaten, weil in diesen die Sonnenwärme am meisten zur Erzeugung von entgegen gesetztem Luftströmen beiträgt. Die Hagelkörner sind auf den Berghöhen kleiner als in den niederen Ebenen, weil sie wegen der geringern Fallhöhe weniger Gelegenheit haben, sich durch Gefrierung successiver Schichten von Wasserdämpfen zu vergrößern. Der weiße, schneeige Kern, welcher oft das Centrum der großen Hagelkörner ausmacht, beweist, daß die Erstarrung des Wassers in einer sehr verdünnten Luft begann; dann es hat derselbe genau das Ansehen eines, im evacuirten Raume der Luftpumpe gefrorenen Wassertröpfchens *). Die schnelle und bedeutende Temperaturniedrigung, welche oft eine unmittelbare Folge der Hagelwetter ist, beweist endlich nur, daß der kalte Luftstrom, welcher sie hervorbrachte, zuweilen seinen Einfluß bis auf die Oberfläch der Erde erstreckt.

Olmsied widmet noch dem Umstande eine besondere Betrachtung, warum die Hagelkörner mit so wenig Gewalt auf die Erde niederfallen? Obgleich nämlich die Hagelkörner, wenn sie groß sind, großen Schaden unter den Feldfrüchten anrichten, und wohl auch öfter kleine Thiere tödten, so muß man sich doch im Allgemeinen wundern, daß ihr gewöhnlich aus der Höhe von mehreren 100 Fuß erfolgender Fall nicht mit noch größerer Kraft verbunden ist, als wirklich Statt findet. Olmsied erklärt diesen Umstand auf folgende Weise: die Erzeugung der größten Hagelkörner fängt mit einem sehr kleinen Kern an, welcher während des Herabfallens immer mehr an Masse zunimmt, bis er den Boden erreicht. Aber der Wasserdunst, welcher den Stoff zu dieser Zunahme liefert, ist eine ruhende Masse, welche durch den fallenden Körper erst in Bewegung gesetzt werden muß, dieser erhält aber hiedurch auf jedem Punkte seines Fortschreitens ein neues zu überwindendes Hinderniß, welches nochwendiger Weise eine stete Verminderung seiner Geschwindigkeit herbeiführen muß. Die Geschwindigkeitszunahme, welche der fallende Körper in jedem Momente des fortschreitenden Falles erhält, wird durch die, jener so großen Menge träger Materien, welche die Umfangsvermehrung der Hagelkörner verursacht, mitgetheilte Bewegung aufgehoben.

Ein Ungenannter **) fügt hinzu, daß der von Olmsied geltend gemachte Verzug noch dadurch verstärkt werden müßte, daß der Hagel auf seinem Wege eine aufsteigende, und folglich der seines kleinen Kernes gerade entgegengesetzte, Bewegung zu überwinden habe; da der warme feuchte südliche Wind im Augenblicke seiner Mischung mit dem trocknen kalten nördlichen Winde eine aufsteigende Bewegung haben müsse.

*) 8e 1te Edit. Encycl. Art. Meteorology.

**) Bibl. univ. 1830. Sept. p. 62.

Schnee.

Quetelet hat untersucht, ob nicht eine Beziehung zwischen der Gestalt und Dichtigkeit des Schnees Statt fände. Er verglich zu diesem Zwecke die verschiedenen Volumina Wasser, welche durch Schmelzen des Schnees entstanden, wo sich folgende Resultate ergaben:

Datum.	Temperatur R.	Volumen des geschmolzenen Wassers.	Gestalten.
25. Nov. 1829	+ 0,5	6,60	Unförmliche Kloden.
16. Dec. —	0	7,00	Feiner Schnee ohne be-
19. — —	— 0,8	7,50	stimmte Gestalt.
20. — —	— 1,5	14	? **)
21. — —	— 1,0	8,18	Unförmlich.
24. — —	— 4,0	6,16	Desgl.
25. — —	— 4,5	7,78	? **)
10. Jan. 1830	+ 1,0	2,80	Der Schnee schmilzt im
12. — —	— 1,3	10,00	Fallen.
13. — —	— 3,3	10,00	Sehr kleine Sterne.
15. — —	— 6,0	12,00	Desgl.
6. Febr. —	— 10,0	8,80	Desgl.
17. — —	+ 0,5	.	? **)
			Große Kloden, welche
			schmolzen.

VII. Über Variation der Kohlensäure in der Atmosphäre; von Lh. de Saussure.

Saussure hat seine früheren Untersuchungen ***) über die Schwankungen des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre jetzt ausgedehnt †) und er hat neben einer Kritik der früheren Methoden, welche von andern zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre angewandt worden sind, 1) sein eigenes neuerdings angewandtes Verfahren zu dieser Bestimmung sehr ausführlich beschrieben, 2) die Resultate angeführt, welche sich aus

*) Bull. univ. des sc. math. 1830. Juin. p. 449 aus Quetelet Corresp. math. VI. 212.

**) Es findet sich hier keine Angabe beigelegt.

***) Gills. LIV. 217.

†) Ann. de Ch. et de Ph. XLIV. 5; ober Schweigg. S. LX. 17, 120; ober Pogg. XIX. 391.

52 Beobachtungen des Mittags und eben so vielen des Abends oder in der Nacht während der Jahre 1827, 1828 und 1829 zu Chambeisy *), so wie aus Beobachtungen von mehreren anderen Standpunkten, für die Veränderungen des Kohlensäuregehaltes in der Atmosphäre je nach den verschiedenen Umständen ergaben; 3) die Tabellen seiner Beobachtungen selbst mitgetheilt **):

I. Verfahren von Saussure.

Das von Saussure angewandte Verfahren zur Bestimmung des Kohlensäuregehaltes kommt im Wesentlichen darauf zurück, daß man Barytwasser, welches mit kohlensaurem Baryt gesättigt ist, in einen großen, die Luft, deren Kohlensäuregehalt geprüft werden soll, enthaltenden Ballon mit enger und wohlverschließbarer Öffnung gießt ***), darauf den verschlossenen Ballon entweder eine Stunde lang anhaltend schüttelt oder sieben bis acht Tage stehen läßt, dann den erzeugten kohlensauren Baryt herausnimmt, in Salzsäure auflöst, die Lösung durch schwefelsaures Natron fällt und aus dem entstandenen schwefelsauren Baryt die Kohlensäure berechnet. Dies Verfahren erfordert, um genaue Resultate zu liefern, viele Vorrichtungen und Nebenmaßregeln, die Saussure sehr ausführlich beschrieben hat, und hinsichtlich deren wir die, welche diese Versuche fortsetzen wollen, auf die Originalabhandlung verweisen.

II. Hauptresultate.

Als Hauptresultate seiner Beobachtungen hebt Saussure selbst folgende hervor:

Die Veränderungen, welche man im Kohlensäuregehalte der Atmosphäre auf offenem Felde beobachtet, stehen hauptsächlich mit zwei Umständen in Beziehung:

- a) mit den Veränderungen des Bodens. Benetzung desselben durch anhaltenden Regen vermindert die Kohlensäure; Austrocknung desselben vermehrt sie;
- b) mit der Tageszeit. In der Nacht ist nämlich die Atmosphäre reicher an Kohlensäure als bei Tage.

Die oberen Schichten der Atmosphäre enthalten mehr Kohlensäure als die unteren.

*) Der Beobachtungsort war eine Wiese in der Nähe des Dorfes Chambeisy, $\frac{1}{2}$ Meile von Genf, 16 Meter über dem Genfer See, 250 Meter von ihm entfernt. Ihre Höhe über dem Meeresniveau ist 388 Meter; sie ist trocken, liegt offen und luftig und hat einen thonigen schwach geneigten Boden.

**) Diese werden wir zum Schluß des Artikels beifügen.

***) Man muß wenigstens vier solcher Ballons haben, um zugleich an verschiedenen Orten, bei Tage und bei Nacht, Beobachtungen anstellen zu können. Der Ballon wird ausgepumpt, ehe man die zu prüfende Luft hineintreten läßt.

Die Schwankung des Kohlensäuregehaltes zwischen Nacht und Tag ist wenig, oder gar nicht merklich in den oberen Schichten; stärkeren Antheil scheinen diese an der weniger plötzlichen Variation zu nehmen, welche bei allgemeiner Bewegung des Bodens in den unteren Schichten Statt findet.

Die Schwankung zwischen Tag und Nacht tritt in den Straßen von Genf wenig hervor; allein auf dem benachbarten See, wo die Seitenströmungen der Luft vom Lande her kein Hinderniß finden, ist sie beträchtlich.

Ein heftiger Wind vermehrt bei Tage gewöhnlich den Kohlensäuregehalt in den unteren Schichten der Atmosphäre, und vernichtet hier, ganz oder theilweise, die Vermehrung dieses Gehaltes, welche sonst bei ruhigem Wetter während der Nacht Statt findet.

Nähere Erörterung der Resultate.

Mittler, kleinster und größter Kohlensäuregehalt der Atmosphäre zu Chambeisy; 10000 Volumtheile Luft enthalten 4,15 Volumtheile Kohlensäure nach einem Mittel aus 104 Beobachtungen, welche bei Tag und bei Nacht in allen Jahreszeiten zu Chambeisy 4 Fuß über dem Boden angestellt wurden. Die größte Menge in jenem Luftvolumen betrug daselbst 5,74, die kleinste 3,15.

Einfluß des Regens. Eine anhaltende regnichte Witterung verringert den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre; sei es, daß der Regen selbst die Kohlensäure absorbiert oder den Boden zu deren Absorption disponirt. Um diesen Einfluß zu bewertheilen, muß man jedoch nicht bloß zwei oder drei regnichte Tage vergleichen, wo man nur nichtsagende Resultate erhalten würde, sondern einen oder mehrere heitere Monate im Sommer oder Herbst eines Jahres mit denselben regnichten Monaten eines andern Jahres. Der Regen wirkt nämlich nur langsam auf die Luft, und anstatt daß ein, nach einer trockenen Witterung erfolgender, Platzregen den Kohlensäuregehalt der Atmosphäre verringert hätte, schien es vielmehr Sauer'n nach einigen, jedoch in diesem Bezuge nicht hinreichend zahlreichen, Beobachtungen, daß er vielmehr dadurch vermehrt worden sei, sei es nun, daß das einbringende Wasser Kohlensäure aus dem Boden vertreibt, oder daß die oberen Schichten der Atmosphäre verschoben werden.

Folgende Tabelle, aus den Beobachtungen zu Chambeisy gezogen, dient zur Erläuterung des Zusammenhanges der Regenmenge mit dem Kohlensäuregehalte *).

*) Diese Tabelle enthält bloß Beobachtungen für Sommer- und Herbstmonate, weil in dem Klima von Genf die Wirkung des Regens für Winter und Frühling, wo sie durch das Gefrieren und Aufthauen abgedeckt wird, nicht wohl bestimmbar ist; letzteres bewirkt nach Sauer'sure eine Änderung des Kohlensäuregehaltes, selbst wenn kein Regen fällt.

	Regenmengen in Millimetern.	Mittlere Menge von Kohlensäure in 10000 Luft am Mittage.
Juni 1828	10	4,79
— 1829	77	4,07
Juli 1827	9	5,18
— 1828	173	4,56
— 1829	52	4,32
August 1827	75	5,01
— 1828	128	4,23
— 1829	116	3,80
September 1827	30	5,10
— 1828	104	4,18
— 1829	254	3,57
October 1828	75	3,94
— 1829	113	3,75
November 1828	81	4,11
— 1829	138	3,89
December 1828	9	4,14
— 1829	34	3,72

Der Juli 1828 war ungemein regnigt, und der Kohlensäuregehalt in demselben, obgleich geringer als in einem sehr trocknen Juli, scheint deshalb größer, als er nach anderen Resultaten hätte sein sollen; allein der Juni, welcher sehr trocken war, hat auf den Kohlensäuregehalt dieses Jahres eingewirkt. Die große Dürre des Juli 1827 hat auf die beträchtliche Menge Kohlensäure des folgenden Augusts, welcher regnigt war, eingewirkt.

Einfluß der Gefrierung des Bodens auf die Kohlensäure in der Atmosphäre. Die folgenden Beobachtungen, welche im Winter 1829 zu Chambeisy angestellt wurden, zeigen, daß ein anhaltend gefrorener Boden die Menge der Kohlensäure vermehrt, und liefern einen neuen Beweis von dem Einflusse der Trockenheit des Bodens auf die Vermehrung dieser Säure.

Im December 1828, während dessen es fast nicht regnete, der Boden aber in Folge von Nebeln und einer den Frostpunct nur wenig übersteigenden Temperatur sehr feucht blieb, schwankte die Menge der Kohlensäure in 10000 Th. Luft, nach zehn bei Tage und bei Nacht gemachten Beobachtungen, zwischen 3,85 und 4,25.

Zu Anfange des Januars wurde der Boden mit einer schwachen Schneedecke belegt, und nach 14 Tagen, während welcher der Boden beständig gefroren blieb, war die Menge der Kohlensäure auf 4,57 gestiegen; gegen Ende des Monats trat ein mehrtägiges Thauwetter ein, und nun war die Säure auf 4,27 vermindert. Anfangs Februar begann der Frost aufs

Neue, und in der Mitte des Monats war er 8 Zoll tief eingebrungen *); die Kohlensäure hatte sich nun bis zu 4,52 vermehrt, und als dann abermaliges Thauwetter eintrat, sank sie wieder auf 3,66 herab. Die Menge des Regens oder Schnees, welche in den Monaten December, Januar und Februar fiel, war zu klein, als daß sie hätte auf die obigen Schwankungen Einfluß haben können.

Vergleichung des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre über Wasser und Land. Die Luft des Genfer See's wurde 4 Fuß über dessen Oberfläche aufgefangen, $\frac{1}{4}$ Rieues von seinem südlichen Ende und in der Mitte der Breite, welche hier, in der Nähe von Chambeisy, etwa $\frac{1}{4}$ Rieue betrug. Aus Vergleichung dieser Luft mit der zu Chambeisy ergiebt sich:

- 1) daß die Luft über dem See im Allgemeinen weniger Kohlensäure enthält, als die Luft auf dem Lande;
 - 2) daß an beiden Orten die Luft im Mittel fast dieselben Veränderungen in Bezug auf die Jahreszeiten und auf die entgegengesetzten Wirkungen der Nacht und des Tages erleidet.
- Folgendes ist die Tabelle der Beobachtungen.

Nummer der Beobachtungen.	Tag der Beobachtungen.	Kohlensäure in 10000 Theilen Luft	
		zu Chambeisy.	über dem Genfer See.
17. u. 18.	29. Dec. 1826 Mittags	4,21	3,85
25. u. 26.	22. Mai 1827 —	5,40	5,02
29. u. 31.	2. Juli 1827 —	5,23	5,78
37. u. 38.	9. Aug. 1827 —	5,21	5,42
44. u. 45.	28. Sept. 1827 —	4,95	4,74
50. u. 51.	19. Jan. 1828 —	4,91	4,46
63. u. 64.	7. Jul. 1828 —	4,81	4,41
71. u. 72.	12. Aug. 1828 —	4,08	3,92
74. u. 75.	26. Aug. 1828 —	4,22	4,10
85. u. 86.	26. Sept. 1828 —	4,14	3,20
88. u. 89.	— — — 8 u. Ab.	4,93	4,30
122. u. 123.	5. Febr. 1829 Mittags	4,45	4,76
130. u. 131.	7. März 1829 —	4,63	4,65
138. u. 139.	18. April 1829 —	4,29	4,22
161. u. 162.	7. Juli 1829 11½ u. Ab.	5,34	5,10
163. u. 164.	8. — 1829 Mittags	4,35	4,08
197. u. 198.	13. Oct. 1829 —	3,54	3,42
199. u. 200.	13. — — 11 u. Ab.	4,16	3,68
Mittelwerthe		4,60	4,39

*) Ein vorübergehender Frost, der auf der Oberfläche bleibt oder nur einen
 F e c h n e r ' s Repertorium d. Experimentalphysik. III. 5

Man darf sich übrigens nicht wundern, daß der mittlere Unterschied zwischen dem Kohlensäuregehalte über dem See und dem zu Chambeisy nicht mehr als etwa $\frac{1}{7}$ beträgt, weil die Entfernung beider Stationen (welche fast in gleicher Höhe liegen und von einander sichtbar sind) nicht größer als $\frac{1}{2}$ Meile ist, und weil bloß Nr. 198. und 200. bei vollkommener Windstille angestellt wurden, während die übrigen Resultate in einer Atmosphäre erhalten wurden, deren, wenn auch nur schwache, Bewegung doch eine Vermengung der Luft des See's mit der Luft des benachbarten Ufers bewirken konnte. Aus demselben Grunde darf man auch nicht schließen, daß das Ergebnis 2) hinsichtlich der Ähnlichkeit der Veränderungen über Land und See, welches bei so kleiner Entfernung vom Ufer gefunden ward, sich für größere Entfernungen vom Ufer erstrecken würde; und in der That kann man bemerken, daß gerade Nr. 198. und 200. eine geringere Variation zwischen Tag und Nacht auf der See, als auf dem Lande anzeigen.

Vergleichung des Kohlensäuregehaltes in der Stadt und auf freiem Felde. Zu Anstellung dieses Vergleiches wurde zu Gaf die Luft in einem großen Hofe, rue de la cité, 19 Meter über dem See aufgefangen, zu Chambeisy dagegen auf offenem Felde, nahe in gleicher Höhe mit ersterer Station, und 1,3 Meter über dem Boden, wie die übrigen Beobachtungen.

Aus diesen Beobachtungen ging hervor:

- 1) daß der Kohlensäuregehalt bei Tage viel größer in der Stadt als auf dem Lande ist;
- 2) daß die jahreszeitlichen Schwankungen desselben an beiden Stationen ähnlich sind;
- 3) daß er bei Nacht mehr auf dem Lande, als in der Stadt zunimmt*).

Folgendes die Tabelle der Beobachtungen:

Soll tief in den Boden bringt, wirkt nicht auf die Variationen der Kohlensäure.

*) Eine im Sommer sehr seltene Ausnahme machte der 25. Juli 1823, wo der am Tage vorhandene Kohlensäuregehalt bei ruhiger Luft während der Nacht zu Chambeisy abnahm. Diese Abnahme zeigte sich auch gleichzeitig in der Stadt, und war hier noch weit größer, weil die nächtliche Aushauchung von Kohlensäure, die auf dem Lande in der Regel größer ist, hier nicht entgegenwirkte. Während dieser Beobachtungen war der Himmel heiter, die Luft warm und, wie der Boden, trocken, auch fiel kein Thau, allein eine Stunde nach Hineinbringung der Luft in den Ballon bezog sich der Himmel, und es fielen einige Tropfen Regen.

Nummer der Beobachtungen.	Tag der Beobachtungen.	Kohlensäure in 10000 theilen Luft	
		zu Chambrisy.	zu Genf.
21. u. 22.	12. Febr. 1827 Mittags	3,58	4,55
25. u. 27.	22. Mai 1827 —	5,40	5,69
29. u. 30.	2. Juli 1827 —	5,23	5,65
53. u. 53.	26. Mai 1828 —	4,71	5,28
6. u. 70.	9. Aug. 1828 —	4,53	4,76
120. u. 121.	28. Jan. 1829 —	4,26	4,27
124. u. 125.	19. Febr. 1829 —	4,62	4,82
127. u. 128.	26. — 1829 —	4,65	5,00
136. u. 137.	10. April 1829 —	3,90	4,45
169. u. 170.	25. Juli 1829 —	4,44	4,93
171. u. 172.	25. — 1829 Mitternacht	4,07	3,85
182. u. 183.	4. Sept. 1829 11 u. Ab.	4,41	4,39
184. u. 185.	5. — 1829 Mittags	3,82	4,20
193. u. 194.	1. Oct. 1829 11 u. Ab.	4,14	4,23
195. u. 196.	2. — 1829 Mittags	3,67	4,05
Mittel		4,37	4,68

Vergleichung des Kohlensäuregehaltes auf Bergen und in der Ebene. Es wurden Beobachtungen 4 Fuß über dem Boden auf den Kalkbergen des Jura und des Calève, ungefähr 3 Meilen von Chambrisy, wo correspondirende Beobachtungen gemacht wurden, angestellt. Diese Berge begrenzen von zwei Seiten die Ebene, in der Chambrisy liegt. Das Resultat, welches gleichzeitig an dem Fuße des Berges erhalten wurde, war sehr nahe dem zu Chambrisy gleich.

Es geht aus diesen Beobachtungen hervor:

- 1) der Kohlensäuregehalt der Atmosphäre ist auf Bergen größer als in der Ebene, was durch die Betrachtung erklärbar wird:
 - a) daß die Zersetzung der Kohlensäure hauptsächlich in den unteren Schichten, wo die Vegetation ausgebreiteter ist, Statt findet;
 - b) daß die Kohlensäure mehr von dem Boden der Ebene absorbiert werden muß, weil hier das Regenwasser einen langsamern Abfluß findet. —
- 2) Die bei Tage vorhandene Kohlensäure wird auf Bergen wenig oder gar nicht durch den Einfluß der Nacht vermehrt. Folgendes die Tabelle der Beobachtungen:

Ort und Zeit der Beobachtung.	Höhe der Orte über dem Meeres- Cee.	Kohlensäure in 10000 Th. Luft. auf dem Berge.	
		in der Ebene.	
34. Gipfel der Dole; 20. Juli 1827, Mittags	1267	4,61	4,74 Gymbelsh (388 Mtr. hoch), Mittags.
39. Grand-Salève-sur-Crevin; 28. August 1827, Mittags	877	5,57	4,82 Gymbelsh, Mittags.
40. Gmfibeli (Klein-Éclabé); 28. August 1827, 3 u. Nachmittags	831	5,44	4,82 — —
60. Gipfel der Dole; 28. Juni 1828, Mittags	1267	4,91	4,46 — —
61. Vassero-de-sous-la-Dole; 28. Juni 1828, 3 uhr Nachmittags.	908	4,83	4,46 — —
147. Grand-Salève-sur-Grange-Tournier, 25. Mai 1829, Mittags	945	4,13	3,67 Colonge, am Fuß des Éclabé, Mittags.
165. Col de la Faucille, im Jura; 14. Juli 1829, 11 uhr Abends	963	4,43	3,59 Gymbelsh.
167. Col de la Faucille; 15. Juli Mittags	963	4,54	4,14 — 11 u. Ab.
174. Col de la Faucille; 7. August 11 uhr Abends	963	3,69	4,15 — Mittags.
176. Col de la Faucille; 8. August Mittags	963	3,60	3,87 — 11 u. Ab.
189. Col de la Faucille; 29. September 11 uhr Abends	963	4,22	3,22 — Mittags.
190. Col de la Faucille; 30. September Mittags	963	3,95	3,55 — 11 u. Ab.
			3,15 — Mittags.

Die erste Beobachtung (welche allein eine Ausnahme von den bei Tage erhaltenen Resultaten hinsichtlich der größern Kohlensäuremenge auf Bergen macht), wurde bei sehr anhaltender Dürre und bei heftigem Winde angestellt.

Den größten Unterschied zwischen der Luft in der Ebene und der auf dem Berge zeigt die letzte Beobachtung; sie wurde zu einer ungemein regnichten Zeit angestellt.

Einfluß des Windes auf den Kohlensäuregehalt bei Tage. Um diesen Einfluß zu bestimmen, wurden die Kohlensäuremengen verglichen, welche zu Chambrisy am Tage bei ruhiger und bei sehr bewegter Luft beobachtet wurden. Die mit einander verglichenen Resultate waren durch keine größere Zwischenzeit als 13 Tage getrennt^{*)}. Diese Resultate zeigen:

Daß die Kohlensäuremenge, welche bei Tage in einer Ebene auf offenem Felde enthalten ist, gewöhnlich durch den Wind vermehrt wird; daß jedoch diese Vermehrung zu gering ist, als daß sie anders als durch ein Mittel aus mehreren Beobachtungen wahrnehmbar gemacht werden könnte.

Wahrscheinlich rührt diese Vermehrung von der Vermischung der unteren Schichten mit den oberen her, welche in der Regel bei Tage eine größere Quantität Kohlensäure enthalten.

Übrigens wird man leicht einsehen, daß bei dieser Gattung von Veränderungen häufig Anomalien vorkommen werden, wenn man berücksichtigt, wie sehr das Resultat der Vermischung der oberen mit den unteren Schichten durch die viel leichtere Vermischung mit seitlichen Schichten abgeändert werden kann, indem z. B. vielleicht der Ort des Beobachters trocken ist, während die benachbarte Gegend vom Regen überschwemmt wird.

^{*)} Für eine geringere Zwischenzeit würden die Beobachtungen nicht zahlreich genug gewesen sein, und bei einer größern hätte der Unterschied der Jahreszeit zu stark eingewirkt.

Kohlensäuregehalt der Atmosphäre.

Tabelle der Beobachtungen.

Kohlensäure in 10000 Volumentheilen Luft.									
Bei Windstille oder sehr schwachem Winde.					Bei starkem Winde.				
Mittags.					Mittags.				
Nr.					Nr.				
56.	—	13. Juni	1828	4,75	58.	—	26. Juni	1828	5,09
92.	—	14. Oct.	—	3,81	95.	—	15. Oct.	—	3,82
110.	—	7. Dec.	—	4,06	109.	—	2. Dec.	—	4,29
11.	—	27. Dec.	—	4,13	118.	—	31. Dec.	—	4,18
149.	—	25. Mai	1829	3,59	151.	—	31. Mai	1829	3,62
156.	—	17. Juni	—	3,80	152.	—	7. Juni	—	4,04
160.	—	30. Juni	—	4,39	153.	—	29. Juni	—	4,41
175.	—	8. Aug.	—	3,22	177.	—	19. Aug.	—	3,44
181.	—	31. Aug.	—	4,30	177.	—	19. Aug.	—	3,44
184.	—	5. Sept.	—	3,82	186.	—	15. Sept.	—	3,95
188.	—	19. Sept.	—	3,37	186.	—	15. Sept.	—	3,95
197.	—	13. Oct.	—	3,54	201.	—	26. Oct.	—	3,76
205.	—	2. Nov.	—	3,35	201.	—	26. Oct.	—	3,76
205.	—	2. Nov.	—	3,35	205.	—	29. Dec.	—	4,04
209.	—	25. Nov.	—	3,43	207.	—	17. Nov.	—	3,40
219.	—	24. Dec.	—	3,36	221.	—	26. Dec.	—	4,22
222.	—	30. Dec.	—	3,66	221.	—	26. Dec.	—	4,22
Mittel 3,76					Mittel 3,98				

Unterschied zwischen dem Kohlensäuregehalt bei Tag und bei Nacht. Ingenhousz, welcher durch Versuche in verschlossenen Gefäßen entdeckt hat (Exper. sur les vég. II. 64), daß die grünen Pflanzen im Dunkeln Kohlensäure erzeugen, vermuthete in freier Luft bei Nacht eine größere Menge dieses Gases zu finden, als bei Tage; allein er nahm keinen Unterschied wahr, obgleich er seine Untersuchungen unter den günstigsten Umständen anstellte. Aus Saussure's Versuchen jedoch geht dieser Unterschied wirklich erfahrungsmäßig hervor, indem dieselben folgenden Resultate ergaben:

Die Luft enthält im Allgemeinen in einer offenen Ebene mehr Kohlensäure bei Nacht als bei Tage. Dieser Unterschied wird im Winter sehr gering; oft verschwindet er dann ganz und selten findet man ihn unabhängig von den Fehlern des Verfahrens. Einige Resultate zeigen indeß, daß er auch in dieser Jahreszeit vorhanden ist, selbst wenn die Erde von einem dicken Schneelager bedeckt wird und die Temperatur mehrere Grade unter dem Gefrierpunkte liegt.

Die meisten der nächtlichen Versuche wurden um 11 Uhr Abends angestellt; allein die in Rede stehende Variation ist im Sommer schon um 8 Uhr Abends sehr deutlich. Das Maximum der Kohlensäuremenge innerhalb 24 Stunden findet sich gegen das Ende der Nacht; das Minimum in der Mitte des Tages. Die größte Zunahme in der Nacht stieg auf ein Drittel der am Tage vorhandenen Menge.

Die beträchtlichsten oder schnellsten Veränderungen treten ein zwischen Ende der Nacht und den Frühstunden des Tages, und zwischen vier und acht Uhr des Abends; diejenigen, welche zwischen neun Uhr Morgens und drei Uhr Nachmittags Statt finden, können mit den Beobachtungsfehlern zusammenfallen.

Die Verdeckung der Sonne durch Wolken hindert die Beobachtung der nächtlichen Zunahme des Kohlensäuregehaltes nicht; die Zunahme zeigt sich bei schwachem wie bei immerwährendem Regen, und auch, wenn der Boden durch lang anhaltenden Regen ganz mit Wasser getränkt ist; nur ist sie unter diesen Umständen geringer.

Obgleich diese Variation auch ohne Thau Statt findet, so wurden doch die größten Vermehrungen des Kohlensäuregehaltes beobachtet, wenn jener sehr reichlich da war, und wenn die Hitze des Tages sehr gegen die Kühle der Nacht abfiel.

Eine starke Bewegung in der Luft vermindert diese Variation oder hebt sie ganz auf, wie man aus den Nummern 58. und 59., 93. und 94., 133. und 140., 186. und 187., 201. und 202., 203. und 204. der unten stehenden Tabelle ersehen kann. Diese Wirkung, welche zum Theil von der Vermengung der oberen Schichten mit den unteren abhängen kann, zeigt, daß die Variation in sehr großer Höhe nicht existirt.

Der allgemein vorhandene Unterschied zwischen den Kohlensäuremengen bei Tage und bei Nacht erklärt sich leicht dadurch, daß die Vegetation dieses Gas, welches durch tausend verschiedenartige Agentien und vor Allem durch die Aethererde unaufhörlich gebildet wird, nur bei Lichte zerlegt; und man begreift danach, wie diese Variation durch den Wind und während des Winters abnehmen oder verschwinden muß. Indes ist sie auch Ausnahmen unterworfen (14. und 25. Juli 1829, Nr. 166. und 171.), welche nicht von der Jahreszeit noch von der Bewegung der Luft herrühren, vielmehr die Wirkung einer allgemeinen Ursache sein müssen, da sie gleichzeitig an entfernten Orten Statt gefunden haben. Die Trockenheit der Luft, die in einem dieser Fälle größer war bei Nacht als am Tage, scheint eine gewöhnliche Ursache dieser Regellosigkeit zu sein, und sie reicht auch hin, die Vegetationskraft, und folglich auch die in Rede stehende Variation zu schwächen, allein nicht um sie ganz verschwinden zu machen. Da man sieht, daß in diesen Ausnahmen der Kohlensäuregehalt nicht nur bei Nacht nicht wächst, sondern sogar abnimmt, so muß man annehmen, daß eine von der Vegetation unabhängige Wirkung zur Vernichtung dieses Gases beitrage; eine Annahme, zu welcher man auch noch durch den Umstand

geführt wird, daß im Winter die Menge der Kohlensäure oft geringer ist, und daß auch zuweilen in dieser Jahreszeit, wo doch die Vegetation keine Thätigkeit besitzt, die tägliche Variation sich bemerklich macht. Durch einen andern Vergleich nun der Variationen des Kohlensäuregehaltes mit dem allgemeinen Gange der atmosphärischen Elektricität glaubt *Gaussure* die Annahme begründet, daß im Freien die Menge der Kohlensäure im umgekehrten Verhältnisse zu dieser Elektricität stehe (mit Ausnahme der Fälle, wo die Verringerung der Säure sichtlich von deren Absorption durch Wasser abhängt), und daß die Elektricität es sei, welche die Kohlensäure zerlegt, ohne daß er jedoch eine Andeutung giebt, wie man sich diese zersetzende Wirkung denken soll *). Auch legt er für den Gang der atmosphärischen Elektricität Annahmen zu Grunde, die unstreitig nicht richtig sind; denn wenn er seine Hypothese durch folgende Angaben zu rechtfertigen sucht:

- 1) die atmosphärische Elektricität ist am Tage stärker als bei Nacht;
- 2) sie ist im Winter schwächer als im Sommer (siehe *Gaussure's Voyages* S. 303.);
- 3) sie ist in den Sommernächten weit seltener aufzufinden, als in Winternächten;
- 4) sie ist auf Bergen schwächer als in der Ebene (siehe *Gaussure's Voyages* S. 2055.);
- 5) ihre Intensität wird gewöhnlich von heftigem Winde vermindert, so muß bemerkt werden, daß die so sorgfältigen und umfassenden Beobachtungen *Schäbler's* (Biot II. S. 290, 298) gerade das Gegentheil von 2) und 4) lehren.

In der folgenden, hauptsächlich zum Vergleichung der Kohlenstoffmenge bei Tag und bei Nacht dienenden Tabelle sind die Beobachtungen, wo ausnahmsweise die Menge der Kohlensäure größer am Tage als bei Nacht war, mit einem Sternchen bezeichnet. Die Winde sind in der Tabelle durch griechische Buchstaben angedeutet; α bedeutet einen mäßigen, β einen starken, γ einen sehr starken Wind, κ bedeutet Regen. Wo kein griechischer Buchstabe steht, war die Luft ruhig oder nur schwach bewegt.

*) In der That dürfte der Schluß von der zersetzenden Wirkung des elektrischen Funken auf Gaskarten keine Anwendung auf die atmosphärische Elektricität erleiden, und es scheint mir, daß, wenn ein coincidirendes Verhältniß zwischen Kohlensäuregehalt und Elektricität auch Statt findet, dies wohl mehr einer gemeinschaftlichen Ursache, als einer gegenseitigen Abhängigkeit beizumessen sei.

Tabelle der Beobachtungen.

Nummer und Datum der Beobachtungen.		Kohlensäure in 10000 Volumen- theilen Luft	
		Mittags.	in der Nacht.
Nr. 25. u. 28. — 22. Mai	1827	5,4	5,72 Ab. 11 u.
— 42. u. 43. — 3. Sept.	—	5,25	5,62
— 47. u. 48. — 6. Nov.	—	4,06	4,54
— 54. u. 55. — 31. Mai	1828	4,50	4,82
— 56. u. 57. — 13. Juni	—	4,75	5,40
— 58. u. 59. — 26. Juni	—	5,09* γ	4,85 γ
— 67. u. 68. — 1. August	—	4,09	5,69
— 74. u. 77. — 26. August	—	4,22	4,76 Ab. 8 u.
— 74. u. 78. — 26. August	—	4,22	4,69 Mittern.
— 74. u. 79. — 26. u. 27. Aug.	—	4,22	5,74 Morg. 3 $\frac{1}{2}$ u.
— 82. u. 84. — 14. Sept.	—	4,22	4,91 Ab. 11 u.
— 85. u. 88. — 26. Sept.	—	4,14	4,93 Ab. 8 $\frac{1}{2}$ u.
— 85. u. 91. — 26. Sept.	—	4,14	4,98 Ab. 11 $\frac{1}{2}$ u.
— 85. u. 91. — 26. u. 27. S.	—	4,14	5,09 Morg. 4 u.
— 93. u. 94. — 14. Oct.	—	3,81* γ	3,58* γ Ab. 11 u.
— 96. u. 97. — 22. Oct.	—	4,20	4,49 Ab. 11 u.
— 103. u. 105. — 14. Nov.	—	4,16	4,51
— 106. u. 107. — 21. Nov.	—	3,91	4,30
— 111. u. 112. — 5. Dec.	—	4,06*	3,92*
— 114. u. 115. — 22. Dec.	—	4,18*	4,25*
— 116. u. 117. — 27. Dec.	—	4,13*	4,09*
— 126. bis — 19. Febr.	1829	3,66*	3,70*
— 132. u. 133. — 12. März	—	4,25	4,80
— 138. u. 140. — 18. April	—	4,29*	3,90* α
— 144. u. 146. — 10. Mai	—	3,54	4,63
— 154. u. 153. — 12. u. 11. Juni	—	3,72	4,41 R.
— 154. u. 155. — 12. Juni	1829	3,72	4,25
— 156. u. 157. — 17. Juni	—	3,80	4,30 α Ab. 11 u.
— 160. u. 159. — 30. u. 29. Juni	—	4,39 R.	4,67 α R.
— 163. u. 161. — 8. u. 7. Juli	—	4,35	5,35
— 168. u. 166. — 15. u. 14. Juli	—	4,15*	4,14*
— 169. u. 171. — 25. Juli	1829	4,44*	4,07*
— 175. u. 173. — 8. u. 7. Aug.	—	3,22	3,87
— 177. u. 178. — 19. Aug.	—	3,44	3,94 β
— 179. u. 180. — 22. Aug.	—	3,85	4,32
— 184. u. 182. — 5. u. 4. S.	—	3,32	4,41
— 186. u. 187. — 15. Sept.	—	3,95* γ	3,21*

~~Elektrische~~ ein absolutes Maß derselben angesehen

~~Elektrische~~ die von Schüller's Beobachtungen,
enthält, anführen, und zuletzt über die
gemacht wurden, Bemerkungen hinzufügen.

~~Elektrische~~ Resultate.

~~Elektrische~~ zu den negativ elektrischen Niederschlä-
gen einen regelmäßigen Wechsel.

~~Elektrische~~ am häufigsten positiv elektrisch bei Nordwin-
den; bei Südwinden; bei Nordwinden sind
am häufigsten etwas häufiger (im Verhältniß von
Südwinden sind die Niederschläge mehr
negativ elektrisch (im Verhältniß

N., S.W. und S.D. zeigen im Gegen-
satz, N. und N.W. nahezu dasselbe Ver-
hältniß, in dem Verhältniß von 220:114.

zwischen Winden stehen zwischen diesen Extremen
daß sich die drei östlichen Winde im Allge-
meinen drei westlichen Winde mehr den südlichen
den westlichen häufiger negativ als bei den
von 161:133. (Beim reinen Ostwinde
mehr negativ elektrische Regen beobachtet als
dürfte jedoch bloß zufällig sein, da dem für
den Resultat überhaupt nur wenige Beob-
achtungen konnten).

ämtlichen Niederschläge ist häufiger negativ
von 155:100.

Intensität) der positiven Elektricität der
als die der negativen in dem Verhältniß

Elektricität der atmosphärischen Niederschläge ist
negativen Elektricität am stärksten bei den
im Mittel für beide Elektricitäten am stärksten

die Elektricität im Mittel bei den drei südlichen
Stärke der Elektricität bei den drei südlichen Win-
den bei den drei nördlichen = 39:75.

zwischen Winden ist die Elektricität im Mittel in dem
stärker als bei den drei westlichen. (Bei D. und
Resultate nur eine sehr geringe Stärke, es konn-
Niederschläge bei diesen Windrichtungen überhaupt nur sehr

wenige Beobachtungen angestellt werden; ein einziges Gewitter von N. oder SO. würde ein entgegengesetztes Mittelresultat herbeigeführt haben.

10) Die mittlere Stärke der Electricität aller positiv und negativ elektrischen Niederschläge, welche sowohl bei nördlichen, südlichen, östlichen als westlichen Winden beobachtet wurden, war 58° ; es kommt dieses genau mit dem Mittel überein, welches sich für die bei Westwinden fallenden Niederschläge ergab.

11) Die Gegensätze der $+$ und $-$ Electricität treten am reinsten und stärksten bei nördlichen und östlichen Winden hervor; die $+$ und $-$ Electricität erreicht auch bei diesen Windrichtungen nahezu dieselbe Stärke. Weit weniger ist dieses der Fall bei den westlichen, und am wenigsten bei den südlichen Winden; bei den letzteren ist im Mittel die negative Electricität am schwächsten. Ihre mittlere Stärke ist bei den drei südlichen Winden selbst um das Doppelte schwächer als die positive Electricität. — Die südlichen Winde zeichnen sich daher im Allgemeinen durch eine geringere Stärke, aber größere Häufigkeit an negativ elektrischen Niederschlägen aus, die nördlichen durch größere Stärke und reinere Gegensätze der positiv oder negativ elektrischen Ladung.

12) Bei weitem die meisten elektrischen Niederschläge ereigneten sich bei West-, die wenigsten bei Ostwinden; für ihre mittlere Richtung erhält man nach Lambert's Formel, wenn S. mit 0° , W. mit 90° , N. mit 180° u. bezeichnet wird: $86^{\circ} 9'$, also West mit vier Graden Abweichung gegen SW.

Tabelle über Gähler's Beobachtungen.

Stunde.	Electricität der Stieberschläge.		Verhältniß der positiv zu den negativ electr. Stieberschlägen.	Mittlere Stärke der Electricität		Mittlere Stärke bei der Electricität.	Summe der Stieberschläge.
	positive.	negative.		positive.	negative.		
9. 12	11	100 : 92	+ 131	— 99	116	23	
9. 11	12	100 : 109	+ 105	— 132	120	23	
9. 8	5	100 : 166	+ 15	— 13	13	8	
9. 4	7	100 : 175	+ 19	— 10	13	11	
9. 5	13	100 : 260	+ 26	— 23	24	18	
9. 28	65	100 : 232	+ 66	— 33	44	93	
9. 73	106	100 : 145	+ 75	— 39	53	179	
9. 25	32	100 : 128	+ 31	— 46	40	57	
Bei den nördlichen Stieben, 9. 48	55	100 : 114	+ 74	— 75	75	108	
Bei den drei südlichen Stieben, 9. 37	85	100 : 230	+ 57	— 26	39	122	
Bei den drei westlichen Stieben, 9. 126	203	100 : 161	+ 57	— 88	48	329	
Bei den drei östlichen Stieben 9. 18	24	100 : 133	+ 71	— 72	72	42	
Zugemessene Mittel	161	251	100 : 155	+ 69	— 43	53	412

Bemerkungen über die Berechnung der Beobachtungen

Bei Berechnung der Electricität atmosphärischer Niederschläge tritt mehrere Schwierigkeiten ein. Es geschieht nämlich bei denselben hin und wieder ihre Electricität, vorzüglich bei Gewittern und vorübergehenden Reg oder Schneegestöbern, oft mehreremal zwischen $+E$ und $-E$ abzuwechseln, während die Electricität bei anderen Niederschlägen oft auch wieder so lang bloß $+$ oder $-$ electricisch bleibt. Man würde in diesem Falle die Stärke der atmosphärischen Electricität ein sehr unrichtiges Resultat erhalten, wenn man bei der Berechnung die beobachteten Grade der positiven Electricität von der negativen abziehen wollte, wie etwa Kälte- u. Wärmegrade bei Berechnung der mittlern Temperatur von einander abgezogen werden. Schöubler berechnete vielmehr, sowohl die beobachteten positiven als negativen Electricitätsgrade, jedesmal besonders. War $+$ und $-$ Electricität einige Male mit einander abwechselnd, so addirte er die beobachteten Grade sowohl zu den $+$ als $-$ electricischen Niederschlägen; jezt sich ein Überwiegen der $+$ oder $-$ Electricität, so wurden diese in entsprechendem Verhältniß in Rechnung gebracht; zeigte ein Niederschlag die dieselbe Electricität in verschiedener Stärke, so wurde bloß der höchste beobachtete Grad der Electricität einmal in Rechnung gebracht, indem sich das Elektrometer während der meisten Regen in einer anhaltend schwankenden Bewegung befindet, je nachdem der Regen mehr oder weniger dicht, gleichförmig oder abgebrochen fällt.

Die Mittel für die vier Hauptwindrichtungen der nördlichen, südlichen, westlichen und östlichen Winde, so wie das mittlere Hauptresultat, ist ein aus dem Mittel je von drei oder acht Winden gezogenes Mittel, sondern der Berechnung dieser Mittel liegen die Summen der sämmtlichen an den einzelnen Windrichtungen angestellten, Beobachtungen zu Grunde

über Gewitterbildung, von Dove *).

Dove bestreitet die Ansicht, daß die Electricität das Ursächliche der Gewitterbildung sei, und stellt die Gründe zusammen, nach denen die bei Gewitter hervortretende Electricität vielmehr umgekehrt eine secundäre Wirkung rascher Wolkenbildung und eines plötzlichen Niederschlages ist, d. h. Umstände, welche einen solchen raschen Niederschlag begünstigen, müßten daher nach ihm auch der Erzeugung der Gewitter günstig sein, wozu z. B. zugswelse das Vermischen zweier Winde von sehr ungleicher Temperatur gehört. Dove erörtert hierauf die Bedingungen, welche ein solches leichtesten herbeiführen können.

Nach früheren Auseinandersetzungen von Dove **) erfolgt die Bildung des Windes oder die Succession, in der ein Wind in den andern übergeht, in der Regel in der Richtung SWND, und es verdrängt

*) Pogg. XIII. 419.

**) Vergl. Biot's Lehrb. V. 461.

nördlicher Wind rascher den südlichen als umgekehrt. Nichts wird eine rasche Vermischung ungleich warmer Luftströme vorzugsweise bei einer Drehung des Windes SWD erfolgen; es wird, ehe das Gewitter heraufkommt, im Allgemeinen ein südlicher Wind wehen, nachher ein nördlicher, die Gewitter: überhaupt aber vorzugsweise der Westseite der Windrose anheim fallen. Da der kältere Wind zuerst unten einströmt, so wird unmittelbar vor der Gewitterwolke der kältere nördliche Wind herwehen, und, insofern dem nördlichen Winde im Allgemeinen ein höherer, dem südlichen ein tieferer Barometerstand entspricht, das Barometer während des Gewitters rasch steigen, die Temperatur sich nach demselben bedeutend erniedrigen.

Folgen mehrere Gewitter rasch auf einander, so wird das folgende Gewitter im Allgemeinen aus einer immer mehr nördlichen Gegend kommen.

Soll durch einen südlichen Wind, der auf einen kältern Wind folgt, plötzliche Vermischung entstehen, so muß die Intensität des südlichen Windes bedeutend sein. Solche Gewitter gehören der Ostseite der Windrose an; sie müssen höher ziehen und können sich wegen der widerstehenden kältern Luft nur langsamer fortpflanzen. Das Barometer fällt während solcher Gewitter, während die Temperatur sich erhöht. Sie sind im Ganzen selten. Übereinstimmend mit diesen sind die seltenen Gewitter der Westseite während des Zurücksprunges des Windes. Auch bei diesen fällt das Barometer, steigt die Temperatur.

Dove stellt die Erfahrungsdata zusammen, welche die Gültigkeit der oben ausgesprochenen Sätze im Allgemeinen bestätigen. In diesem Bezuge verweisen wir auf die Originalabhandlung.

Relative Häufigkeit der Gewitter in den einzelnen Monaten.

Nach Schmöger *) war die Zahl der Gewitter über oder nahe an Regensburg seit 1774 bis 1830 (incl.) folgende:

Januar	8	Mai	155	September . . .	71
Februar	3	Juni	209	October	18
März	11	Juli	217	November . . .	5
April	64	August	210	December . . .	3

*) Abth. II. Arch. IV. 110.

IX. Erbmagnetismus.

Methode, die Variationen der Inclination und Declination zu vergrößern und zu berechnen, von Moser *).

Moser giebt im Nachfolgenden eine Methode, die Veränderungen, sei es der Inclination oder der Declination, so zu vergrößern, daß sie in allen Fällen beobachtet werden können, und die wirklichen Inclinationen und Declinationen dann daraus zu berechnen. Diese Methode beruht darauf, daß die Veränderungen in der Richtung der Nadel durch die abstoßende Kraft eines festliegenden Magneten unterstützt werden. Zwar hat schon Biot **) dieselbe angedeutet, aber für die Ausführung nicht hinreichend brauchbar gemacht. Mit Übergehung der mathematischen Herleitung der nachfolgenden Methode, über die wir auf das Original verweisen **), beschränken wir uns, das Wesentliche derselben selbst anzuführen.

Man habe eine, um ihren Schwerpunct als Mittelpunkt bewegliche, Declinations- oder Inclinationsnadel. Man bringe in die Verlängerung derselben und in einem Abstände von ihr, der groß genug ist, daß die Nadel keine Umkehrung dadurch erfährt, einen festliegenden Magneten an, so daß Nadel und Magnet einander die feindschaftlichen Pole zuehren, und beobachte nun die Winkel z , um welche die Nadel unter dem Einfluß des Magneten vermöge der Variationen der Declination oder Inclination abweicht. Diese Winkel werden größer sein, als wenn der festliegende Magnet nicht vorhanden wäre, und mithin eine leichtere Beobachtung gestatten. Man wird aber den Winkel i , welcher die wahre Variation in der Inclination oder Declination, die bei Abwesenheit des Magneten Statt finden würde, ausdrückt †), aus dem Winkel z nach der folgenden Gleichung ableiten können:

$$\frac{\sin(z - i)}{\omega \sin z} = a - b \sin^2 \frac{1}{2} z + c \sin^4 \frac{1}{2} z - d \sin^6 \frac{1}{2} z + \dots \quad (1)$$

In dieser Gleichung sind a , b , c , d. h. constante Größen, welche auf folgende Weise durch Versuche bestimmt werden ††).

*) Pogg. XX. 431.

**) Ann. de Ch. et de Ph. XXIV. 140.

***) Es sind darin einige bedeutende Druckfehler vorhanden:

G. 437 Z. 5 v. u. p statt h

ebend. — 4 v. u. — statt =

— 444 — 24 v. u. β^2 statt θ und θ^2 .

†) In Bezug auf das Nachfolgende ist darauf Acht zu haben, daß der Winkel i die Abweichung der Lage des fixen Magneten vom jedesmaligen magnetischen Meridian ausdrückt, dessen veränderliche Lage aber durch die Variationen der Declination und Inclination erkannt wird.

††) Sie sind abhängig von der Intensität und Vertheilung des Magnetis-

Bestimmung der magnetischen Inclination und Declination. 81

Aus dem Centrum der beweglichen Nadel-beschreibe man einen Kreis in der Ebene der Bewegung dieser Nadel, also vertical bei einer Inclinations-, horizontal bei einer Declinationsnadel. Den Kreis theile man ein, indem man den Meridian oder die Verlängerung der Neigungslinie mit 0 bezeichnet. Den festen Magneten lege man, mit seinem abstoßenden Pole der Nadel zugetehrt, successive in verschiedene Radien dieses Kreises*), wobei aber der Mittelpunct des Magneten von dem der Nadel immer in derselben Entfernung bleiben muß, in der man ihn bei den nachherigen Beobachtungen fest legt.

Man nenne i den Winkel, den der Magnet, z den, welchen die Nadel mit dem Meridian oder der Neigungslinie macht, und substituirt die beobachteten Werthe von z und i in die Gleichung (1). Solchergehalt verschaffen man sich so viele Eliminationsgleichungen, als man unbekannte a , b , c ... angenommen hat, und bestimme diese hieraus. Für die kleinen Werthe, welche z vermöge der Variation der Declination oder Inclination erhält, ist es vollkommen hinreichend, deren drei beizubehalten. übrigens hat man eine Probe, ob die Coefficienten durch diese Elimination hinlänglich genau gefunden worden sind, darin, daß man a noch auf folgende Weise, unabhängig von den anderen Coefficienten, bestimmt, und zusieht, ob der so gefundene Werth mit dem durch Elimination gefundenen übereinstimmt. Es läßt sich nämlich der erste Coefficient a auch durch Schwingungen der Magnetenadel nach folgender Formel finden,

$$a = 1 - \frac{t^2}{\theta^2}$$

wo t die Schwingungsdauer der Nadel unter dem bloßen Einflusse der Erde, θ die Schwingungsdauer derselben unter dem gemeinschaftlichen Einflusse der Erde und des Magneten bei der zu Anfang angegebenen fixen Lage desselben bedeutet.

Die Größe ω anlangend, so drückt sie bloß die Correction aus, die man wegen der Änderungen der Intensität anbringen muß, welche der festliegende Magnet vermöge Temperaturveränderungen erfährt. Diese Größe ω ist nämlich gleich der Intensität des Magneten für die beobachtete Temperatur, wenn man die Intensität bei der Temperatur, von der man ausgeht, $= 1$ setzt, und sie läßt sich durch Eintauchungsversuche nach den Regeln bestimmen, welche Th. II. S. 45 gegeben sind. übrigens wird diese Correction in den meisten Fällen so unbedeutend sein, daß man $\omega = 1$ setzen kann. Die Temperatur der Nadel macht an sich keine Correction nöthig,

muß in der Erde, der Nadel und dem festliegenden Magneten, von dem Trägheitsmomente der Nadel und von der Entfernung des Magneten von der Nadel.

*) Hierbei muß Obacht genommen werden, daß diese Radien nicht zu weit von dem Meridian abweichen dürfen, weil sonst so große Werthe von z erhalten werden würden, daß man zu viel Glieder von der Gleichung (1) für die richtige Bestimmung der Coefficienten durch Elimination beibehalten müßte.

da der Factor, den sie einführen würde, allen Gliedern der Gleichung (1) gemeinschaftlich wird.

Streng genommen erleiden die Coefficienten a , b , c ... auch durch Veränderung der tellurischen Intensität eine Veränderung, da sie mit hieson abhängen; der Einfluß, der hievon auf die Bestimmung von i resultirt, ist jedoch bei den geringen Veränderungen, welche die tellurische Intensität erfährt, jedenfalls so gering, daß man nicht nöthig hat, eine Correction deshalb anzubringen, zu der ohnehin kein einfacher Weg in diesem Falle vorliegt.

Beiläufig findet man aus der Formel (1), daß die Vergrößerung der Variationen durch das vorstehende Verfahren für kleine Werthe von i durch $\frac{1}{1-a}$ dargestellt wird, so daß, wenn z. B. $a = 0,853767$ gefunden wird, die Vergrößerung beinahe siebenmalig sein wird.

Der Verfasser bewährt die Ausführbarkeit des hier Entwickelten durch eine mit einer Declinationsnadel angestellte Versuchreihe.

Beseitigung der Fehler beim Messen der magnetischen Neigung, nach Kupffer *).

Wenn man die magnetische Neigung mittelst eines Inclinationsinstruments beobachtet, so können verschiedene, von der Construction des Instrumentes abhängige Irrthümer wegfallen, von deren Beseitigung das Folgende handeln wird.

Die größere oder geringere Abweichung, die jede beobachtete Neigung von der wahren zeigt, kann folgende Ursachen haben:

- 1) Der Collimationsfehler des getheilten Kreises, d. h. wenn der Nabel des Kreises, der durch den Nullpunkt der Einteilung geht, nicht vollkommen horizontal ist.
- 2) Der Collimationsfehler der Nadel, wenn eine Linie, die durch die beiden Endspitzen der Nadel geht, mit der magnetischen Axe derselben nicht genau parallel ist.
- 3) Wenn die Achatplatte, auf welcher die Nadel ruht, nicht vollkommen horizontal ist.
- 4) Wenn der Schwerpunkt der Nadel nicht vollkommen genau mit dem Drehungspunkt zusammenfällt.

Hiezu kommt noch der Fehler, welcher entsteht, wenn der Drehungsmittelpunkt der Nadel nicht genau im Mittelpunkte des Kreises liegt, welcher indeß sofort verschwindet, wenn man das Mittel aus den beiden Ablesungen an beiden Enden der Nadel nimmt **).

*) Pogg. XXIII. 449.

**) Poncelet (Pogg. XXI. 406) fügt zu diesen Fehlerquellen noch die Abweichung der Nadeln von der cylindrischen Form und eine mögliche schwache magnetische Polarisation des eingetheilten Kreises. Über die Beseitigung dieser Fehlerquellen s. den folgenden Artikel.

Hat man die Axe der Busssole vermittelt des Niveau's, welches an derselben befestigt ist, vollkommen senkrecht gestellt, so wird durch Umdrehung des getheilten Kreises von 180° um diese Axe der erste der angeführten Fehler, ohne seinen Werth zu ändern, negativ, verschwandet also im Mittel aus beiden Beobachtungen.

Der zweite Fehler verschwindet auf eben dieselbe Weise, wenn man die Nadel auf ihren Unterlagen umkehrt.

Der dritte Fehler hebt sich ebenfalls auf, wenn man den getheilten Kreis, in dessen Mittelpunkt die Nadelplatten befestigt sind, — 180° um die verticale Axe herumdreht.

Zur Beseitigung des vierten und größten Fehlers endlich, den wir den Schwerpunktsfehler nennen wollen, sind schon früher von Borda und Mayer Methoden angegeben worden, denen Kupffer neuerdings eine dritte hinzugefügt hat. Diese werden wir nach einander mittheilen, indem wir jedoch hinsichtlich der mathematischen Herleitung derselben auf die Originalabhandlung Kupffer's verweisen.

Unter ω werde das Azimuth der Nadel, vom magnetischen Meridian an gemessen, verstanden, wonach das Azimuth $\omega = 0$ in das von $\omega = 180^\circ$ dadurch verwandelt wird, daß man das Instrument aus der Lage, wo sich die Nadel in der Ebene des magnetischen Meridians befindet, um 180° oder im Halbkreise um seine verticale Axe dreht.

Methode von Borda. Diese Methode erfordert 4 Beobachtungen:

- 1) eine bei $\omega = 0^\circ$ und eine bei $\omega = 180^\circ$;
- 2) dieselben Beobachtungen nach Umkehrung der Pole.

Unter Voraussetzung, daß der Magnetismus der Nadel vor und nach Umkehrung der Pole gleiche Intensität behalten hat, und daß die beobachteten Neigungen schon von den ersten drei Fehlern befreit sind, ist die wahre Neigung das arithmetische Mittel aus jenen vier beobachteten Neigungen.

Größerer Genauigkeit halber fügt man gewöhnlich noch eine Wiederholung dieser vier Beobachtungen hinzu, nachdem man die Nadel auf den Unterlagen umgekehrt hat, und nimmt dann das Mittel aller acht Beobachtungen. Bei gut ausgeführten Nadeln giebt indeß die Wiederholung dasselbe Resultat als die vier ersten Beobachtungen.

Methode von Mayer. Bei dieser Methode hat man absichtlich den Schwerpunct der Nadel vom Drehungsmittelpuncte zu entfernen, durch Befestigung eines kleinen Gewichtes an der Seite der Nadel, auf einer Einke, die durch den Mittelpunkt der Nadel geht und mit der Länge der Nadel einen rechten Winkel macht *). Wenn man keine so zugerichtete Nadel besitzt, so kann man ein Stückchen Siegellack an die Nadel kleben. Macht man nun eine erste Beobachtung bei $\omega = 0^\circ$, eine zweite bei

*) Es ist hinreichend, wenn diese Umstände nur annäherungsweise getroffen sind.

$\omega = 180^\circ$, kehrt nun die Nadel auf den Unterlagen um, macht eine dritte Beobachtung bei $\omega = 180^\circ$ und eine vierte bei $\omega = 0^\circ$, wiederholt endlich diese vier Beobachtungen nach Umkehrung der Pole und bezeichnet das Mittel aus der ersten und dritten Beobachtung mit Θ , das Mittel aus der zweiten und vierten mit Θ' , das Mittel aus der fünften und sechsten mit Θ'' und das Mittel aus der seventh und achten mit Θ''' , die wahre Neigung mit α , so hat man:

$$\cot \alpha = \frac{\cot \Theta \cdot \cot \Theta'' - \cot \Theta' \cdot \cot \Theta'''}{(\cot \Theta + \cot \Theta'') - (\cot \Theta' + \cot \Theta''')}$$

In dieser Formel ist nicht vorausgesetzt, daß die magnetische Kraft der Nadel vor und nach der Umkehrung der Pole sich gleich bleibe. Ist dies indes der Fall, so erhält die Formel folgende weit einfachere Gestalt:

$$\tan \alpha = \frac{1}{\cot \Theta + \cot \Theta'} + \frac{1}{\cot \Theta'' + \cot \Theta'''}$$

Bei dieser Methode verschwinden die drei ersten Fehler von selbst.

Die Mayer'sche Formel ist nur da anwendbar, wo die Werthe von Θ und Θ' sehr verschieden sind, die Barba'sche Methode nur da, wo es dem Künstler gelungen ist, dem Schwerpunkte der Nadel eine sehr geringe Entfernung vom Mittelpunkte der Drehung zu geben. Sie setzt überdies voraus, daß die magnetische Kraft der Nadel sich durch die Umkehrung der Pole nicht ändert, welches nicht immer der Fall ist. Es ist aber wünschenswerth eine Formel zu finden, die auf diese Änderung der Intensität Rücksicht nimmt, and doch den Fall, wo Θ nahe gleich Θ' ist, nicht ausschließt. Dies constituirte die nachfolgende Methode von Kupffer.

Methode von Kupffer. Bei dieser Methode ist erforderlich, außer der Neigung noch die Zeit zu beobachten, welche die Nadel braucht, um eine gewisse Anzahl von Schwingungen in ihren verschiedenen Stellungen zu vollbringen.

Es mögen $\Theta, \Theta', \Theta'', \Theta'''$ dieselbe Bedeutung wie bei Mayer's Methode haben; es mögen ferner ν, ν', ν'', ν''' die respectiven Zeiten bedeuten, welche die Nadel zu derselben Zahl von Schwingungen bei gleicher Anfangsamplitude in den verschiedenen Lagen braucht, welchen die Werthe von $\Theta, \Theta', \Theta'', \Theta'''$ zugehören *); dann hat man, wenn der Kürze halber gesagt wird:

$$\begin{aligned} \frac{\nu^2 + \nu'^2}{\cos \Theta + \cos \Theta'} &= A, & \frac{1}{\cot \Theta + \cot \Theta'} &= C \\ \frac{\nu''^2 + \nu'''^2}{\cos \Theta'' + \cos \Theta'''} &= B, & \frac{1}{\cot \Theta'' + \cot \Theta'''} &= D \\ \frac{1}{2} \tan \alpha &= \frac{AD + BC}{A + B} \end{aligned}$$

*) Jeder Werth von ν, ν' etc. ist mithin ebenso das Mittel aus zwei beobachteten Schwingungszeiten, als Θ, Θ' etc. das Mittel aus zwei beobachteten Neigungen.

über noch einige andere Fehlerquellen bei Bestimmung der magnetischen Neigung, von Hansteen *).

Hansteen macht über diesen Gegenstand folgende Bemerkungen: Die englischen Nadeln sind im Allgemeinen im Verhältniß ihrer Länge zu schwer, und die Zapfen der Axen zu dick und nicht genau genug gearbeitet. In diesem Stücke zeichnen sich die Gambey'schen Instrumente aus, welche unstreitig die vorzüglichsten sind. Allein obgleich die Instrumente dieses ausgezeichneten Künstlers dem Beobachter den größten Theil seiner Mühe ersparen, sind sie doch auch nicht ganz unfehlbar. Wenn die Nadel durch die Zange gehoben und wieder auf den Steinen niedergelassen wird, kommt sie nicht immer genau auf denselben Puncte in Ruhe, wovon sich der Verfasser durch Beobachtungen mit fünf verschiedenen Instrumenten dieses Künstlers überzeugte; Abweichungen von 3' bis 5' sind gewöhnlich, von 10' oder darüber seltener. Die von den meisten Beobachtern angewandte Methode, bloß die Nadeln Ein Mal in jeder Lage zu beobachten, ist mithin nicht genügend, wenn man sich einer einzelnen Minute im Endresultate vergewissern will. Hansteen hebt immer die Nadel vier Male in jeder Lage und rechnet sonach 32 Ableesungen für eine vollständige Beobachtung. Hiezu kommen noch die constanten Fehler des Instrumentes. Diese haben ihren Ursprung in zwei verschiedenen Ursachen: in der Abweichung der Zapfen von der cylindrischen Form, und in einer möglichen schwachen magnetischen Polarität des eingetheilten Kreises. An einer und derselben Stelle der Erdoberfläche ruht die Nadel bei den vier Umlegungen immer auf den nämlichen vier Puncten der Zapfen, und die Abweichung der Zapfen von der Cylinderform hat also immer dieselbe Wirkung. Gambey hat diese Unsicherheit zu heben gesucht, indem er jedem Instrumente zwei Nadeln mitgab. Wenn diese zwei Nadeln einerlei Resultat geben, so ist es nicht wahrscheinlich, daß die Fehler in beiden Axen nach derselben Seite wirken. Geben aber diese zwei Nadeln ein verschiedenes Resultat **), so ist man nicht sicher, welche von beiden Nadeln das rechte giebt, oder ob ein Medium aus beiden die Wahrheit ist. Hansteen hat es daher vortheilhafter gefunden, eine lose Axe zu benutzen, welche mit starker Reibung in der Nadel umgedreht werden kann. Wenn eine Inclinationsbeobachtung beendigt ist, wird die Axe 45° oder 90° umgedreht und eine neue Inclination beobachtet, und auf diese Weise weiter fortgefahren, die Axe bei jeder neuen Reihe umzudrehen, bis sie in die erste Lage zurückkehrt. Gewöhnlich findet man bei diesem Verfahren eine Lage der Axe, in welcher die Nadel immer die größte, und eine andere, in welcher sie immer die kleinste Neigung giebt. Ein Medium aus allen

*) Pogg. XXI. 404.

**) Professor Kupffer in Petersburg hatte ein Gambey'sches Instrument, an welchem die eine Nadel immer ein um mehrere Minuten größeres Resultat gab, als die andere.

diesen ist höchst wahrscheinlich vom Einflusse der Fehler der Aze befreit, und eine Nadel mit beweglicher Aze leistet folglich dieselben Dienste, wie vier oder acht Nadeln mit fester. Je leichter die Nadel und je freier die Zapfen im Verhältnisse der Nadel sind, desto geringer werden natürlicher Weise diese Differenzen.

Der Bequemlichkeit der Ableseung willen müssen die Spitzen der Nadel beinahe den eingetheilten Kreis berühren, so daß der Abstand höchstens $\frac{1}{10}$ Linie ist. In einer so geringen Entfernung hat aber das unbedeutendste Eissentheilchen, oder was immer für eine andere magnetische Kraft, im eingetheilten Kreise einen merkwürdigen Einfluß auf die Stellung der Nadel, da sie auf den Endpunct eines so langen Hebels wirkt. Sind beide Nadeln gut abgewogen, so werden ihre Spitzen an einer und derselben Stelle der Erde sehr nahe um die nämlichen vier Punkte des Limbus spielen, und diese werden also auf beide Nadeln denselben Einfluß haben. Um sich von dem Dasein einer solchen Wirkung zu überzeugen, giebt es kein anderes Mittel, als, nach Mayer's Vorschlage, das Gleichgewicht der Nadel aufzuheben, so daß sie bei den vier Umkehrungen sehr verschiedene Stellungen annimmt, in der einen z. B. über den neunzigsten Grad in den nächstliegenden Quadranten einschrittet. Giebt die Nadel alsdann mit verschiedenen Gewichten dieselbe Neigung, und stimmt diese wiederum mit dem Resultate überein, was gefunden wird, wenn die Nadel abgegleitet ist, so ist man sicher, daß sich keine konstanten Fehler von dieser Art finden; im entgegengesetzten Falle ist eine Mittelzahl aus den verschiedenen Resultaten allemal sicherer, als eine einzelne Beobachtung mit abgegleiteter Nadel; und dies ist Hansteen's Meinung nach der einzige, aber zugleich bedeutende Nutzen dieser Methode. Hat man einmal gefunden, daß das gebrauchte Instrument von diesem Fehler frei ist, alsdann kann man mit Sicherheit die gewöhnliche Methode anwenden.

Der Verfasser erläutert diese Bemerkungen durch mehrere Beobachtungen.

Maß der Intensität des Erdmagnetismus.

Poisson hat eine Methode angegeben, die magnetische Intensität eines Ortes durch Anwendung zweier Nadeln, unabhängig von der Intensität beider Nadeln, zu bestimmen, welche den Vortheil gewährt, die Intensität des Erdmagnetismus zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten mit einander vergleichen zu können, auch wenn man sich nicht derselben Nadeln dabei bedienen kann, oder wenn die Nadeln ihren Magnetismus in der Zwischenzeit der Beobachtungen geändert haben sollten *).

Die Lösung dieses Problems nach Poisson's Methode kommt auf Folgendes zurück.

*) Ausführlich entwickelt ist diese Methode in Pouillet's Elem. de Ph. I. 494; auch hinreichend in Pogg. XVIII. 227.

Man hobe zwei, horizontal in ihrem Schwerpunkte aufgehängene, Magneten*), A und B, deren eine in die Verlängerung der andern, im magnetischen Meridian fällt. Der Abstand ihrer Schwerpunkte sei r , der Winkel, den ihre horizontale Lage mit der Linie der Neigungsnadel bildet, sei i , ihre Schwingungszeit in unendlich kleinen Bogen, wenn sie unter gegenseitigem Einfluß bloß durch den Einfluß der Erde schwingen, sei für A und t_1 für B; ihre Trägheitsmomente in Bezug zur Drehungsaxe seien respectiv m und m_1 , $\pi = 3,141\dots$; endlich φ die magnetische Erdkraft, so hat man

$$\varphi = \frac{\pi^2 \sqrt{k} \sqrt{m m_1}}{t_1 t_2 \cos i \sqrt{u}}$$

In dieser Formel kann $\sqrt{k} = 1$ gesetzt werden**), m , m_1 , t_1 , t_2 , lassen sich auf bekannte Weise finden, und es ist daher zur Lösung des Problems bloß noch u zu bestimmen, welches eine von den Dimensionen der Nadeln und der Intensität und Vertheilung des Magnetismus darin abhängige Größe ist.

Zu dieser Bestimmung von u gelangt man auf dem Versuchswege, indem man eine Nadel in Gegenwart der andern bei abgeänderten Entfernungen ihrer Schwerpunkte schwingen läßt, und zwar auf folgende Weise. Es heiße Θ die Schwingungszeit der Nadel A, auf unendlich kleine Bogen reducirt, wenn sie in Gegenwart der andern, die hiebei befestigt ist, schwingt, während ihr Schwerpunct im Abstände r von dem der andern ist. Es habe Θ_1 dieselbe Bedeutung für B, so findet man u durch folgende Gleichungen***).

$$\left. \begin{aligned} u + \frac{a}{r^2} + \frac{b}{r^4} + \text{etc.} &= \frac{m \pi^2 r^2 (t^2 - \Theta^2)}{2 t^2 \Theta^2} \\ u + \frac{a_1}{r^2} + \frac{b_1}{r^4} + \text{etc.} &= \frac{m_1 \pi^2 r^2 (t_1^2 - \Theta_1^2)}{2 t_1^2 \Theta_1^2} \end{aligned} \right\} (f)$$

Aus diesen Gleichungen sind die Unbekannten a , b , ..., a_1 , b_1 , ..., zu eliminiren, was dadurch geschieht, daß man die Beobachtung der Schwingungszeiten beider Nadeln mit Abänderung von r wiederholt und sich dadurch so viele Gleichungen (f) verschafft, als zur Elimination der Unbekannten a , b , ..., a_1 , b_1 , ... nöthig sind, deren man um so mehr wird beizubehalten haben, je kleinere Werthe von r man hiebei anwendet. Die Gleichungen

*) Man könnte auch Neigungsnadeln, die dann in ihre gegenseitige Verlängerung zu stellen wären, anwenden; in diesem Falle hätte man bloß nöthig, in den obigen Formeln $\cos i = 1$ zu setzen.

**) Mit k wird nämlich die Constante bezeichnet, welche die Größe der gegenseitigen Wirkungen zwischen zwei als Einheit gesetzten Quantitäten magnetischer Flüssigkeit bei der Einheit des Abstandes bezeichnet. Diese Größe ist unabhängig von Art, Temperatur und Träger des Magnetismus.

**) Jede bestimmt schon für sich den Werth von u , daher man sie zu gegenseitiger Controlle benutzen kann.

chungen (f) gelten inzwischen nur in der Voraussetzung einer symmetrischen Vertheilung des Magnetismus in jeder der beiden Nadeln zu beiden Seiten ihres Schwerpunktes; da man jedoch nie sicher sein kann, daß dieser Umstand vollständig erreicht ist, so muß man noch neue Unbekannte durch r , r^2 , r^3 etc. dividirt einführen, und auf ähnliche Weise eliminiren. Noch muß auch bemerkt werden, daß bei den Nadeln eine hinlängliche Coercitivkraft vorausgesetzt ist, daß sie durch ihren wechselseitigen Einfluß nicht die Vertheilung des Magnetismus, die in ihnen Statt findet, ändern können.

Die hier erörterte Methode ist theoretisch zulässig, allein der Ausführung derselben treten die beiden Schwierigkeiten entgegen, 1) daß man noch keine Correctionsformel hat, um die Schwingungen, die eine Nadel in Gegenwart der andern macht, auf unendlich kleine Bogen zurückzuführen, 2) daß die Gleichungen (f) sehr wenig convergent sind, so daß man zufolge eines von Moser und Kieß gegebenen Beispiels bei zu Grundelegung derselben kaum mit der Annahme von fünf oder sechs Unbekannten auch nur irgenbs zusammenstimmenbe Werthe erhält. Beiden Uebelfänden läßt sich nach Moser und Kieß *) durch Anwendung folgender Methode abhelfen, bei der es nur nöthig ist, zwei der Gestalt nach gleiche Nadeln (bei denen m und m_1 mithin gleich gesetzt werden können) anzuwenden, und die zugleich in der magnetischen Kraft so wenig verschieden sind, daß man auf beide dieselbe Correction wegen Reduction auf unendlich kleine Bogen statthaft finden kann**).

Dann bestimmt sich u direct durch folgende Gleichung, in welcher Θ und Θ_1 schon corrigirt enthalten sind, t und t_1 aber auf die gewöhnliche bekannte Weise noch zu corrigiren sind:

$$\Theta_1^2 u + \Theta_1^2 \frac{a_1}{r^2} + \Theta_1^2 \frac{b_1}{r^2} \dots - \Theta^2 u - \Theta^2 \frac{a}{r^2} - \Theta^2 \frac{b}{r^2} - \text{etc.} = \frac{m\pi^2 r^2}{2} \left(\frac{\Theta^2}{t^2} - \frac{\Theta_1^2}{t_1^2} \right) \quad (k)$$

Wenn im Laufe des Versuches Änderungen in der Intensität des Erdmagnetismus oder in der Temperatur eintreten, so sind dieserhalb noch besondere Correctionen anzubringen. Gesezt der Werth der Kraft φ , welchen man der Rechnung zu Grunde legen will, veränderte sich während der Versuche in $p\varphi$, so muß man die Werthe von t'^2 und Θ'^2 , welche bei dieser Kraft beobachtet worden sind, nach folgenden Gleichungen auf die Werthe von t^2 und Θ^2 , welche für die Kraft φ gelten, zurückführen:

$$t^2 = pt'^2; \quad \Theta^2 = \frac{\Theta'^2 t^2}{t^2 - (p - 1) \Theta'^2}$$

*) Pogg. XVIII. 226; XIX. 161.

**) Man hat dann nämlich nur Θ^2 und Θ_1^2 in der Formel (f) mit einem unbekannten Factor zu multipliciren, der die Reduction auf unendlich kleine Bogen bedeutet und diesen Factor zwischen beiden Formeln zu eliminiren, was zu obiger Gleichung führt.

Die Correction wegen der Temperatur anlangend, so sei die Intensität der Nadeln vermöge veränderter Temperatur von μ zu $\omega\mu$ geworden, so hat man, um die beobachteten Zeiten t' und θ' zu corrigiren, folgende Gleichungen:

$$t^2 = \omega t'^2; \theta^2 = \frac{\omega^2 \theta'^2 t^2}{t^2 - \theta'^2 \omega (1 - \omega)}$$

Hinsichtlich einer etwaigen nicht symmetrischen Vertheilung des Magnetismus in den Nadeln gilt übrigens auch bei der Methode von Moser und Rieß das S. 88 Erwähnte, und es sind dann eben so in die Gleichung (g) noch Unbekannte, mit r , r^3 u. dividirt, einzuführen. übrigens kann man auf dem Versuchswege finden, ob die Bedingung der symmetrischen Vertheilung erfüllt ist, indem man nämlich jede der beiden Nadeln vor jedem der beiden Pole der andern (in gleichem Abstände) schwingen läßt. In Fall der symmetrischen Vertheilung muß dann die Gleichung erfüllt werden:

$$\frac{1}{\theta^2} + \frac{1}{\theta'^2} = \frac{1}{t^2}$$

woin t die Schwingungszeit einer Nadel für sich, θ die Schwingungszeit vor dem freundschaftlichen, θ' die vor dem feindschaftlichen Pole der andern Nadel bedeutet.

Die Verfasser entwickeln noch die Formeln zur Bestimmung von u nach Herleitung der Werthe von a , b ,... (Pogg. XVIII. 236; XIX. 168), und zeigen an einem Beispiele die völlig genügende Anwendbarkeit jener Methode.

über Erdmagnetismus im Allgemeinen.

Als ein gewiß sehr beachtungswerthes Argument für die Annahme, daß die Erde nicht sowohl ein selbstständiger Magnet sei, als vielmehr, auf analoge Weise als ein Stück weiches Eisen, von Außen durch Vertheilung magnetisirt werde (wahrscheinlich durch den Einfluß der Sonne), macht Kupffer *) Folgendes geltend. Wenn die letztere Annahme die richtige ist, so muß die Intensität der magnetischen Erdkraft mit der Bodentemperatur zunehmen, weil die Leichtigkeit der magnetischen Vertheilung mit der Temperatur wächst (vgl. Biot IV. 61); wäre die erstere richtig, so müßte sie abnehmen (vgl. ebend. S. 68). Nun scheinen die Beobachtungen, die freilich in dieser Hinsicht noch nicht zahlreich genug sind, zu ergeben, daß, wenn eine Linie gleicher Neigung durch mehrere Puncte geht, die eine gleiche Bodentemperatur haben, auch die Intensität der magnetischen Kraft für sie dieselbe ist; respectio größer oder geringer dagegen, wenn sie eine größere oder geringere Bodenwärme zeigen **). Hieraus würde zugleich erhellen, warum der Pol der Intensitäten südlicher fällt, als der Pol der

*) Pogg. XV. 190.

**) Di. Belege s. in Pogg. XV. 191.

Neigungen. Da die Bodentemperatur nach dem Norden hin abnimmt, gehen die dem Neigungspole zunächst liegenden Linien gleicher Neigung im Norden desselben durch kältere Punkte, als im Süden; in jenen kälteren Punkten muß aber nach dem Obigen die Intensität geringer sein, als in diesen wärmern, man muß also den Pol der Intensitäten, d. h. den Punkt, wo die Intensitäten ihr Maximum erreichen, im Süden vom Neigungspole suchen, wo er sich, nach den neuesten, von Hansteen berechneten Beobachtungen auch wirklich findet. Es liegt nämlich hienach der Neigungspol unter 71° Breite und 102° Länge, der Intensitätspol unter 5° Breite und 80° Länge von Paris.

über die Gestalt der isogonischen, isoklinischen und isodynamischen Linien im Jahr 1829, von G. A. Erman *).

Auf einer in den Jahren 1828, 1829 und 1830 ausgeführten Reise hat Erman die Intensität der magnetischen Kraft, die Declination und Inclination an 310 verschiedenen Orten der Erdoberfläche bestimmt; 12 dieser Orte befinden sich auf dem Continente der alten Welt zwischen dem Meridian 15° und 160° D. L. (von Greenwich), die übrigen größtentheils auf Meeren, die unter Meridianen von mehr als 160° D. L. liegen.

Erman hat die Linien gleicher Abweichung, gleicher Neigung und gleicher Intensität, welche sich durch graphische Interpolation dieser Beobachtungen ergeben, in zwei Charten, einer größern und einer kleinern, gezeichnet, welche sich in Pogg. Ann. XXI. Taf. II. finden. Die größere ist einen zu großen Umfang, als daß wir sie mit Fug hier aufnehmen könnten; dagegen habe ich die kleinere, welche bloß Behufs einiger Erörterungen in Projection einer isoklinischen Linie (75°) und einer isodynamischen Linie ($1,45$) auf die Ebene des Erdaequators enthält, aufgenommen (Fig. 98.) Die Länge ist überall von Greenwich an nach Osten gezählt.

In genauem Bezuge zu den Gegenständen der Erman'schen Untersuchungen stehen die von Hansteen in Pogg. XXI. 361, welchen ebenfalls eine, für das Jahr 1829 geltende, Abweichungscharte, theils nach eigenen, theils nach mehreren fremden Beobachtungen entworfen, beigelegt ist. Wir werden diese, welche in dem hier betreffenden Bezuge nicht so umfassend sind, als die Erman'schen, zu einigen Anmerkungen benutzen.

Die wesentlichsten Resultate, welche sich aus Erman's Untersuchungen und dem Anblick der Charten ergeben, sind folgende **):

*) Pogg. XXI. 119.

**) Ich bemerke ausdrücklich, daß das Nachfolgende dem, welcher sich gründlich über diesen Gegenstand unterrichten will, das Studium der Originalabhandlung nebst der größeren Charte nicht überflüssig machen kann. Das Obige ist aber wenigstens dazu dienen, den großen Gehalt und die Wichtigkeit dieser Untersuchungen anzuzeigen.

1. Isogonische Linien oder Linien gleicher Abweichung.

Von 80° Länge an wird das asiatische Festland durch eine ununterbrochene Linie ohne Abweichung in zwei Theile getheilt (Fig. 99. vorigen Bandes); im Norden derselben findet man nur östliche, im Süden westliche Abweichungen. Vergleicht man diese Nulllinie mit einer Darstellung derselben für das Jahr 1800 (in Hansteen's Magnetismus der Erde, Atlas Taf. X.), so sieht man, daß sie nicht sowohl eine Verschiebung parallel mit sich, als eine merkliche Gestaltänderung erlitten hat. Namentlich ist der westliche Zweig dieser Linie gegen Westen hin, die beiden (der aufsteigende und der niedersteigende) östlichen Zweige aber sind gegen Osten hin fortgerückt, so daß dadurch eine Erweiterung des nördlich von der Curve enthaltenen Raumes oder des Gebietes der Ostabweichung entstanden ist *).

In Bezug auf den, in neuerer Zeit angeregten, Fragepunkt: ob Asien von zwei gesonderten Linien ohne Abweichung durchzogen sei, wird die bestimmteste Entscheidung dafür erhalten, daß es nur jene eine giebt, die aber mehrere Biegungen macht, welche Erman als ab- und aufsteigende Zweige bezeichnet **).

Diese Linie ohne Abweichung zieht sich von dem Dschager Meere, wo Erman ihren niedersteigenden Zweig zum letzten Male durchschnitten, durch den großen Ocean, wahrscheinlich noch mit bedeutenden Abbiegungen von der Meridianrichtung, und geht dann durch den Continent von Neuhoolland und endlich zum Südpol der Erde.

Von dieser Linie ohne Abweichung ist zu unterscheiden eine zweite Linie dieser Art, die, vom Südpol der Erde ausgehend, den südlichen Atlantischen Ocean durchschneidet, in den Amerikanischen Continent ein wenig nördlich von Rio Janeiro eintritt und in ihrer nördlichen Verlängerung von einander trennt: die isogonischen Linien östlicher Abweichung, welche sich in Nordamerika finden, von denen westlicher Abweichung, die den nördlichen Ocean einnehmen.

*) In Hansteen's Charte ist neben der Linie ohne Abweichung für das Jahr 1820 auch der westliche Zweig dieser Linie für das Jahr 1769 verzeichnet, wo man die Statt gefundene westliche Bewegung dieses Zweiges sogleich überseht.

**) Die Linie ohne Abweichung, wie sie auf der Hansteen'schen Charte verzeichnet ist, stimmt mit der von Erman gegebenen in Gestalt und Lage im Allgemeinen überein; bei Hansteen fehlt aber das Stück von ungefähr 50° bis 100° D. B. (von Greenwich), aus Mangel an Beobachtungen, so daß der Zusammenhang des westlichen Zweiges mit den auf- und absteigenden östlichen nicht gestellt. Hansteen vermuthet daher auch noch, daß das, was bei Erman auf- und absteigender östlicher Zweig ist, wohl eine in sich selbst zurücklaufende krumme Linie bilden möge. — Beiläufig wollen wir bemerken, daß nach Hansteen (Pogg. XXI. 401) zwischen den Abweichungssystemen der südlichen und nördlichen Halbkugel eine große Symmetrie Statt findet, wie derselbe näher in Bezug zu seinen Abweichungskarten erörtert.

Es giebt daher auf der Erde wirklich nur zwei zusammenhängende selbstständige Linien ohne Abweichung, über deren gegenseitige Gestaltungsverhältnisse Erman noch mehrere Betrachtungen beifügt, hinsichtlich deren wir jedoch auf die Originalabhandlung verweisen, da sie ohne Beifügung der Charten nicht gut verständlich sein möchten.

Die isogonischen Linien anlangend, so lassen sie sich ihrer Gestalt und ihrem Verlaufe nach in folgende eintheilen:

1) Solche, die in sich zurückkehren, ohne einen der beiden astronomischen Erbpole zu erreichen. Man könnte sie vorzugsweise geschlossene isogonische Linien nennen. Ein schönes Beispiel dieser Art giebt das System östlicher Abweichung in der Südsee, wo die Linie von 5° östlicher Abweichung (Fig. 100.) einen Raum einschließt, in welchem die Abweichung sich gegen den Mittelpunkt zu vermindert, doch, wie es scheint, nicht unter 2° . Bei dem Systeme westlicher Abweichung, so weit es Erman's Beobachtungen kennen lehren, ist ein ähnliches Verhältniß in China auf dem Meridiane von Satsuk vorhanden; doch können die daselbst sich zeigenden geschlossenen Curven nur einen weit geringern Raum einschließen, als die in der Südsee vorhandenen. Außerdem findet noch der unterscheidende Umstand Statt, daß, während bei dem geschlossenen Systeme der Südsee die Abweichung vom Mittelpunkte gegen die Peripherie hin zunimmt, bei dem Asiatischen Systeme sie sich in demselben Sinne hin abnehmend zeigen muß.

2) Isogonische Linien, die nur durch einen der astronomischen Erbpole gehen. Man kann sie zurückkehrende nennen, insofern sie zu der Polargegend, von der sie ausgehen, zurückkehren, ohne die entgegengesetzte zu erreichen; sie durchschneiden alle zwischen 90° und einem für eine jede besonders anzugebenden Minimum enthaltenen Parallelkreise der Erde.

In jeder geographischen Halbkugel der Erde giebt es bekanntlich zwei Arten von Puncten, durch welche mindestens eine isogonische Linie für jeden jeden Grad gehen muß. Namentlich ist der astronomische Pol der Halbkugel einer dieser Puncte; die Puncte der zweiten Art sind diejenigen, in welchen der Winkel der magnetischen Kraft mit dem Horizonte $= 90^{\circ}$ ist. Die Zahl der letzteren ist uns noch unbekannt, wir können daher bis jetzt nur sagen, daß je zwei zurückkehrende isogonische Linien mindestens zwei Durchschnittspuncte haben müssen. Außerdem sieht man auch aus dieser Betrachtung, daß, wenn für irgend einen Grad der Abweichung geschlossene isogonische Curven vorkommen, für denselben Grad außerdem noch eine zurückkehrende oder eine von der unten zu erwähnenden Art vorhanden sein müsse. Solche zurückkehrende isogonische Linien sind in der nördlichen Halbkugel alle die von 20° und mehr Westabweichung, und die von mehr als 15° Ostabweichung, mit Bestimmtheit; es kann aber auch sein, daß für jede Art der Abweichung noch einige zu niedrigeren Graden gehörige Linien dieser Klasse gehören.

5) Isogonische Linien, die von einem astronomischen Pole zum andern gehen. Jede von ihnen durchschneidet alle Parallellkreise der Erde mindestens ein Mal, und unter sich haben je zwei derselben mindestens vier Durchschnittpuncte. Man könnte sie kreuzende isogonische Linie nennen. In dieser Klasse befinden sich:

Für die westliche Abweichung: für jeden Werth kleiner als 15° , und für die östliche Abweichung: für jeden Werth kleiner als 10° ; mindestens eine isogonische Linie.

4) Isogonische Linien, die an einem Puncte in zwei Zweige sich spalten, von denen der eine zurückkehrend, der andere kreuzend ist. Eine Linie, die zu einem von 10° östlicher Abweichung wenig verschiedenen Werthe gehört und im großen Ocean sich befindet, ist in diesem Falle. Da Linien dieser Art immer zu dem größten derartigen Werthe gehören müssen, für welchen noch eine kreuzende isogonische Linie sich findet, so könnte man sie letzte kreuzende Linie nennen.

Der Häufigkeit ihres Vorhandenseins nach stehen die isogonischen Linien in folgender Ordnung:

- 1) die zurückkehrenden,
- 2) die kreuzenden,
- 3) die geschlossenen,
- 4) die letzten kreuzenden,

von denen nie mehr als zwei für östliche und zwei für westliche Abweichung vorhanden sein können.

Noch kann man bemerken, daß für einen jeden Grad der Abweichung mindestens zwei von einander unabhängige isogonische Linien von irgend einer der genannten vier Arten vorhanden sind. Finden sich für einen Werth mehr als zwei Linien, so sind die überschüssig vorhandenen von der Art der geschlossenen isogonischen Linien.

Um die Frage über eine, zwischen den Richtungen der magnetischen Meridiane Statt findende, Convergenz zu prüfen, hat Erman auf der Karte (Fig. 98), welche die nördliche Halbkugel der Erde auf die Ebene des Erdaquators orthographisch projectirt vorstellt, durch Pfeile die Richtungen der magnetischen Meridiane angedeutet, welche von verschiedenen, sämmtlich an der punctirt gezeichneten Peripherie der isoklinischen Linie von 75° gelegenen, Puncten beobachtet wurden. Aus der Ansicht hievon erhellt, daß nur in der Nähe der Meridiane von 110° und 290° diese Richtungen nach der Seite des Erbpols hin stark convergiren, an den übrigen Theilen aber entweder nur langsam einander sich nähern, oder, an zwei Stellen, sogar gegen den Pol zu divergiren, so daß ihre, gegen den Äquator gerichteten Verlängerungen sich durchschneiden würden, welches auf das Vorhandensein zweier Anziehungsmittelpuncte in den betrachteten Hemisphären deutet. Denkt man sich nämlich diese zwei Anziehungspuncte durch eine Gerade AB (Fig. 101.) vereinigt, so muß es Orte geben, wie E, an welchen die Ebene des magnetischen Meridians senkrecht steht auf AB, und

denn es geht aus jener Vergleichung hervor, daß, in Bezug auf Intensität, die Wirkung des Asiatischen Mittelpunctes um weniger zurückbleibt gegen die des Amerikanischen, als in Bezug auf Neigung.

Allgemeine Betrachtungen über die isogonischen, isoklinischen und isodynamischen Linien.

Erman macht die sehr beachtungswerthe Bemerkung, daß die isogonischen und isoklinischen Linien im Grunde keine recht reale Bedeutung für die Theorie des Erdmagnetismus haben. Denn so wie die, von der Intensität und Lage der magnetischen Mittelpuncte abhängigen, und zu ihrer Bestimmung zurückführenden magnetischen Curven, welche Eisenfeilsaub um Magnetstäbe bildet, nicht durch die Verbindung der Eisenfeilspäne, welche eine gleiche Richtung im Raume haben, gebildet werden, so würden auch die Curven von wirklicher Bedeutung für die Bestimmung der magnetischen Mittelpuncte der Erde, anstatt isoklinische und isogonische zu sein, vielmehr ganz auf analoge Weise als jene magnetischen Curven folgendergestalt zu bestimmen sein:

Man müßte, von einem beliebigen Beobachtungsorte anfangend, sich dahin fortbewegen, wohin die Richtung der Magnetnadel (die gewissermaßen die Stelle eines Eisenfeilspäns vertritt) an diesem Orte neigt; dann nach Zurücklegung eines kleinen bekannten Weges auf dieser geraden Linie wiederum die Richtung der Nadel beobachten, und so, durch wiederholtes Beobachten, ein Curvenstück von der erforderlichen Länge durch seine Tangente construiren. Man würde außerdem noch an jedem Puncte dieser, durch die Natur des Problems angedeuteten, Bahn die Größe der magnetischen Kraft zu messen haben.

Leider jedoch ist diese Bestimmungsmethode unausführbar, da wir gezwungen sind, immer auf der Oberfläche des elliptischen Erdsphäroides zu bleiben, während die Verfolgung der Richtung der Magnetnadel uns im Allgemeinen in diese hinein- oder darüber hinausführen würde, da die wahren magnetischen Curven oder vielmehr Oberflächen nicht mit der Erdoberfläche coincidiren, sondern von ihr bloß an einzelnen Stellen geschnitten werden.

Eine andere nicht minder wichtige Bemerkung von Erman ist die, daß man die Verwicklung des Problems dadurch vermehrt hat, daß Neigung sowohl als Abweichung der zwei Winkelcoordinaten, durch welche man die Richtung der magnetischen Resultanten im Raume fixirt, an jedem der unendlich vielen Beobachtungsorte so gemessen werden, daß man dabei jedesmal von neuen Ebenen an zählt, da doch die Resultate der Beobachtungen einen viel bessern Anhalt für daraus durch Rechnung zu ziehende Resultate gewähren würden, wenn man ein unveränderliches Coordinatensystem zu Grunde legte oder die bisher auf die gewöhnliche Weise gegebenen Bestimmungen auf ein solches zurückführte, z. B. auf folgendes:

Man nehme die Ebene des Äquators als die an, worin die eine der Winkelcoordinaten d' , und die rechtwinklich darauf stehende Ebene des ersten geographischen Meridianes als die, worin die zweite i' liegen soll, und lasse stets die Durchschnittslinie der zwei erwähnten Ebenen einen Schenkel zu jeder der anzugebenden Winkelcoordinaten sein. Man hat dann zur Reduction der gewöhnlichen Angaben auf dies Coordinatensystem:

$$i' = \varphi + 90^\circ - i$$

$$d' = l + d$$

wenn φ Höhe }
 l Länge } der Beobachtungsorte,
 i Neigung }
 d Abweichung } nach der gewöhnlichen Bezeichnung
 bedeuten.

Dieses Coordinatensystem ist übrigens willkürlich gewählt; denn obwohl unstreitig die Wahl eines Coordinatensystemes vortheilhafter für die Einfachheit der Behandlung des Problems (die Lage und Intensität der magnetischen Mittelpunkte aufzufinden) sein würde, als ein anderes, so würde es doch schon die Lösung dieses Problems voraussetzen, das zweckmäßigste Coordinatensystem angeben zu können.

Wollte man für diese neuen Coordinaten wiederum die Orte der Erdoberfläche, an denen eine der Coordinaten denselben Werth erlangt, durch continuirliche Linien verbinden, so würde man Curven anderer Art als die jetzigen Isogonischen oder isoklinischen erhalten, die jedoch eben so wenig als diese zur Lösung des Problems geeignet sein würden, und nur besondere Betrachtungen erleichtern könnten.

Wichtiger als die Gleichungen der isogonischen und isoklinischen Linien würde es sein, die der isodynamischen zu kennen, deren jede als der Durchschnitt zwischen derjenigen krummen Oberfläche, auf welcher eine bestimmte Intensität der Gesamtwirkung des Erdmagnetismus Statt findet und der sphäroidischen Erdoberfläche ist.

Veränderung in der Lage des magnetischen Äquators und der magnetischen Pole *).

Nicht nur directe Beobachtungen der Inclination, sondern auch die Art, wie die Größe derselben an verschiedenen Orten ab- oder zunimmt, führen zu dem Schlusse, daß die Knoten oder Durchschnittspunkte des magnetischen Äquators mit dem wirklichen eine Bewegung von Osten nach Westen haben. Man kann nämlich, nach dem bekannten Verhältnisse zwischen Inclination und magnetischer Breite (gemessen auf dem als größten Kreis betrachteten magnetischen Meridian des Ortes) schließen, daß, wo vermöge Bewegung des magnetischen Äquators die magnetische Breite zunimmt, zugleich die Neigung der Magnetnadel abnimmt, und umge-

*) Pogg. X. 175; XV. 326.

98 Combinirte Betrachtung der Inclination und Declination.

lehrt. Dies in Betracht gezogen, stimmen folgende Punkte dahin zusammen, jene Bewegung anzuzeigen.

1) Auf der in den Jahren 1822 bis 1825 mit der Corvette „la Coquille“ unternommenen Reise um die Welt durchschnitt Duperrey den Äquator sechs Mal, nämlich an folgenden Punkten:

a)	27°	19'	22"	B. L. *)	und	12°	27'	11"	S. B.
b)	14	20	15	—	—	9	15	0	—
c)	83	38	0	—	—	7	45	0	—
d)	85	46	0	—	—	6	18	0	—
e)	170	37	24	D. L.	—	0	53		N. B.
f)	145	2	38	—	—	7	0		—

Nun war unter 27° $\frac{1}{2}$ und 14° $\frac{1}{2}$ B. L. nach Morlet der Jahr 1780 die Breite des magnetischen Äquators 14° 10' und 11° 36'; seit 1780 hat sich also der erste Punkt um 1° 43', der zweite um 1° 51' dem geographischen Äquator genähert. Die vier übrigen Punkte haben sich dagegen, nach den Charten von Hansken und Morlet, seitdem davon entfernt.

2) Die Inclination hat seit Cook's Reisen, also seit 59 Jahren beträchtlich auf dem Vorgebirge der guten Hoffnung und auf St. Helena zugenommen, auf der Insel Ascension dagegen abgenommen, und hat sich auf Otaheiti, wo der magnetische Äquator dem Erdaquator fast parallel läuft, nur wenig geändert, indem Bailly, Bales und Cook zwischen 1773 und 1777 die Neigung hier zu 30° fanden, Duperrey sie noch auf 30° 36' antraf.

Eine Charte, auf welcher die gegenwärtige Lage des magnetischen Äquators nach den Beobachtungen von Duperrey, Blosserville und Sabine verzeichnet ist, entworfen von Duperrey, findet sich in Voyg. Ann. XXI. Taf. II., nebst Erörterungen ebend. S. 151 und Beobachtungen in Tabellen nach S. 176.

Combinirte Betrachtung der Inclination und Declination**).

Begrand hat, indem er nicht wie gewöhnlich die Inclination und Declination der Magnethabel isolirt, sondern in Verbindung betrachtete, durch Berechnung der Pariser Beobachtungen von 1671 bis 1819 gefunden, daß der Durchschnitt der konischen Fläche, welche die Magnethabel beschreibt, mit der Ebene des Erdaquators ein Stück einer Ellipse darstellt, deren große Axe sich im magnetischen Meridian befindet. Angenommen nun, daß die Nadel einen geraden Kreis beschreibt, dessen Axe sich in der Richtung des Erdmeridians befinde **), so reicht es zur Bestimmung der

*) Von Paris.

**) Bull. des sc. math. 1830. Juill. p. 26 aus den Ann. des sc. d'obs. p. 26.

***) Die Nothwendigkeit einer solchen Annahme scheint mir aus Nichts zu erhellen.

Richtung dieser Aze und zur Kenntniß der Öffnung des Regels hin, das Maximum der Declination und die entsprechende Neigung zu kennen, oder sich zweier, in ziemlich entfernten Zeitpuncten gemachten Beobachtungen zu bedienen. Nimmt man nun $22^{\circ} 30'$ als Declinationsmaximum im J. 1829 an, während die Neigung $68^{\circ} 25'$ war, so findet man, daß die Aze der von der Magnetnadel beschriebenen Regelfläche einen Winkel von $25^{\circ} 39'$ mit der Ebene des Erdaequators macht, daß die Öffnung dieses Regels $17^{\circ} 19'$ ist, und daß der Bogen, den ihre Generatrix auf dem als Basis dienenden Kreise durchlaufen hat, $69^{\circ} 9' 15''$ seit 1666, wo die Declination null war, bis 1819, wo sie ein Maximum war, beträgt.

Zusammenhang der isodynamischen Stützen mit dem Streichen von Erdschichten.

Necker *) fand bei Betrachtung von Sabine's Charte der isodynamischen Linien eine auffallende Analogie ihrer Richtung mit der Gestalt und Lage der zwei großen Continente, auf denen sie verzeichnet sind, so nämlich, daß die Richtung der isodynamischen Linien im Allgemeinen conform der Richtung der Küsten dieser Continente ist. Er glaubt, diese Übereinstimmung möchte mehr als zufällig sein, und findet sich in Folge dessen veranlaßt, auch einen Zusammenhang zwischen der Richtung der isodynamischen Linien und der Richtung, in welcher die Erdschichten an der Oberfläche streichen, zu vermuthen. Die Zusammenstellungen, welche die bisherigen Erfahrungen zu machen erlauben, scheinen ihm dieser Vermuthung zu entsprechen. So geht die magnetische Curve von 297 Secunden (auf Sabine's Charte) durch Schottland in einer Richtung von SW. nach NO., und in genau derselben Richtung fand er die Erdschichten dieses Landes streichen, als er dasselbe persönlich besuchte. Die Curve geht dann nach Christiania und Norwegen in derselben Richtung fort; und in der That ist nach Buch dies die Richtung der Erdschichten in Christiania. Im westlichen Europa haben im Allgemeinen die isodynamischen Linien und das Streichen der Erdschichten eine nordöstliche, im östlichen Europa beide eine nordwestliche Richtung.

Abgesehen jedoch davon, daß Necker selbst zugiebt, daß diese Coincidenz zwischen der Richtung der isodynamischen Linien und der Richtung, in der die Erdschichten streichen, nicht durchgängig gefunden wird (Pyrenäen, Steiermark u. a.), so möchte eine Beziehung der Art, wie sie der Verfasser voraussetzt, auch deshalb schwer anzunehmen sein, weil die Richtung, in der die Erdschichten streichen, eine unveränderliche ist, während die isodynamischen Linien ihre Lage ändern.

*) Bullet. univers. 1830. p. 106 oder Journal of the royal Institut. 1831. Nr. 2. p. 372.

14. Der zweite Versuch der magnetischen Induktion.

1. Bestimmung der induzierten EMK in der Drahlschleife
 2. Bestimmung der Induktion.

Es wird eine Drahlschleife aus einem dünnen Draht in der Form einer Drahlschleife hergestellt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

1. mit 1. Draht.
2. mit 2. Draht.
3. mit 3. Draht.
4. mit 4. Draht.
5. mit 5. Draht.
6. mit 6. Draht.
7. mit 7. Draht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

1. mit 1. Draht.
2. mit 2. Draht.
3. mit 3. Draht.
4. mit 4. Draht.
5. mit 5. Draht.
6. mit 6. Draht.
7. mit 7. Draht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

1. Bestimmung der Induktion.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht. Die Induktion B wird durch einen Strom I in einer Drahlschleife erzeugt, die in einem Magnetfeld der magnetischen Induktion B steht.

Über tägliche Variation der magnetischen Abweichung. 101

Es geht sie wieder ununterbrochen, aber mit geringerer Geschwindigkeit, fort bis 6 Uhr 30 Min. (der Zeit des zweiten Durchganges durch den internen Meridian), wo eine kurze Unterbrechung eintritt, von welcher sich den Beobachtungen der meisten Tage eine Andeutung findet. Die Bewegung nach Ost beginnt aber sogleich wieder und dauert mit einigen rückgängigen Schwankungen bis 1 Uhr 15 Minuten Morgens (bis $-2^{\circ} 50'$ Minimum), so daß also das zweite absolute Minimum fast genau 12 Stunden nach dem ersten Maximum eintritt. Dieser zweite östliche Stand merkwürdig gleich dem ersten des Morgens *); auf diese erste große Declination folgt nun eine kleinere nur ungefähr sieben Stunden dauernde, welche nicht an so bestimmte Stunden als die frühere fixirt, mehr als ein bestimmtes Schwanken erscheint, und so unbedeutend ist, daß die Nadel als ruhig anzusehen ist **).

Bemerkenswerth ist, daß die Nadel, wenn sie bei dem Gange der täglichen Variation ihre westliche Bewegung in eine östliche und umgekehrt umkehrt, nicht eine Zeit lang unverändert stehen bleibt, sondern gleichmäßig umwendet.

Diese Resultate gelten als mittlere für das ganze Jahr. Berücksichtigt man aber die Unterschiede nach den einzelnen Jahreszeiten, so ergibt sich Folgendes:

- 1) die Zeit des Maximums am Tage scheint unabhängig von den Jahreszeiten zu sein, zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags;
- 2) die Zeit des Minimums am Tage aber scheint in den Sommermonaten früher als im Winter, jedenfalls zwischen 6 und 9 Uhr Morgens (im Mittel um 8 Uhr 15 Minuten) einzutreten;
- 3) Die Zeit des ersten Durchganges durch den mittlern Meridian scheint unabhängig von den Jahreszeiten um 10 Uhr 30 Minuten einzutreten, die Zeit des zweiten Durchganges aber ist zwischen 4 und 8 Uhr veränderlich gefunden worden, ohne daß sich ein bestimmter Bezug zu den Jahreszeiten ergeben hätte.
- 4) die Größe der Veränderungen ist bedeutender im Sommer als im

*) von einander absteigenden Beobachtungen angenommen. Da die Nadel länger Zeit auf der Westseite als der Ostseite dieses Meridians nach Obigem verweilt, so rührt es daher, daß das Maximum und Minimum der Abweichung um gleiche Winkel vom mittlern Meridian entfernt liegen.

*) In der That würde der Unterschied von $-2^{\circ} 50'$ und $-3^{\circ} 2'$ bei einem Mittel aus mehreren Beobachtungen wahrscheinlich verschwinden.

**) Der Gang war folgender:

Minimum	—	$-2^{\circ} 50'$	um 1 Uhr 15 Minuten Morgens,
Maximum	—	$+0^{\circ} 57'$	um 3 Uhr 30 Minuten,
wissensch. Min.	—	$-1^{\circ} 49'$	um 4 Uhr 30 Minuten,
Maximum	—	$+0^{\circ} 46'$	um 6 Uhr 15 Minuten,
Minimum	—	$-3^{\circ} 2'$	um 8 Uhr 15 Minuten.

Die Bogen, Minuten und Secunden bedeuten die Abweichung vom mittlern Meridian.

100 Über tägliche Variation der magnetischen Abweichung.

Über den Gang der täglichen Variation in der Declination*) auf der nördlichen Hemisphäre.

In Folge einer Aufforderung von Humboldt sind correspondirende Beobachtungen über die tägliche Variation der magnetischen Declination von mehreren Physikern, an festgesetzten Tagen des Jahres von Stunde zu Stunde in den Jahren 1828, 1829 und 1830 angestellt worden. Die Tage waren der

20. und 21. März,

4. und 5. Mai,

21. und 22. Juni,

6. und 7. August,

23. und 24. September,

5. und 6. November,

21. und 22. December.

Die Orte waren: Berlin, Freiberg (auf dem tiefen Hartenstollen, ungefähr 35 Fathen = 70 Meter unter der Tagesoberfläche), Petersburg, Kasan, Nicolajew.

Von diesen Beobachtungen eignen sich vorzüglich die Freiburger zu einer Herleitung des Ganges der Variation, da ein Theil derselben nicht bloß von Stunde zu Stunde, sondern von Viertelstunde zu Viertelstunde geschah und daher eine genaue Bestimmung der Maxima und Minima am meisten zuläßt; wir wollen daher zunächst anführen, was sich aus diesen Beobachtungen für den Gang der täglichen Variation ergeben hat, und was größtentheils nur eine Bestätigung des in Bot. IV. S. 132 Angeführten ist, und dann das Allgemeine, was sich durch Vergleichung mit den Beobachtungen an den übrigen Orten ergeben hat, hinzufügen**).

Es sind 13 Tage in den Freiburger Beobachtungen, an welchen die Nadel ununterbrochen jede Viertelstunde beobachtet ward, nämlich

1828 13. October, 2. November, 2. December;

1829 2. Januar, 2. Februar, 2. März, 25. März, 16. und 17.

April, 8. Juli, 5. August, 1. October, 19. December.

Vereinigt man die zu denselben Tageszeiten angestellten Beobachtungen der 13 Tage je zu einem Mittel, so führen sie zu folgenden Ergebnissen.

Nachdem die Nadel von ihrem östlichsten Stande (— 3' 2" als Minimum)***) Morgens um 8 Uhr 15 Minuten (bürgerliche Zeit) sich bis 1 Uhr 45 Minuten westlich (bis zu + 6½" als Maximum) bewegt hat und dabei um 10 Uhr 30 Minuten durch den mittlern Meridian †) gegangen

*) Pogg. XIX. 357.

**) Im Original sind die Tabellen über die Originalbeobachtungen beigefügt.

***) Es ist in der Einschaltung die Abweichung des Minimums oder Maximums vom mittlern magnetischen Meridian bezeichnet.

†) Als mittlerer Meridian ist die mittlere Lage der Nadel aus den 13 Tagen

Über tägliche Variation der magnetischen Abweichung. 101

ist, geht sie wieder ununterbrochen, aber mit geringerer Geschwindigkeit, östlich bis 6 Uhr 30 Min. (der Zeit des zweiten Durchganges durch den mittlern Meridian), wo eine kurze Unterbrechung eintritt, von welcher sich in den Beobachtungen der meisten Tage eine Andeutung findet. Die Bewegung nach Ost beginnt aber sogleich wieder und dauert mit einigen rückgängigen Schwankungen bis 1 Uhr 15 Minuten Morgens (bis $-2^{\circ} 50'$ als Minimum), so daß also das zweite absolute Minimum fast genau 12 Stunden nach dem ersten Maximum eintritt. Dieser zweite östliche Stand ist merklich gleich dem ersten des Morgens *); auf diese erste große Oscillation folgt nun eine kleinere, nur ungefähr sieben Stunden dauernde, welche nicht an so bestimmte Stunden als die frühere fixirt, mehr als ein unbestimmtes Schwanken erscheint, und so unbedeutend ist, daß die Nadel fast als ruhig anzusehen ist **).

Bemerkenswerth ist, daß die Nadel, wenn sie bei dem Gange der täglichen Variation ihre westliche Bewegung in eine östliche und umgekehrt verwandelt, nicht eine Zeit lang unverändert stehen bleibt, sondern gleichsam plötzlich umwendet.

Diese Resultate gelten als mittlere für das ganze Jahr. Berücksichtigt man aber die Unterschiede nach den einzelnen Jahreszeiten, so ergibt sich Folgendes:

- 1) die Zeit des Maximums am Tage scheint unabhängig von den Jahreszeiten zu sein, zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags;
- 2) die Zeit des Minimums am Tage aber scheint in den Sommermonaten früher als im Winter, jedenfalls zwischen 6 und 9 Uhr Morgens (im Mittel um 8 Uhr 15 Minuten) einzutreten;
- 3) Die Zeit des ersten Durchganges durch den mittlern Meridian scheint unabhängig von den Jahreszeiten um 10 Uhr 30 Minuten einzutreten, die Zeit des zweiten Durchganges aber ist zwischen 4 und 8 Uhr veränderlich gefunden worden, ohne daß sich ein bestimmter Bezug zu den Jahreszeiten ergeben hätte.
- 4) die Größe der Veränderungen ist bedeutender im Sommer als im

welt von einander absteigenden Beobachtungen angenommen. Da die Nadel längere Zeit auf der Westseite als der Ostseite dieses Meridianes nach Obigem verweilt, so rührt es daher, daß das Maximum und Minimum der Abweichung nicht am gleichen Winkel vom mittlern Meridian entfernt liegen.

*) In der That würde der Unterschied von $-2^{\circ} 50'$ und $-2^{\circ} 2'$ bei einem Mittel aus mehreren Beobachtungen wahrscheinlich verschwinden.

**) Der Gang war folgender:

Minimum	—	$-2^{\circ} 50'$	um 1 Uhr 15 Minuten Morgens,
Maximum	—	$0^{\circ} 57'$	um 3 Uhr 30 Minuten,
Zwischenl. Min.	—	$-1^{\circ} 49'$	um 4 Uhr 30 Minuten,
Maximum	—	$0^{\circ} 46'$	um 6 Uhr 15 Minuten,
Minimum	—	$-2^{\circ} 2'$	um 8 Uhr 15 Minuten.

Die Bogen, Minuten und Secunden bedeuten die Abweichung vom mittlern Meridian.

102 Über tägliche Variation der magnetischen Abweichung.

Winter; denn der Unterschied zwischen dem Minimum des Morgens und Maximum des Nachmittags war

October bis November = $10^{\circ} 10'$,5,

December bis Februar = $6^{\circ} 45'$,4,

März bis Mai = $13^{\circ} 15'$,2,

Juni bis August = $14^{\circ} 57'$,2.

Vergleichen wir nun auch die übrigen Beobachtungen mit den Freibergern und unter einander, so ergibt sich ein bemerkenswerther Parallelismus im Gange (nicht jedoch der Größe) der täglichen Variation, indem Maxima und Minima und Durchgang durch den mittlern Meridian meistlich zu gleichen Tageszeiten an den verschiedenen Orten fallen *); dagegen finden öfters die auffallendsten Unterschiede hinsichtlich der Größe der Oscillationen zwischen den verschiedenen Orten Statt (Vogg. XV. 335; XIX. 380). So war z. B. am 5. Aug. die Größe der Oscillation vier Mal kleiner in Berlin als in Kasan, am 21. März hingegen fast 4 Mal größer in Berlin als in Kasan, und ähnliche Nichtübereinstimmungen zeigten sich auch für die anderen Orte an mehreren anderen Tagen, während jedoch auch wieder gewisse Tage eine nahe Übereinstimmung darboten. übrigens scheint die Größe der Oscillationen mit der geographischen Breite zuzunehmen, und da, wo die störenden Ursachen an der Erdoberfläche wegfallen (in Freiberg), ebenfalls größer zu sein.

Mit den vorigen Resultaten können diejenigen in Verbindung gesetzt werden, welche Dove und Kieß **) mittelst täglicher dreimonatlicher Beobachtungen im September, October und November 1830 (in Berlin) gleichzeitig für die Intensität (der horizontalen Nadel) und Declination erhalten haben. Die Beobachtungen wurden zur Zeit der Extreme, nämlich von Kieß für die Intensität Morgens und Abends 9 Uhr, für die Abweichung von Dove Morgens 8 Uhr und Nachmittags 1 Uhr angestellt, und außerdem beobachtete Kieß, um eine gleichzeitige Beobachtung zu erhalten, noch ebenfalls Morgens um 8 Uhr ***).

Es ergab sich, daß vom September zum November die Größe der täglichen Veränderung (Unterschied der Beobachtung um 8 Uhr und 1 Uhr) der Declination zuerst langsam, dann sehr rasch abnahm, denn sie betrug im Mittel: im September $9^{\circ} 56''$, im October $9^{\circ} 16''$, im November $5^{\circ} 11''$, und daß die westliche Abweichung im October größer als im September und November war †).

*) Sehr erläuternd ist in diesem Bezuge die Taf. II. Fig. 2. in Vogg. XII. wo der correspondirende Gang der Nadeln für zwei Tage graphisch verzeichnet ist.

**) Vogg. IX. 545.

***) Die Tabelle der Originalbeobachtungen ist in Vogg. IX. 547 beigelegt.

†) Durch Vergleichung des Mittels der absoluten Extrems aus stündlichen Beobachtungen, welche an vier Tagen im September und November angestellt wurden mit dem Mittel aus den Beobachtungen um 8 Uhr und 1 Uhr an den

Über tägliche Variation der Declination unter den Tropen. 103

Es zeigte sich ferner bei Vergleichung der einzelnen successiven Beobachtungen, daß, wenn unregelmäßige Änderungen in der Größe der täglichen Oscillationen eintreten, wie aus unbekannten Ursachen öfters der Fall, diese in der Regel nicht auf einen Tag beschränkt sind, sondern eine längere Zeit dauern, und zwar so, daß einer auffallend kleinern Oscillation in der Regel eine auffallend große vorangeht und ihr folgt *).

Endlich ergab sich, daß mit unregelmäßigen Änderungen der Declination ein so häufiges Zusammentreffen von Änderung der horizontalen Intensität Statt fand, daß ein Zusammenhang derselben unverkennbar war, wozu mehrere Belege in der Originalabhandlung besonders herausgehoben sind.

Über die tägliche Variation der Declination unter den Tropen.

Aus Beobachtungen von Bouffingault **) unter den Tropen hat sich ergeben:

- 1) daß sich nördlich vom magnetischen Äquator das Nordende der Nadel, und zwar sowohl bei nördlicher als südlicher Declination der Sonne, von Osten gegen Westen bewegt, während dasselbe Ende, südlich vom magnetischen Äquator, von Westen gegen Osten geht;
- 2) daß (eben so wie beim Barometer) die tägliche magnetische Periode unter den Tropen eine sehr große Regelmäßigkeit zeigt.

In der That fand Humboldt bei Berechnung von 500, zu Mar-mata in der Republik Columbien angestellten, Beobachtungen (meist sechs bis sieben täglich), die ihm Bouffingault eingeschickt, für jede der drei Decaden des Augusts respectiv 4' 10", 4' 47" und 4' 37" als Variation von 7 Uhr Morgens bis Mittag, und für die drei Decaden des Septembers 3' 35", 3' 40" und 2' 23", also im mittlern Werthe von fünf Decaden nur eine Abweichung von 1 Minute ***).

selben Tagen überzeugte sich Dove, daß beide Mittel nahe genug übereinkommen, um die Annahme auszuschließen, daß im Laufe jener drei Monate eine Veränderung der Extreme der täglichen Perioden Statt gefunden.

*) Dieser bemerkenswerthe Umstand wird durch folgende Beobachtungen belegt, worin die Größe der täglichen Veränderung für die successiven Tage, in welchen die Änderung Statt hat, angegeben ist.

Sept. 12.—14.] 15' 17". 5' 43". 13' 1"

— 14.—20.] 13' 1". 4' 45". 5' 43". 3' 11". 1' 35". 7' 32". 15' 21".

— 20.—23.] 15' 21". 8' 56". 4' 54". 15' 35".

Oct. 8.—13.] 10' 56". 8' 36". 4' 13". 3' 37". 9' 18". 14' 41".

Oct. 20.—Nov. 4.] 7' 36". 6' 6". 3' 23". 6' 1". 6' 1". 13' 16".

Nov. 10.—15.] 15' 21". 9' 25". — 0' 54". 3' 25". 3' 52". 6' 19".

**) Pogg. XV. 331.

***) Der absolute Werth der östlichen Declination zu Mar-mata, welcher von Morgens bis Mittag abnimmt, ist 6° 33'.

Ueber das, was die Dichtung ist, und was sie nicht ist, sagt

Goethe: „Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur nachzuahmen sucht.“

Obgleich die Dichtung eine Kunst ist, so ist sie doch keine Kunst, die die Natur nachzuahmen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Die Dichtung ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht. Sie ist eine Kunst, die die Natur zu verstehen sucht.

Erreicht, wo die Veränderung ungefähr ihr Maximum von 5' jährlich erreicht. Weiter ostwärts nimmt die jährliche Veränderung wieder ab, bis zur Insel Unalaska, wo sie verschwindet. An der Nordwestküste Amerika's, z. B. in Sitka, scheint die östliche Abweichung wieder etwas zu zunehmen. Nördlich vom 60. Breitengrade, z. B. in Archangel's und Nova Zemla, sind die Veränderungen größer, südwärts von 60°, z. B. in Astrachan, geringer.

2) Auf einer frühern Karte der Abweichung, die Hansteen (in seinem Atlas zum Magnetismus der Erde) für das Jahr 1700 gegeben hat, hat derselbe ein Paar Linien angegeben, in welchen sich die Abweichung vom Jahre 1700 bis 1756 nicht verändert hat. Die eine dieser Linien geht von Petersburg durch das schwarze Meer, den arabischen Meerbusen und Madagaskar bis 40° S. B., brennt sich hierauf gen Osten und geht neben der Westküste Neuholands vorbei, nordwärts nach Malacca und China. Aus den neueren Beobachtungen erhellt, daß sich der östliche Zweig dieser Linie weiter nordwärts bis zum Baikalsee verlängern läßt, und daß sich ihr westlicher Zweig, der um die Mitte des verfloffenen Jahrhunderts durch Petersburg nach der Ostküste Sibiriens ging, jetzt weiter gen Westen verrückt hat, so daß er jetzt ungefähr durch Paris und dicht an der Westküste Norwegens vorbeigeht. Auf dem ganzen Stücke der Erboberfläche, welche von dieser Linie eingeschlossen ist, also zwischen der Ostsee und dem Baikalsee oder im größten Theil Asiens und des indischen Meeres, hat sich der Nordpol der Magnetnadel in mehr als 100 Jahren gen Osten bewegt; außerhalb dieser Linie hingegen gen Westen.

3) Von Acapulco nach Carthagena bewegt sich der Nordpol der Nadel gen Osten. Vom Meridiane 300° östlich von Ferro, wo die Nadel gegenwärtig stillstehend ist, bis zur Ostküste Afrika's bewegt sie sich dagegen gen Westen. Das Maximum dieser westlichen Bewegung scheint bei St. Helena und Ascension einzutreffen, wo es ungefähr 9' des Jahres ist. Beim Einlauf in den arabischen Meerbusen verschwindet wieder diese westliche Bewegung und geht in eine östliche über, deren Maximum nahe am Cap Comorin und Ceylon eintritt, wo sie = 5' jährlich ist. Diese verschwindet wieder bei Macao und Manilla. Im ganzen Südmeere ist die Bewegung der Nadel östlich, aber sehr gering, und scheint nirgends eine Minute zu übersteigen; sie verschwindet wieder in Amerika beim Meridiane 300° östlich Ferro.

4) An der Westküste Südamerika's bewegt sich der Nordpol der Magnetnadel etwas gen Osten; allein diese östliche Bewegung ist jetzt weit geringer als vor hundert Jahren. Am Feuerlande verschwindet sie ganz und geht weiter ostwärts in eine westliche Bewegung über, welche am Vorgebirge der guten Hoffnung bis 8 oder 9 Minuten steigt. Diese verschwindet wieder bei Madagascar und der Insel Bourbon, etwa beim

106 Veränderung der Inclination in längeren Perioden.

Meridiane 70° östlich Ferro, und wird weiter ostwärts östlich, wahrscheinlich durch das ganze stille Meer bis Südamerika.

5) Gleichwie in der nördlichen Halbkugel das große westliche Abweichungssystem in der Hudsonsbay in 200 Jahren gen Osten vorgebracht ist, und das kleine östliche System, welches in Europa lag, und das kleine westliche System bei Novaja Zemla vor sich gegen die östlichen Gränzen Asiens hincingetrieben hat, so ist auch in der südlichen Halbkugel das große westliche System, welches vor 200 Jahren auf das indische Meer eingeschränkt war, gen Westen vorgebracht und hat das östliche System, welches im südlichen atlantischen Ocean lag, vor sich dem Feuerlande zugetrieben. Die Bewegung beider Einensysteme ist also östlich in der nördlichen Halbkugel, westlich in der südlichen.

Von dieser entgegengesetzten Bewegung beider Halbkugeln giebt Hansteen folgende Ursache an: Um das Jahr 1600 lag der Nordpol der schwachen Magnetare nahe bei Novaja Zemla, und ihr Südpol etwas westlich vom Feuerlande. Diese Aze hatte damals eine starke Excentricität gegen die Oberfläche des atlantischen Meeres, wodurch ihre Wirkung im atlantischen Meere vorherrschend war, wo sie ein zusammenhängendes östliches Abweichungssystem hervorbrachte. In den folgenden 200 Jahren bewegte sich ihr Nordpol gen Osten, ihr Südpol gen Westen, wodurch ihre Excentricität vermindert wurde, bis endlich ihr Mittelpunkt jetzt an die entgegengesetzte Seite des Mittelpunctes der Erde gekommen ist. Die stärkere Magnetare ist dadurch die vorherrschende auf unserer Seite der Erde geworden, wo sie ein zusammenhängendes westliches Abweichungssystem hervorgebracht hat.

über die tägliche Veränderung der Inclination.

Xrugo *) hat sich durch sorgfältige Beobachtungen, und zwar nicht bloß durch Mittelzahlen aus mehreren Versuchen, sondern durch directe Ablesung, überzeugt, daß die Neigung um 9 Uhr Morgens größer als um 6 Uhr Abends ist. Diese Variation der Neigung ist im Sommer größer als im Winter.

über die Veränderung der Inclination in längeren Perioden.

Hansteen **) und Humboldt ***) haben Zusammenstellungen der bekannten alten und neuen Neigungsbeobachtungen gegeben, um daraus den Gang der Neigungsveränderungen in längeren Perioden zu beurtheilen. Die Zusammenstellung von Hansteen ist die umfassendere †). Ich beschränke

*) Pogg. XV. 228.

**) Ebenb. XXI. 412.

***) Ebenb. XV. 219.

†) Derselben ist auch eine Charta beigegeben, welche die Veränderungen

nach darauf, die allgemeinen Resultate anzuführen, die aus diesen Aufam-
menstellungen hervorgehen, mit Hinzufügung der Neigungsveränderungen
für einige der wichtigsten Orte, indem ich hinsichtlich der übrigen auf das
Original verweise:

1) Die Neigung ist in Europa in fortwährendem Abnehmen begriffen.

2) Die Größe dieser Abnahme in Europa mindert sich immer mehr.
So betrug im mittlern Theile Europa's (Paris, London, Berlin, Genf)
im Jahre 1780 die jährliche Abnahme der Neigung zwischen 5' und 6' und
ist kufenweise bis zum Jahre 1830 auf etwa 3' herabgesunken; so daß die
Neigung sich jetzt hier einem Minimum zu nähern scheint, welches wahr-
scheinlich vor dem Schlusse des jetzigen Jahrhunderts eintreten wird.

3) Die Größe dieser Abnahme wird für Christiania, London, Paris,
Berlin, Göttingen, Mailand, Florenz, Turin (sämmtlich zwischen 45°
und 60° N. B.) nahe gleich gefunden, nämlich:

Christiania	1825	= - 8',56
London	1820	= - 8',56
Paris	1820	= - 8',47
Berlin	1820	= - 8',02
Göttingen *)	1820	= - 8',06
Mailand	1817,5	= - 8',87
Florenz	1815,5	= - 8',30
Turin	1815,5	= - 8',50

4) Längs der Küsten Südamerika's nimmt die südliche Neigung be-
deutend ab. In einiger Entfernung von den Küsten Südamerika's, unge-
fähr im Meridiane 10° westlich Ferro, trifft man einen Punkt, wo die
Neigung unverändert ist. Bei den Inseln Ascension, St. Helena und
dem Bergsteige der guten Hoffnung nimmt die südliche Neigung wieder
bedeutend zu. Dieses Maximum wird weiter gen Osten geringer und
verschwindet endlich bei den Gando-Inseln. Zwischen Ambria und dem
Meridiane 145° westlich Ferro nimmt die südliche Neigung ab, bei Dia-
del weiter zu; in der übrigen Ausdehnung des Südmeeres, gerade bis
an die Küsten Südamerika's, ist sie abnehmend. Endlich ist es ziemlich
erkennbar, daß die nördliche Neigung wenig zunehmend bei Saint-John
und weiter abnehmend bei Knapfsholm ist.

5) Nach Laplace's Ansicht (Pogg. XII 427) hat jede Magnet-
kraft nur ein Punkt, südlich welchen sie eine schlangenförmige Bewegung
ausführt. Es laß sich die südliche Richtung längs des Meridians durch
den Punkt aus der Erde bewegen.

Nach der Art ist sich dies auf der Magnetkraft überlegen, welche
Laplace seiner Untersuchung beigegeben hat. Man sieht hier, daß die
Magnetkraft der Erde mit der Zeit abnimmt, welche sich im Laufe der Zeit
immer mehr zu vermindern beginnt.

In Bezug auf Variationen vgl. die vorhergehenden Pogg. XII und
XV 22.

108 Beschreibung der Inclination in längeren Perioden.

das atlantische Meer, etwa bei dem Meridiane 10° westlich von Ferro, eine Linie von Norden nach Süden geht, in welcher alle Neigungslinien desselben Namens für 1780 und 1827 einander schneiden *), und wo also die Neigung zwischen diesen zwei Jahren unverändert geblieben ist. An der östlichen Seite dieser Linie haben sich die Linien gen Norden, an der westlichen gen Süden bewegt, d. i. auf der östlichen Seite hat die nördliche Neigung abgenommen, die südliche zugenommen, auf der westlichen umgekehrt die nördliche zugenommen, die südliche abgenommen. Zwei andere Linien, in welchen die gleichnamigen Neigungslinien einander schneiden, findet man im Südmeere in der Länge 120° und 145° westlich; und eine oder zwei ähnliche Linien in dem indischen Meere zwischen den Meridianen 80 und 120° . Zwischen den Meridianen 10° westlich und 120° westlich, also im westlichen Theile des atlantischen Meeres, ganz Amerika und dem östlichen Theile des Südmeeres, haben sich alle Neigungslinien gen Süden, zwischen den Meridianen 10° westlich und 120° östlich, also im östlichen Theile des atlantischen Meeres, ganz Europa, Afrika und dem größten Theile des indischen Meeres, gen Norden bewegt. Zwischen den Meridianen 120° und 145° westlich haben sich die Linien gen Norden, und zwischen den Meridianen 145° westlich und 120° östlich gen Süden bewegt. Man erkennt auch aus Hansen's Charte, daß alle Neigungslinien ihre Form beträchtlich verändert haben.

Die größte Bewegung zwischen den vier fixen Punkten gen Süden herrscht in Amerika im Meridiane 40° westlich und die größte gen Norden im Meridiane 40° östlich in Afrika und Europa. Bemerkenswerth ist ferner der Meridian 70° westlich, wo die Linien nahe am Äquator fast keine Bewegung zu haben scheinen, während sie sich in der südlichen Halbkugel etwas gegen Süden, und in der nördlichen vielleicht etwas gegen Norden bewegt haben.

6) Hansen setzt diese geschlungelte Bewegung der Neigungslinien auf folgende Weise mit der von ihm angenommenen Bewegung der vier Magnetpole der Erde in Beziehung.

Jede Neigungslinie hat, zumal in der Nähe der Pole, eine doppelte Biegung gegen den Äquator, auf der nördlichen Halbkugel in Nordamerika und im Meridiane von Irkutsk, auf der südlichen im indischen Meere und im Südmeere etwas westlich von Südamerika. Da sich nun die nördlichen Magnetpole nach Osten, die südlichen nach Westen bewegen, so müssen diese vier Biegungen auch ihre Lage in denselben Richtungen verändern. Denkt man sich eine Ebene senkrecht auf eine der Magnetaxen durch ihren Indifferenzpunkt, so könnte diese der Äquator dieser Axe benannt wer-

*) d. h. jede beliebige Neigungslinie von 1780 hat einen Punkt, wo sie die gleichnamige Neigungslinie von 1827 schneidet. Der Ort aller dieser Durchschnittspunkte ist die nord-südlich gehende Linie, wovon oben die Rede ist.

Neigungsbeobachtungen für Berlin *).

Beobachter.	Jahr.	Neigung		Unterschied.
		beobachtet.	berechnet.	
Euler	1769	72° 45' *	72° 45' ,9	- 0 ,9
Humboldt	1806	69 53 *	69 46 ,7	+ 6 ,3
Erman	1812	69 16 *	69 24 ,8	- 8 ,8
Erman	1824	68 48 *	68 47 ,1	+ 0 ,9
Humboldt u. Erman	1825	68 42 ,4 *	68 41 ,5	+ 0 ,9

Neigungsbeobachtungen für Genf.

Beobachter.	Jahre.	Neigung.
Schuchburg	1775	69° 27' *
Xrargo	1825	65 41 ,5 *
De la Rive und Gauthier	1830	65 31 ,2 *

Neigungsbeobachtungen für Christiania.

Beobachter.	Jahre.	Neigung.
Hansteen	1820	72° 42' ,6
	1822	72 33 ,5
	1825	72 26 ,5
	1828	72 16 ,6
	1830	72 7 ,0

*) Meyers Beobachtungen über Berlin zugleich mit seinen früheren giebt Erman in Pogg. XXIII. 486. Es sind folgende:

1812 69° 15' 30"

1824 November 68 50 45

1826 November 68 45 45

1828 April 68 37 50

1831 Mai 68 14 3

Ich weiß nicht, wie es kommt, daß die Werthe oben etwas anders angegeben sind.

112 Veränderung der Inclination in längeren Perioden.

Neigungsbeobachtungen für das Vorgebirge der guten Hoffnung.

Beobachter.	Jahre.	Neigung.
La Caille	1751	43° 0'
Bayley	1772	45 37
Bayley	1775	45 19
Abercrombie	1775	46 26
Bayley	1776	46 30,8
Bertrand	1792	47 25

Neigungsbeobachtungen für die Insel St. Helena.

Beobachter.	Jahre.	Neigung.
La Caille	1754	9° 0'
Gleberg	1771	13 0
Goot	1775	11 25
Duperrey	1824	14 56,6

Hansteen hat für mehrere Orte durch Berechnung der genauesten unter den vorhandenen Beobachtungen empirische Formeln zur Bestimmung des Ganges der jährlichen Veränderung in der Neigung abgeleitet, die wir hier mittheilen wollen; wiewohl die Zuverlässigkeit solcher Formeln bei den größtentheils sehr mangelhaften Elementen, die zu ihrer Ableitung dienen, wohl nicht sehr groß sein kann.

Es sei darin i die Neigung, v die jährliche Veränderung der Neigung, t die Anzahl Jahre, die zu einer gewissen, bei jedem Orte zu Grunde gelegten, Anfangs-Jahreszahl hinzugefügt werden müssen, um die Zahl des Jahres, für welche die Neigung oder ihre Veränderung gesucht ward, zu erhalten *):

*) So ist z. B. bei Paris die Jahreszahl 1793 zu Grunde gelegt, sucht man mithin die Neigung für das Jahr 1810, so ist $t = 17$.

Name des Ortes.	Jahr.	I.	
Paris	1798 + t	+ 69°53',2 - 5',2704 t	+ 0',041816 t ²
London *)	1775 + t	+ 72 45 ,9 - 5 ,8599 t	+ 0 ,027832 t ²
Berlin	1769 + t	+ 72 31 - 4 ,3076 t	+ 0 ,02191 t ²
Genf	1775 + t	+ 69 27 - 5 ,1981 t	+ 0 ,01654 t ²
Rio Janeiro	1751 + t	- 20 0 - 2 ,877 t	+ 0 ,09788 t ²
Zakahuano	1710 + t	- 55 30 - 5 ,551 t	+ 0 ,09573 t ²
Kienfion	1754 + t	+ 11 12 - 5 ,727 t	- 0 ,02880 t ²
Cap der guten Hoffnung	1751 + t	- 43 0 - 9 ,075 t	+ 0 ,06359 t ²
Manilla	1766 + t	+ 11 45 - 6 ,205 t	+ 0 ,16620 t ²
Otaheiti	1773 + t	- 29 43 - 2 ,545 t	+ 0 ,03015 t ²

Name des Ortes.	Jahr.	V.	
Paris	1798 + t	- 5',2704	+ 0',0826 t
Berlin	1769 + t	- 5 ,8599	+ 0 ,055664 t
London	1775 + t	- 4 ,3076	+ 0 ,04382 t
Genf	1775 + t	- 5 ,1981	+ 0 ,03308 t

Folgendes sind die aus diesen Interpolationsformeln gefundenen jährlichen Veränderungen der Neigung für Paris, London, Berlin und Genf.

Jahre.	Jährliche Veränderungen			
	Paris.	London.	Berlin.	Genf.
1780	- 6',75	- 4',90	- 5',26	- 5',04
1790	- 5 ,92	- 4 ,57	- 4 ,71	- 4 ,71
1800	- 5 ,11	- 4 ,21	- 4 ,15	- 4 ,38
1810	- 4 ,29	- 3 ,88	- 3 ,70	- 4 ,05
1820	- 3 ,47	- 3 ,55	- 3 ,00	- 3 ,72
1830	- 2 ,64	- 3 ,22	- 2 ,50	- 3 ,39

Die Zeit und Größe des eintretenden Minimums der Neigung würden nach den gegebenen Formeln sein bei

Paris 67° 5',2 im Jahre 1862

London 68° 59',8 im Jahre 1873

Berlin 67° 37',5 im Jahre 1874

Für Genf würde nach der Formel das Minimum erst um 1933 fallen.

*) Für London ist die Formel wenig zuverlässig.

Neigung in Tiefen unter der Erde.

Humboldt*) verglich im Sommer 1828 die Neigung der Magnetnadel in einer Freiburger Grube (Schurpring), wo das Gestein (Gneis) nicht auf die Magnetnadel wirkt, in einer Saigerteufe von 800 Fuß und an der Oberfläche senkrecht über dem unterirdischen Punkte. Die Neigung zeigte sich unten um 2',06 größer als oben.

über den Gang der täglichen und jährlichen Änderung der horizontalen Intensität.

Moser und Rieß**) haben in Schulzenborn, zwei Stunden von Berlin, Beobachtungen über die Schwingungen der horizontalen Nadel vom 4. Mai bis zum 24. Juni angestellt, wovon die vom 4. und 5. Mai stündlich sind. Sie sind auf eine zuverlässige Weise wegen der Temperatur corrigirt. Es geht daraus für die tägliche Änderung der horizontalen Seitenkraft der Intensität (die allerdings eben sowohl von Veränderung der Neigung als der absoluten Intensität abhängen kann) Folgendes hervor:

Die Intensität hat einen regelmäßigen Gang. Sie fällt vom Maximum, welches um 7 Uhr 55 Minuten Abends eintritt, schnell ab, kommt dem Minimum schon um 3 Uhr Morgens sehr nahe, erhält sich auf diesem Stande bis um 9 Uhr Morgens, wo sie das wirkliche Minimum erreicht, und steigt dann allmählig zum Maximum auf. Im Juni war nicht nur die Intensität, sondern auch die Größe ihrer täglichen Variation schwächer als im Mai. Hinsichtlich der Tabellen verweisen wir auf die Originalabhandlung.

Reich***) hat mittelst eines Gambey'schen Instrumentes jeden Monat einmal früh und Abends die Schwingungen der horizontalen Magnetnadel in Freiberg 35 Fächer = 70 Meter tief unter der Erde beobachtet. Diese Beobachtungen haben den Vorzug, daß sie bei gleichbleibender Temperatur angestellt sind, denn die Variationen der täglichen Temperatur erstrecken sich nicht auf jene Tiefe. Es geht aus diesen Beobachtungen hervor, daß die horizontale Seitenkraft der magnetischen Intensität ihr Minimum im Juni, ihr Maximum im Januar oder Februar hat, und daß sie im Allgemeinen Abends größer als Morgens ist.

Hinsichtlich der Tabelle der Versuche verweisen wir ebenfalls auf die Originalabhandlung.

über Veränderung der Intensität in längeren Perioden.

Nach Hansen's Erörterungen†) ist gegenwärtig die Intensität in ganz Europa und dem nördlichen Asien bis zum Meridian von Irkutsk im

*) Pogg. XV. 324.

**) Ebend. XIX. 113.

***) Ebend. XVIII. 57.

†) Ebend. XXI. 120.

Abnehmen begriffen, zwischen Irkutsk und Kamtschatka im Zunehmen, an der Westküste Nordamerika's im Abnehmen, in Grönland und Island im Zunehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie bald wieder in Europa zuzunehmen anfangen. In der südlichen Halbkugel nimmt sie bei Van Diemens Land ab, auf Isle de France zu, auf dem Feuerlande ab und auf Otaheiti zu.

Über die Abnahme der Intensität mit der Höhe über der Erdoberfläche, von Kupffer *).

Bei einer Besteigung des Elbrus, des höchsten Gipfels des Caucasus, welcher nach barometrischen Messungen ungefähr 15400 Par. Fuß über der Meeresfläche liegt, fand Kupffer, durch genaue Versuche mittelst einer Gambey'schen, zur Beobachtung der täglichen Variationen bestimmten, Nadel, daß die Intensität des Erdmagnetismus mit der Höhe abnimmt, welche Abnahme 0,01 Secunden auf 24 Secunden Schwingungszeit für jede 1000 Fuß Erhebung entspricht. Allerdings scheint die Beobachtung Gay-Lussac's, welcher in 7000 Meter (etwas über 21000 Fuß) Höhe dieselbe Schwingungszahl der Nadel beobachtete, wie auf der Erdoberfläche, hiermit nicht in Übereinstimmung; allein Kupffer findet gerade in dieser unveränderten Schwingungsbauer eine Bestätigung seiner Erfahrung, indem die 40° C. betragende Erwärmung, welche bei Gay-Lussac's Luftfahrt mit der Erhebung Statt gefunden, nothwendig eine Verstärkung der Intensität der Nadel hätte hervorbringen müssen, wenn nicht dieser Einfluß durch die Abnahme der Intensität mit der Höhe compensirt worden wäre. Kupffer findet selbst durch Berechnung, daß unter dieser Annahme fast derselbe Werth der Abnahme des Erdmagnetismus mit der Höhe aus Gay-Lussac's Beobachtung der unveränderten Schwingungsbauer hervorgehe, als aus seinen directen Beobachtungen, indem er nämlich nach jenen 0,008 statt 0,01 Secunden sein würde; jedoch hat er hiebei keine ganz richtigen Data zu Grunde gelegt, da er sich bloß auf sein Gedächtniß verlassen mußte **). Er hat indeß versprochen, nach seiner Rückkehr eine Revision dieser Rechnungen vorzunehmen und seine Beobachtungen ausführlicher mitzutheilen.

Einfluß der Nordlichter auf die Magnetnadel.

Die bisherigen Erfahrungen darüber haben Folgendes ergeben:

Die Declination so wie die Inclination und Intensität der Magnetnadel wird manchmal durch Nordlichter, sogar wenn sie (nur in entfernten Gegenden sichtbar) nicht über dem Horizont der Nadel erscheinen, auffal-

*) Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 185 oder Schweigg. Z. LVIII. 79.

**) Er nimmt nämlich die Höhe, zu welcher sich Gay-Lussac erhob, bloß zu 18000 Fuß an, und die Temperaturdifferenz zu 40° R. anstatt 40° C. — Bei Anwendung der richtigen Data würde man 0,005" anstatt 0,008" erhalten. Z.

Empfang des Hilschlichtes auf die Messernadel.

... konnte nicht, ohne das man bei jeder der Untersuchungen
... auf welche es hierbei ankommt.
... schließt allerdings aus mehreren Beobachtungen
... blieb dann vom Werblüth: entfernt wurde, wenn
... nach Ost sich erstreckenden Bogen (Kringes)
... sind, daß die Richtung der Strömung:
... in die Verlängerung der mittlern eine
... (Stromes), die von den Bogen ausgeht, fällt.
... die Wirkung auf die Magnetnadel
... Werblüth gar nicht über dem Horizont erscheint
... in den Jahren 1825 bis 1827
... folgende allgemeine Resultate über

1) Die hellen und lebendigen Strahlenschiefen des Nordlichtes verursacht die Ablenkung des Magnetnabels, wenn man es durch eine nebelige Atmo-
sphäre betrachtet, und die Strahlen und Lichtbogen die prismatischen Farben
zeigen. Ist hingegen die Atmosphäre hell, und zeigt sich das Nordlicht als
schwarze Linie, so sieht man gelbe Garbe, ohne Bewegung, so wie oft die
Mittel der Polarregionen dunkler ausfallen.

2, 2.5 Zentimeter nicht am kräftigsten (auf die Nadel), wenn es sich
um eine 22-er in der Größe der Erde erweisen zu haben scheint.

3) Wenn das Verbrechen am stärksten wirkt, vernimmt man meistens nur ein Zuckerschmelzen gegen einen Nebenb., während der übrige Theil des Mannes gegen den Täter und Werther ist.

[illegible]

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

[illegible]

sphärisches Elektrometer, dessen Divergenz auch die gesteigerte Spannung der Elektrizität anzeigt, ehe diese so groß geworden ist, daß der Funken überschlägt.

Noch aussprechender scheint mir folgende Ansicht von Erman d. J. *) zu sein, wonach man die vom Nordlichtbogen senkrecht aufschießenden Lichtstreifen (streamers, beams der Engländer) als analog dem Bogen glühender Dämpfe betrachten soll, welcher in dem bekannten Davy'schen Versuche die Stelle eines Leiters zwischen beiden Polen der Volta'schen Säule vertrat und eine unter ihn gestellte Magnetnadel abweichen machte, wobei man sich dann vorzustellen hat, daß, so wie dieser Leiter beim Versuche im Kleinen auf die darunter schwebende Nadel wirkte, der Nordlichtbogen es auf die magnetische Erdoberfläche thue.

Mehrere neuerdings beobachtete Nordlichter sind durch ihre ausgezeichnete Wirkung auf die Magnetnadel bemerkenswerth gewesen. So schreibt Hansteen **) am 29. December von Christiania: „Seit Ende Juli sind hier in Christiania etwa 35 Nordlichter beobachtet worden, alle von starken Bewegungen der Magnetnadel (Abweichungsnadel) begleitet. Die meisten Bewegungen der Nadel waren gegen Osten. Die größten Unregelmäßigkeiten trafen ein am 6. October, da die Nadel schwankte zwischen

+ 0° 22' und - 1° 22' vom mittlern Stand
 7. October + 0 1 - - 1 47 - - -
 7. December - 0 22 - + 3 8 - - -

Die äußersten Ausweichungen liegen folglich in diesem Herbst 4° 55' von einander, und wir haben wohl jetzt den Anfang einer neuen Nordlichtperiode.“

Nicht minder starke unregelmäßige Bewegungen beobachtete Hansteen ***) bei den Nordlichtern, die vom Datum jenes Schreibens bis in den April 1831 zu Christiania gesehen wurden, wobei die östlichen Bewegungen selten, dagegen die westlichen die häufigsten waren.

Es fand sich hierunter sogar die größte unregelmäßige Bewegung, die überhaupt bis jetzt durch den Einfluß des Nordlichtes beobachtet wurde; denn während bis jetzt Wilke das Maximum in dieser Hinsicht, 5° 30' betragend, beobachtet hatte, sah Hansteen bei einem Nordlichte am 19. April 1831 die Nadel in Christiania von 10 Uhr 44 Minuten bis 11 Uhr 31 Minuten einen Bogen von 6° 12' durchwandern.

Auch das berühmte Nordlicht vom 7. Januar 1831 zeichnete sich durch seine magnetische Wirkung aus.

Die vollständigsten Beobachtungen hierüber sind von Dove, Moser und Erman d. J. in Berlin angestellt worden †). Die größte Differenz

*) Pogg. XXII. 552.

**) Ebenb. XXII. 552.

***) Ebenb. XII. 536. 537.

†) Ebenb. XXII. 543. Hier findet man die Resultate der drei Beobachter tabellarisch zusammengestellt.

118 Einfluß der Nordlichter auf die Magnetnadel.

im Stande der Declinationsnadel am 7. Januar betrug hienach $2^{\circ} 55' 4''$ und trat zwischen 8 Uhr 47 Minuten (Zeit des Maximums der westlichen Declination des Nordendes) und 9 Uhr 15 Minuten (Zeit des Minimums) ein *). Die größte Differenz der Inclination vom 7. und 8. Januar betrug $38'$, indem am 7. Januar um 7 Uhr 25 Minuten Abends die Inclination um $31'$ größer, und am 8. Januar um 11 Uhr 53 Minuten Vormittags um $7'$ kleiner war, als der mittlere Werth der Neigung an den auf das Nordlicht folgenden Tagen **).

Die Intensität schwankte am 7. und 8. Januar von 1,0183 bis 0,9988. Das Maximum ward am 7. Januar um 6 Uhr 58 Minuten Abends, das Minimum am 8. Januar um 9 Uhr 23 Minuten Morgens beobachtet.

Aus genauerer Betrachtung der in der Originalabhandlung gegebenen Zahlen scheint sich zu ergeben, daß in den Augenblicken der stärksten Verrückungen des magnetischen Meridianes die Intensität der Kraft und die Neigung die stärksten Zuwächse angenommen hatten und daß die Intensität sich ihrem Normalwerthe wieder näherte, sobald der magnetische Meridian zu seiner mittlern Richtung zurückkehrte. Die Neigung scheint während der Dauer des Nordlichtes nie zu ihrem Normalwerthe völlig zurückgekehrt zu sein, und zeigte sich noch um 11 Uhr Abends um $14'$ größer als die mittlere Neigung der folgenden Tage, während die Abweichung einige Mal zu ihrem Normalwerthe zurückkehrte.

Erman's Beobachtungen ergeben ferner noch folgende Bestimmungen:

1) Den Schwächungen und Zunahmen der magnetischen Wirkungen des Nordlichtes schienen nicht immer entsprechende Schwächungen des Lichtprocesses entsprochen zu haben; denn wiewohl dies um 7 Uhr 50 Minuten allerdings sehr bestimmt der Fall war, so konnte doch bei den späteren Oscillationen der magnetischen Wirkung keine entsprechende Oscillation der Intensitäten der Lichterscheinungen wahrgenommen werden.

2) Indem der magnetische Meridian zu seiner Normalstellung zurückkehrte, überschritt er sogar einigemal dieselbe gegen Westen hin, indessen um ein viel Geringeres, als der Betrag seiner östlichen Verrückungen.

3) Nach einer scheinbaren Unterbrechung der magnetischen Wirksamkeit des Nordlichtes waren immer der anfängliche Gang des magnetischen Meridianes gegen Osten hin und die Intensitätszunahmen, welche denselben begleiteten, weit schneller, als die Rückkehr nach Westen und die Intensitätsabnahmen, welche beide auf die größten östlichen Verrückungen folgten.

*) Das Nordlicht fing in Berlin gegen 6 Uhr an sichtbar zu werden, und verlor sich gegen 11 Uhr in einen leichten Lichtnebel. — In Paris betrug nach Arag o's Beobachtungen die Differenz im Stande der Magnetnadel am 7. Januar nur $1^{\circ} 8' 47''$.

**) In Paris trat am 7. Januar die schwächste Inclination um 2 Uhr 10 Minuten Nachmittags, die stärkste um 7 Uhr 35 Minuten ein. Die gesammte Veränderung betrug 21 Minuten.

4) Die Ausweichungen des magnetischen Meridianes wurden immer kleiner, je öfter sie sich wiederholt hatten, ohne jedoch vor 4 Uhr Morgens ganz aufzuhören.

Neue specielle Beobachtungen über den Einfluß des Nordlichtes auf die Magnetnadel sind überhaupt in folgenden Abhandlungen enthalten: Kupfer in Pogg. XVI. 131 (Zusammenstellung correspondirender Beobachtungen zu Kasan und Paris); Dove in Pogg. XIX. 386, XX. 333 (Erörterung der am 5. Mai und 19. und 21. December in Petersburg, Berlin, Freiberg, Kasan, Nicolajew gemachten correspondirenden Beobachtungen); Gale in Nordamerika in Baumg. Zeitschr. VII. 248, oder Kasn. Arch. XVII. 30. — Farquharson in Philos. transact. 1830. P. I. p. 97. — Hansteen in Pogg. XXII. 534, 552 (unter andern eine Tabelle über den Gang der Declinationsnadel während eines Nordlichtes am 18. April 1831.) — Zusammenstellung der Beobachtungen beim Nordlicht am 7. Jan. 1831, namentlich zu Berlin und Paris angestellt. Pogg. XXII. 540. — Erman Pogg. XXII. 550 (Beobachtungen in Sibirien).

Einfluß von Erdbeben auf die Magnetnadel *).

Man will ohnlängst einen Einfluß von Erdbeben auf die Declination der Magnetnadel beobachtet haben. Erman d. J. indeß fand einige Minuten nach einem starken Erdbeben in Irkutsk, daß ein Gambey'sches Declinatorium, welches vor dem Erdstoß fünf Tage hindurch zur Bestimmung der täglichen Periode genau beobachtet war, keine Anomalie zeigte, die nur um 1' von der zu dieser Tageszeit gehörigen mittlern Declination abwich, so daß also hier ein Erdbeben ohne allen magnetischen Einfluß beobachtet ward.

X. Atmosphärische Lichterscheinungen.

Zur Theorie des Regenbogens, von Xinger **).

Nach der gewöhnlichen, von Biot gut aus einander gesetzten, Theorie des Regenbogens nimmt man bekanntlich an:

1) daß zwar vermöge der von der ersten Oberfläche der Tropfen in der Regenwolke zurückgeworfenen Strahlen ein weißlicher Schein über die ganze Oberfläche der Wolke entsteht, daß aber

2) von den, nach einmaliger oder zweimaliger innerer Zurückwerfung aus den Tropfen hervortretenden in Farben zerlegten Strahlen bloß diejenigen einen merkwürdigen Eindruck auf das Auge machen; welche in parallelen Rich-

*) Pogg. XVI. 153.

**) Journ. of the royal Instit. 1831. Nr. 2. p. 261.

sungen (unter dem, dem Maximum der Ablenkung entsprechenden Winkel) in das Auge gelangen, weil die anderen vermöge ihrer Divergenz zu schwach werden, um in der Entfernung des Zuschauers noch einen Eindruck auf dessen Auge zu bewirken. Von diesen parallel austretenden Strahlen aus läßt man bekanntlich die Erscheinung des Regenbogens ab.

Klinger bemerkt, und wie mir scheint mir Recht, daß diese beiden Annahmen etwas Contradictorisches enthalten; denn wenn die von den inneren Oberflächchen zurückgeworfenen Strahlen durch Divergenz unsichtbar werden können, so müßte dasselbe auch bei allen, von der ersten Oberfläche in anderen als parallelen Richtungen ins Auge gelangenden Strahlen der Fall sein, und es könnte daher kein weißlicher Schein über die ganze Bogen entstehen, da diese Abingung des Parallelismus nicht für dieselben erfüllt werden kann. Es ist aber überhaupt bei einem größern erleuchteten Raum nicht statthaft anzunehmen, was allerdings, wenn das divergirende Licht nicht von einem Punkte ausgeht, gilt — daß die Divergenz der letzten bestimmenden Strahlen vermöge zu großer Schwächung derselben den Eindruck auf das Auge verschwinden lasse — da das Zusammenwirken der von so vielen Tropfen herkommenden divergirenden Strahlen die Schwäche compensiren müßte, in welchem Bezug der Verfasser das allerdings nicht sehr zureichende Beispiel als Analogie anführt, daß man zwar 100 Erdbeben nur in einer Erdbebenpucht noch nicht fühlen könne, wohl aber es hört, wenn man sehr große Anzahl derselben zusammen frisst. Ein passendes Beispiel wäre vielmehr gewesen, daß eine große weiße Wand in sehr großer Entfernung nicht unsichtbar wird, wenn gleich die von ihr zurückgeworfenen Strahlen nach allen Seiten divergiren.

Beim Lesen dieses des Verf. ist man versucht geneigt anzunehmen, daß auch nur die in den Regenbogenstrahlen begriffenen Tropfen, sondern nur Tropfen in dem Raume der Bogen, welcher dem inneren Regenbogen umschließen mit farbigen Strahlen, die vom Auge empfunden werden, zu demselben beitragen das werden. Vermöge der Eigenschaften dieser Farben, alle Tropfen nach sich ziehen, bis zu der Größe, wo die Tropfen eine solche Größe haben, daß Farbstahlen, welche das Maximum der Ablenkung erhalten, in unser Auge zu gelangen anfangen, dann da von den Tropfen, welche außerhalb dieser Größe liegen, keine Farbstahlen dieser Art weiter nach unserer einmündigen Wahrnehmung in unser Auge gelangen können, so hier von hier an die gegenwärtige Erklärung zu weichen sieht auf. Die ersten Strahlen also hier, die durch den Parallelismus der Strahlen zu einem Zirkelstrahl gewinnende, aber nicht wesentlich von demselben abhängen, in unsern Augen, der solcherart nicht sowohl ein isolirter Farbestreifen ist, als vielmehr analog den Farbenenden eines durch ein Prisma geschiedenen Lichtes. Es werden auch die Farbigkeit der inneren Spitze des Bogen das durch vermöge Superposition der verschiedenen Farben verschwinden. Von Tropfen außerhalb des inneren Regenbogens erhält nun das Auge Licht mehr durch Strahlen, die nach einmaliger innerer Zurückwerfung

austrreten; und hierin liegt die Erklärung der Dunkelheit, die den innern Regenbogen umgiebt, und welche bisher noch nicht genügend erklärt worden war. Diese Dunkelheit reicht bis zu der Gränze, wo Tropfen zuerst in die Lage kommen, daß Farbestralen (zuerst die rothen) nach zweimaliger innerer Rückwerfung davon in unser Auge gelangen können, d. i. wo der innere Rand des äußern Regenbogens beginnt, welche Lage die ist, wo die Stralen, die von dem Raum außerhalb des innern Regenbogens nach zweimaliger innerer Zurückwerfung zu uns gelangen können, das Minimum ihres Ablenkungswinkels haben.

Als einen Umstand, der mit der vorstehenden Theorie ganz in Übereinstimmung ist, erwähnt Xinger den, daß der violette Rand des Regenbogens in Verhältniß zum rothen eine ausnehmend unbestimmte Begrenzung hat. Nach der gewöhnlichen Theorie würde dieser Umstand nicht erklärlich sein, es müßten vielmehr die parallel austretenden violetten Stralen eine ganz deutliche violette Lichtlinie hervorrufen, da die rothen und gelben Stralen für diese Lage der Tropfen eine beträchtliche Divergenz zeigen. Die Wahrheit aber ist, daß die letzteren trotz ihrer Divergenz doch keineswegs für das Auge unmerklich sind, und daß sie durch ihre Vermischung mit den parallelen violetten Stralen diese zu zusammengesetztem Lichte beinahe ergänzen.

Was das große Vorniegen des innern Regenbogens über den äußern an Helligkeit betrifft, so hält Xinger dasselbe keineswegs hinreichend durch den Umstand erklärt, daß die Stralen dort bloß Eine innere Zurückwerfung erfahren haben, denn die zweifachen Zurückwerfungen geschehen unter so günstigen Winkeln, daß dieser Unterschied fast dadurch ausgewogen wird. Vielmehr mißt er dasselbe folgenden Umständen bei:

1) Die Stralen, welche das Maximum der Ablenkung im innern Regenbogen erfahren, gelangen auf die Oberfläche des Tropfens unter einem viel kleinern Einfallswinkel, als diejenigen, welche das Minimum der Ablenkung in dem äußern Regenbogen erfahren; die letzteren werden daher in größerm Verhältnisse von der ersten Oberfläche zurückgeworfen und treten in viel kleinern Verhältnisse in den Tropfen selbst ein.

2) Der Winkel, unter welchem der Stral nachmals von der innern Oberfläche in die Luft gebrochen wird, ist bei dem äußern Regenbogen ebenfalls der Zurückwerfung günstig und der Brechung ungünstig, so daß nur ein kleiner Theil der schon reducirten Quantität eingetretenen Lichtes gebrochen wird.

3) Der Umfang der Zerstreuung (extent of dispersion) wird durch die zweite Zurückwerfung vergrößert, wie aus der größern Breite des äußern Bogens erhellt.

Xinger fügt noch einige specielle Versuche zur Unterstützung der Ansicht bei, daß in der That nicht bloß die parallel nach ein- oder zweimaliger innerer Zurückwerfung in das Auge gelangenden Stralen den Gesichtseindruck bei dem in Rede stehenden Phänomen bewirken.

Er brachte eine mit Wasser gefüllte hohle Glaskugel aus ganz dünnem Glase unter verschiedenen Winkeln gegen einen leuchtenden Körper und das Auge. Es zeigte sich hier, daß obwohl die Stralen, wenn sie nach einmaliger innerer Zurückwerfung unter dem Maximum des Ablenkungswinkels in das Auge gelangten, am glänzendsten waren, doch die Verschiedenheit derselben in dieser Hinsicht von denen, welche unter anderen Winkeln ins Auge gelangten, nur eine gradweise war, und so beschaffen, daß ein Unsichtbarwerden der letzteren durch bloße Divergenz nicht wahrscheinlich erschien. In der That wurde der Stral nach einer innern Zurückwerfung sofort sichtbar, als er aufhörte mit dem, durch Zurückwerfung von der ersten Oberfläche erhaltenen, Strale zu verschmelzen, wie in Fig. 102.

Er nahm an Helligkeit immer mehr zu, aber ohne merklliche Färbung, bis die Kugel sich unter dem Maximum des Ablenkungswinkels für die violetten Stralen des innern Regenbogens befand, worauf das Licht schwächer und gefährdeter ward, bis es sich ganz und gar in ein schwaches Roth verlor. Eine analoge Progression wurde bei Versuchen beobachtet, wo der Stral nach zweimaliger innerer Zurückwerfung in das Auge gelangte^{*)}.

Unstreitig wird man auch bei diesen Versuchen zu schließen haben, daß die Stralen, welche unter anderen Winkeln, als welche ein paralleles Auftreten der Stralen zur Folge haben, in die Kugel bringen, in Farben zerstreut werden, und wenn sie demnach nach einmaliger oder zweimaliger innerer Zurückwerfung merklich weiß in das Auge gelangen, so kann dies wie bei der Regenwolke nur vermöge der Superposition verschiedener Spectra Statt finden.

Erklärung der Höfe und Ringe um leuchtende Körper, von E. Moser ^{**)}.

Man pflegt in neueren Zeiten (besonders nach Fraunhofer und Venturi) die Entstehung der Ringe, Nebensonnen u. von der Annahme abhängig zu machen, daß zur Zeit, wo sie beobachtet werden, prismatische Eisanfeln in der Luft schweben, die durch ihre Brechung in gewissen Lagen das Phänomen hervorbringen. Der Verfasser zeigt indeß durch Experimente und Berechnungen:

1) daß diese Erklärungsart den Erscheinungen nicht gehörig Genüge leiste;

2) daß man die Erscheinung unter gehöriger Berücksichtigung der Umstände recht wohl von der Brechung des Lichtes in Dampfbläschen abhängig machen könne.

Da ein Auszug aus dieser Abhandlung, ohne derselben in's Detail zu folgen, nicht zweckmäßig sein würde, so verweisen wir die Leser lieber auf die Originalabhandlung.

^{*)} Hier fängt man mit einer Sage der Kugel zwischen Auge und Licht an.

^{**)} Pogg. XVI. 67.

^{***)} Bergl. Gehler's Wörterb. Artikel Hof.

Verschiedene das Nordlicht betreffende Umstände.

Außer den, schon S. 116 beim Einfluß des Nordlichtes auf die Magnetnadel angeführten, Resultaten über das Nordlicht zieht Richardson zu seinen Beobachtungen noch folgende*):

1) Eine niedrige Temperatur scheint dem hellen Stralenschießen günstig zu sein, indem selten eine große Bewegung Statt fand, und die rismatischen Farben selten erschienen, wenn die Temperatur über 0° stand.

2) Ein beweglicher Lichtglanz beim Nordlicht erscheint seltener am ersten Viertel eines Tages und bei Vollmond, als bei einer andern Lichtgehalt desselben, war aber am dritten Viertel eines Tages und im Neumonde am öftersten zu sehen.

3) Man sah am Bärensee in den Jahren 1825 — 1826 343 Mal ein Nordlicht, ohne daß man ein Geräusch dabei vernommen hätte.

4) Der Umstand, daß man das Nordlicht in einigen Fällen die untere Fläche dichter Wolken beleuchten sahe, läßt schließen, die Höhe des Nordlichtes sei nicht sehr bedeutend. Als Dr. Richardson und Kendall am Bärensee im Frühlinge des Jahres 1826 ihre Ausföge machten, sah ersterer das Nordlicht sehr glänzend und in voller Bewegung, während letzterer kein Dunkel daran wahrnahm, und doch war letzterer nur 20 Meilen (engl.) von ersterem entfernt.

5) Das Goldblattelektrometer, welches am Observatorium aufgestellt war, wurde nie von einem Nordlichte afficirt.

6) Bei vier Gelegenheiten sah man das Wogen des Nordlichtes sehr deutlich vor dem gänzlichen Verschwinden des Tageslichtes, und oft bemerkte man, daß sich selbst zur Tageszeit die Wolken in Reihen und Bänden angeordnet hatten, wie dieses bei einem Nordlichte der Fall ist.

Hansteen **) macht, nach zahlreichen, zu Christiania über die Nordlichter angestellten, Beobachtungen folgende Bemerkungen darüber:

1) Biewohl die kurzen Tage in den Monaten November, December, Januar und Februar die Beobachtung des Nordlichtes begünstigen, sieht man es doch, wie auch schon Airan bemerkt hat, häufiger in den Zeiten der Tag- und Nachtgleiche oder bald nach derselben, als in anderen Zeiten des Jahres.

2) In den letzten 10 bis 12 Jahren hat die Häufigkeit des Nordlichtes sehr zugenommen, und so häufig, wie in den Tag- und Nachtgleichen, im Herbst 1830 und Frühjahr 1831 wurde es seit 1793 nicht in Christiania gesehen.

Hansteen fährt fort:

„Es ist klar, daß wir jetzt an einer neuen Nordlichtperiode sehn. Die vorige fing 1707 mit dem merkwürdigen Nordlicht an, welches der berühmte Die Römer in Kopenhagen beobachtete (einige wenige

* Baumg. V. 247.

** Pogg. XXII. 534.

schwache waren jedoch einige Jahre früher von ihm bemerkt worden), war um 1752 am stärksten und hörte um 1790 auf, worauf eine Pause von etwa 20 bis 25 Jahren eintrat, während welcher nur im hohen Norden Nordlichter, und noch dazu schwache, gesehen wurden.

Von solchen Perioden habe ich geglaubt, seit dem Jahre 502 vor Christi Geburt bis auf unsere Zeit 24 nachweisen zu können, von welchen besonders die neunte, von 541 bis 603, die zwölfte, von 823 bis 887, die zweiundzwanzigste, von 1517 bis 1588, und die vierundzwanzigste, von 1707 bis 1788 sich durch ungewöhnlich starke und häufige Nordlichter auszeichneten".

Farquharson *) führt neuerdings wieder mehrere Belege an, daß das Nordlicht hauptsächlich solchen Winden vorausgeht oder sie begleitet, welche starke Kälte bringen (zu Alford, dem Beobachtungsorte, N. und SW. Winde).

Ferner führt derselbe unter mehreren andern Einzelheiten in den Beobachtungen, welche auf einen Zusammenhang des Nordlichtes mit der Verdichtung der Dünste und Wolkenbildung hinweisen, auch die an, daß während der ganzen Zeit eines Nordlichtes sich ein nebelichtes Licht über dem Gipfel einer Wolke zeigte, die einen stationären Stand über dem Gipfel eines großen Hügels hatte, ungeachtet diese Wolke ganz außer dem Bereich des übrigen Nordlichtes lag.

Da nach den übereinstimmenden Angaben von Kries (in Göttingen) und Serling (in Marburg **) in dem dunkeln Segmente, welches der letzte Nordlichtbogen vom 7. Januar 1831 einschloß, Sterne ohne Schwächung ihres Glanzes sichtbar waren, so ist dies ein Beweis, daß dieses dunkle Segment des Nordlichtes nicht, wie man wohl vermuthet hat und der Anschein wirklich zu glauben verleiten kann, eine gewöhnliche Wolke ist.

Dove schließt aus correspondirenden Beobachtungen eines Nordlichtes, welches am 20. December 1830 von entfernten Stationen aus beobachtet ward, daß die Höhe desselben an seinen oberen Gränzen nicht über 4000 Fuß betragen haben könne (Pogg. XX. 336).

Einen Nordlichtsbogen von ganz ungewöhnlicher Form beobachtete Field *** am 9. März 1831 zu Fayetteville in Nordamerika. Derselbe bildete nämlich nicht wie gewöhnlich einen einzigen regelmäßigen Kreisbogen, sondern bestand aus mehreren mit einander verbundenen Kreisbögen von verschiedenen Durchmessern, wie man sie durch Verbiegung eines

*) Philos. transact. 1830. P. I. p. 111, 114.

**) Pogg. XXII. 453, 454.

***) Field, der zu Fayetteville in den vereinigten Staaten Nordamerikas seit mehreren Jahren ein meteorologisches Tagebuch führt, bemerkt, daß er in den 10 Jahren von 1820 bis 1830 im Durchschnitt jährlich etwa 18 Nordlichter gesehen habe, daß aber in den 12 Monaten, vom Mai 1831 rückwärts gerechnet, allein 56 sichtbar waren (Pogg. XXIII. 158.).

einzigsten Kreisbogens erhalten könnte. Die nähere Beschreibung und Abbildung s. in Pogg. Ann. XXIII. 158.

Über das Nordlicht vom 7. Januar 1831.

Dieses Nordlicht ist wegen der Schönheit, mit der es sich gezeigt hat — denn unter allen seit dem 22. October 1804 im mittlern Europa sichtbar gewordenen Nordlichtern ist es unstreitig das größte und prachtvollste gewesen — und der großen Menge von Orten, an denen es beobachtet worden ist, unstreitig eins der merkwürdigsten, so daß einige Nachrichten darüber hier nicht am unrichtigen Orte sein werden. Sie sind entlehnt aus der sehr guten Zusammenstellung, welche über dieses Nordlicht in Pogg. Ann. XXII. 434, 534 gegeben ist, wo man auch detaillirte einzelne Beschreibungen dieses Nordlichtes, die wir hier übergehen zu müssen glauben, finden wird *).

Was zunächst die Sichtbarkeit des Meteors betrifft, so scheint dasselbe sich über das ganze nördliche und mittlere Europa erstreckt zu haben, namentlich über England, Norwegen, Schweden, Rußland, Preußen, Polen, Dänemark, ganz Deutschland, die Schweiz, die Niederlande und Frankreich. In Petersburg wurde es, wegen bedeckten Himmels, nicht gesehen, dagegen aber im Gouvernement Bologna, ja sogar in Orenburg, ferner in Dorpat, Riga, Königsberg, Warschau, Breslau, Krakau, Wien, Triest, München, Genf, Brüssel, Utrecht, Paris, Versailles, Gosport, Bedford, Woolwich, Christiania, Christiansand, Stockholm und Upsala, so wie an unzähligen vielen Puncten innerhalb dieses großen Kreises. Im südlichen Norwegen, namentlich in Christiansand, so wie in Holland und England, hat es offenbar die größte Ausbildung erreicht, weniger vollkommen, doch immer noch höchst ausgezeichnet, war es im nördlichen Deutschland und Frankreich, und nur sehr tief nach Süden hin erschien es als ein bloßer Schein am Himmel, so daß man hier und da eine ferne Feuerbrunst zu sehen glaubte. In den schweizerischen Ortschaften, südlich von Bern z. B., wurden die Einwohner sehr in Alarm gebracht, weil man glaubte, die Landleute hätten die Stadt in Brand gesteckt. In Krakau dagegen sah das Volk in diesem prächtigen Nordlicht ein Wahrzeichen großen Unglücks. Es stürzte schaarweise nach dem Floriansthore und flehete schluchzend vor dem Bilde der heiligen Jungfrau um Rettung Polens aus der gegenwärtigen Bedrängniß.

Fast überall, wo man frühzeitig genug auf das Meteor aufmerksam wurde, nahm man es gegen 6 Uhr, an einigen Orten noch früher wahr, und die letzten Spuren desselben verschwanden erst gegen Mitternacht, in England sogar erst nach 1 Uhr Morgens.

Wenn man die in Deutschland gemachten Beobachtungen mit einander vergleicht, so findet man sie darin übereinkommend, daß sie als das Wei-

*) Eine Literatur über dieses Nordlicht wird man in der Literatur der meteorologischen Beobachtungen finden.

ar aber dies nicht der Fall, so bewegten sie sich in Ebenen, senkrecht auf die Richtung des magnetischen Meridianes, also in solchen Ebenen, welche denen der Nordlichtsbogen (fringes) parallel sind. Farquharson beobachtete sogar eine Succession von 3 oder 4 oder mehr kurz nach einander fallenden Sternschnuppen, deren Bahn sämmtlich innerhalb derselben auf den magnetischen Meridian senkrechten Ebene, oder innerhalb einer so schmalen Zone, als ein Nordlichtsbogen einnehmen würde, fielen; es nach einer beträchtlichen Zeit wieder eine ähnliche Succession von Sternschnuppen, die in einer andern dergleichen, nur weiter südlich gelegenen, Zone sich bewegten, als wenn die Ebene der Bewegung sich eben so wie ein Nordlichtsbogen südlich fortbewegt hätte.

XI. Temperaturverhältnisse.

über Veränderungen der urweltlichen Temperatur.

Bekanntlich hegt Cuvier*) die Ansicht, daß die Elephanten, welche uns fossile Elfenbein lieferten, in den Ländern, wo man gegenwärtig ihre Knochen findet, lebten und wohnten, und daß eine plötzliche, jene Länder betreffende, Erhaltungsurache Ursache ihres Verschwindens daselbst sei, welche sich sonst nicht erklären lasse, wie, zufolge einiger bekannten Fälle, die Leiche dieser Thiere zuweilen noch mit Fleisch umgeben dort vorgefunden werden konnten **).

Nach den neuerdings von Humboldt ***) gegebenen Erörterungen ist indes der Schluß, den Cuvier von diesen Umständen aus auf eine plötzliche Erhaltung macht, nicht so bindend, als es dem ersten Anblick nach

*) Cuvier *Ossemens fossiles* T. I. p. 203 oder Pogg. XXIII. 104.

**) Folgendes sind Cuvier's Worte: „Alles macht es ungemein wahrscheinlich, daß die Elephanten, welche das fossile Elfenbein lieferten, in den Ländern, wo man gegenwärtig ihre Knochen findet, lebten und wohnten. Sie könnten nur durch eine Umwälzung, welche alle damals lebenden Thiere tödtete, oder durch eine Veränderung des Klimas, welche ihre Fortpflanzung daselbst hemmte, verschwunden sein. Was aber auch die Ursache davon sei, so hat sie ihr plötzlich wirken müssen. — Wäre die Kälte gradweise und langsam eingetreten, so würden diese Knochen, und noch vielmehr die weichen Theile, von denen diese noch zuweilen umgeben sind, Zeit gehabt haben sich zu zerlegen, wie die, welche man in heißen und gemäßigten Ländern findet. Es würde unmöglich gewesen sein, daß ein ganzer Leichnam, wie der von Herrn Abams entdeckte, sein Haar und seine Haut behalten hätte, wäre er nicht unmittelbar von einem Eise, das ihn uns aufbewahrt hat, eingeschlossen worden. Alle Hypothesen einer allmähigen Erhaltung der Erde oder einer Veränderung in der Reinigung der Erdoberfläche fallen mithin von selbst.“

***) Pogg. XXIII. 106.

b) Während die Wärme im Aufsteigen begriffen ist, d. h. im Frühjahr, ist dieser Unterschied immer größer als im Herbst, wo die Wärme wieder sinkt. So beträgt nach den zwanzigjährigen Beobachtungen am 27. März das Mittel aus dem Maximum und Minimum 5° R. und die Differenz zwischen Maximum und Minimum 7° ; am 13. November beträgt das Mittel ebenfalls 5° , die Differenz bloß $2^{\circ}\frac{1}{2}$. Am 10. Mai beträgt das Mittel 11° , die Differenz $8^{\circ}\frac{1}{2}$; am 26. September das Mittel ebenfalls 11° , die Differenz nur etwas über $6^{\circ}\frac{1}{2}$.

c) Dagegen richtet sich diese Differenz ziemlich genau nach der astronomischen Jahreszeit, indem sie an einem Tage nach dem Sommerсолstitium eben soviel beträgt, als an einem gleich weit absteigenden Tage vor dem Sommerсолstitium. Dies wird in der Originalabhandlung durch eine besondere Tabelle belegt. Addirt man hier die Zahlen für die einzelnen fünftägigen Perioden vor dem Солstitium, so bekommt man als Summe 208,7; addirt man eben so die Zahlen für die entsprechenden fünftägigen Perioden nach dem Солstitium, so bekommt man 211,4 oder als mittlere Differenz für die Jahreshälfte vor dem Солstitium $5^{\circ},80$, als mittlere Differenz für die Jahreshälfte nach dem Солstitium $5^{\circ},87$.

Zeit der jährlichen mittleren Temperaturen und Temperaturextreme *).

R ä m g hat durch Berechnung von Temperaturbeobachtungen für elf Orte **), welche zwischen den Paralleltreifen von Enonteki in Lappland und Abusheer am persischen Meerbusen (29° R. B.) liegen, gefunden, daß die Zeit des jährlichen Mittels und der Extreme der Temperaturen in keiner nachweisbaren Abhängigkeit von der Polhöhe oder sonstigen klimatischen Verhältnissen steht, so daß im Mittel aus den Beobachtungen für jene elf Orte die Tage des Jahres, an welchen die mittlere Temperatur eintritt, der 24. April und 21. October angesehen werden können, der kälteste Tag des Jahres als der 14. Januar, der wärmste als der 26. Juli.

Ich muß allerdings bemerken, daß hinsichtlich des kältesten Tages dies von R ä m g durch Berechnung gefundene Resultat nicht mit der Erfahrung übereinzustimmen scheint, da aus den von Brandes für zehn Orte gegebenen, von 5 zu 5 Tagen fortschreitenden, Beobachtungen ***)) direct hervorgeht, daß die kälteste Zeit des Jahres fast allenthalben vielmehr um den Anfang des Jahres fällt, dagegen um die Mitte des Januar schon ein Abfall der Kälte eingetreten ist, dem jedoch an mehreren Orten um das Ende des Januars eine neue Steigerung der Kälte folgt. Letzterer Umstand möchte es auch erklärlich machen, warum R ä m g Rechnung, bei welcher

*) Schweigg. LV. 377.

**) Vergl. S. 123.

***)) C. Brandes Untersuchungen über den mittlern Gang der Wärmeänderungen durch das ganze Jahr u. Leipzig 1820. oder Biot's Lehrbuch V. S. 404, 410.

130 Berechnungsmethode des jährlichen Temperaturganges.

bloß die ganze Mitteltemperatur des Jahres in Verhältnis zu den Mitteltemperaturen der anderen Monate in Betracht gezogen wird, das Minimum um die Mitte fallen läßt.

Methode, den Gang der Temperatur im Jahre zu berechnen, von Rämz *).

1) Man kann den Gang der Temperatur an einem Orte nach folgender, schon von Hallström zu diesem Zwecke gebrauchten, Formel bestimmen, deren Anwendbarkeit Rämz neuerdings noch mehr bestätigt und erläutert hat **).

$$T_n = t + \alpha \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) 30^\circ + \nu' \right] + \beta \sin \left[\left(n + \frac{1}{2} \right) 60^\circ + \nu'' \right] \quad (1)$$

Hierin bedeutet T_n die Temperatur des Monats **), dessen Ordnungszahl n ist, und zwar so, daß der Werth von $n = 0$ dem Anfang des Jahres, $n = 1$ dem Ende des ersten, $n = 2$ dem Ende des zweiten Monats u. s. f. entspricht; Bruchwerthe von n aber den einzelnen Monatstagen; t bedeutet die mittlere Temperatur des Jahres als arithmetisches Mittel aus allen 12 monatlichen mittleren Temperaturen. Die Werthe von α , ν' , β , ν'' sind für jeden Ort konstante Größen, die aus den beobachteten 12 monatlichen Mitteln für jeden Ort besonders zu bestimmen sind. Indem dies Rämz für verschiedene Orte gethan, fand er, daß α allgemein gleich ist der halben Differenz zwischen der mittlern Temperatur des wärmsten und der des kältesten Monats, oder, wenn M die Temperatur des wärmsten, m die des kältesten Monats ist, $\alpha = \frac{1}{2} (M - m)$; ferner fand er, daß alle Werthe, welche man an den verschiedenen Orten für ν' erhält, sich so wenig von dem konstanten mittlern Werthe $248^\circ 64'$ entfernen, daß man befugt scheint, die erhaltenen Differenzen davon abzuleiten, daß die mittleren monatlichen Temperaturen, welche zur Berechnung der Constanten angewandt worden sind, nicht durch eine hinlängliche Zahl Beobachtungen bestimmt waren; wenigstens zeigen dieselben keine Spur irgend einer Abhängigkeit von der Polhöhe oder mittlern Wärme. Die beiden Constanten β und ν'' anlangend, so ist eine allgemeine Bestimmung derselben schwer; da das Glied, in welchem diese Constanten vorkommen, stets nur einen sehr geringen Einfluß auf die Bestimmung der Constanten hat, da ferner die Unregelmäßigkeiten im Gange der Temperatur eben

*) Schweigg. LV. 378.

**) Diese Formel ist indeß nur da anwendbar, wo zwei jährliche Extreme Statt finden, zwischen den Wendekreisen, wo in der Regel zwei Maxima und Minima vorkommen, oder wo die Temperatur mehrere Monate hindurch constant ist, müßte obige Formel je nach der verschiedenen Breite der Orte mehrere Glieder haben. Ihr Gebrauch in obiger Gestalt ist daher nur auf Orte außerhalb der Wendekreise zu beschränken, wie auch von Rämz geschehen ist.

**) Für das Folgende in Gentesimalgraden angenommen.

†) Vgl. die nachfolgende Zusammenstellung in dieser Hinsicht.

Berechnungsmethode des jährlichen Temperatunganges. 131

größern Einfluss auf die Werthe von β und ν , als auf die von α und γ zu üben scheinen. Indes glaubt Läng, man werde sich von der Richtigkeit nicht sehr entfernen, wenn man annimmt, es sei β ebenso wie α eine Function von $(M - m)$, und setzt man der Einfachheit wegen $\beta = p(M - m)$, so findet sich nach einem Mittel der nachher anzuführenden Data sehr nahe $p = \frac{1}{10}$ oder

$$\beta = \frac{1}{10} (M - m).$$

Die Werthe von ν ferner stimmen für alle Orte hinlänglich nahe zu dem Mittelwerthe zusammen

$$\nu = 353^\circ 46',$$

Fast man dieses zusammen, so wird sich die dem n ten Monate entsprechende Temperatur allgemein für alle Orte (außerhalb der Wendekreise) ausdrücken lassen durch:

$$T_n = t + \frac{1}{10} (M - m) \sin \left[(n + \frac{1}{2}) 30^\circ + 248^\circ 54' \right] + \frac{1}{10} (M - m) \sin \left[(n + \frac{1}{2}) 60^\circ + 353^\circ 46' \right] \quad (2)$$

2) Um die Zeit, wo die mittlere Jahrestemperatur t eintritt, zu finden, hat man n durch folgende Gleichung zu bestimmen*):

$$p \sin \left[(n + \frac{1}{2}) 30^\circ + \nu \right] + \beta \sin \left[(n + \frac{1}{2}) 60^\circ + \nu \right] = 0$$

Die Zeit der größten und kleinsten Jahrestemperatur andererseits ergibt sich durch die Gleichung**):

$$\alpha \cos \left[(n + \frac{1}{2}) 30^\circ + \nu \right] + 2\beta \cos \left[(n + \frac{1}{2}) 60^\circ + \nu \right] = 0$$

Stellt man die nach diesen Formeln berechneten Tage, an welchen die mittleren Temperaturen, so wie die, an welchen die Extreme eintreten, für verschiedene Orte zusammen, so findet man, wie schon S. 129 erwähnt wurde, daß die Werthe für diese Tage für die verschiedenen Orte nahe zusammenfallen, und daß die Statt findenden Differenzen keine Spur einer Abhängigkeit von der Polhöhe oder der sonstigen Beschaffenheit des Klima's zeigen, daher sie in der That nur von der unzureichenden Zahl angelegter Beobachtungen abzuhängen scheinen. Nimmt man das Mittel aus den für die weiterhin anzugebenden elf Orte erhaltenen Werthe, so findet man:

Tage der mittlern Temperatur: 24. April und

21. October;

Kältester Tag des Jahres 14. Januar;

Wärmster Tag des Jahres 26. Julius.

3) Die im Vorigen ausgesprochenen Resultate setzen uns in den Stand, die mittleren Temperaturen von Orten zu bestimmen, wo der Thermometerstand kein ganzes Jahr hindurch aufgezeichnet ist. Ziehen wir nämlich in Betracht, daß die Änderungen der Temperatur von einem Monat bis

*) Für sie nämlich wird in Gleichung (1) der Werth $T_n = t$.

**) Sie ergiebt sich, indem man das Differenzial der Gleichung (1) gleich Null setzt. Übrigens scheint mir doch, da im Januar nicht sowohl ein Minimum, als vielmehr zwei Minima der Temperatur nach Brandes Untersuchungen Statt haben, die Anwendung der obigen Formel zur Bestimmung desselben einiger Bedenklichkeit zu unterliegen. Vgl. S. 128.

132 Berechnungsmethode des jährlichen Temperaturanges.

zum folgenden von dem Werthe von $M - m$ abhängen, so dürfen wir die letztere Größe nur aus der erstern herleiten; haben wir dann $M - m$ bestimmt, so dürfen wir nur die Temperaturen der gegebenen Monate vermittelst der Formel (2) berechnen und daraus die mittlere Temperatur herleiten. Vergleichen, welche Kämp für Orte angestellt, deren mittlere Temperaturen durch länger fortgesetzte Beobachtungen gefunden sind, haben ihm ergeben, daß dieses Verfahren in der That Resultate giebt, welche der Wahrheit sehr nahe kommen.

Unter den Belegen zu 3) wird man die Berechnung nach dieser Methode durch einige Beispiele erläutert finden.

Belege zu vorstehenden Bestimmungen.

Zu 1) Man findet in folgender Tabelle die Werthe von α , ν , β , ν' , wie sie sich durch directe Berechnung für die nachstehenden elf einzelnen Orte ergeben haben. Beigefügt sind die unmittelbar aus den Beobachtungen gezogenen Werthe $\frac{1}{2} (M - m)$ und $\frac{1}{10} (M - m)$, mit welchen α und β coincidiren sollen, während ν und ν' nach dem Vorigen eigentlich für alle Orte einen constanten Werth behalten sollen. Man erkennt daher aus der folgenden Tabelle, mit welcher Annäherung dies nach den bisherigen Beobachtungen Statt findet. Diese sind jedoch für manche der angeführten Orte noch nicht lange genug fortgesetzt.

Ort.	Zeit der Beobachtung.	α	$\frac{1}{2}(M-m)$	β	$\frac{3}{2}(M-m)$	γ	γ''
Gronthe	5	16,630	16,695	1,0658	1,1190	251° 59'	347° 21'
Gyrfinnia	12	10,639	10,595	1,1865	0,7063	249 26	404 29
Upala	30	10,980	11,280	0,5932	0,7530	251 23	390 15
Fort Guitan	4	11,449	11,785	0,2729	0,7867	243 31	351 3
Wandjeff	25	6,718	6,555	0,5336	0,4370	249 46	342 32
Maria	20	11,156	11,180	1,0055	0,7453	252 41	313 41
Jobua	7	11,686	11,795	0,6882	0,7863	245 52	351 17
Rom	17	8,133	7,945	0,6325	0,5330	245 21	356 14
Gupfah	8	4,845	5,105	0,7111	0,3403	249 38	327 43
Fort Sojafon	4	8,440	8,105	0,2705	0,5403	250 31	378 28
Zoubier	1	9,884	9,445	0,8746	0,6297	247 47	322 20
Summe der Mittel		110,550	110,485	7,8344	7,3689	248 54	365 46

Zu 2) In folgender Tabelle ist eine Zusammenstellung der Tage gegeben, an welchen an den verschiedenen obgenannten Orten die Mittel und Extreme nach der Berechnung eintreten würden.

134 Berechnungsmethode des jährlichen Temperatursanges.

Orte.	Tage des Mittels.		Tage der Extreme.	
Gnontekis .	28. April	22. Oct.	20. Jan.	26. Juli.
Christiania .	3. Mai	14. —	17. —	20. —
Upsala .	22. April	18. —	16. —	21. —
Fort Sullivan	26. —	26. —	24. —	29. —
Manchester .	27. —	23. —	12. —	27. —
Turin . . .	18. —	26. —	3. —	27. —
Padua . . .	20. —	15. —	15. —	26. —
Rom . . .	1. Mai	24. —	16. —	1. Aug.
Capstadt . .	19. April	21. —	(4. Febr.).	(6. Juli).
Fort Johnston	21. —	18. —	18. Jan.	21. —
Kushkeer .	28. —	22. —	12. —	18. —
Mittel . .	24. —	21. —	14. —	26. —

Zu 3) Beispiel der Berechnung. Nach fünfjährigen Beobachtungen von Marabitti ist die mittlere Temperatur von Palermo $16^{\circ} 77$ (Schouw's Pflanzengeographie S. 212). Gesezt, es wäre dort nur drei Monate beobachtet, etwa im Januar, Mai und September, so läßt sich das Jahresmittel aus diesen folgendenmaßen annähernd bestimmen. Es ist die Temperatur

Januar $10^{\circ} 78$
Mai $17^{\circ} 71$ Unterschied $6,98$
September $21^{\circ} 57$ — $3,86$

Die Summe der Unterschiede beträgt demnach $10^{\circ} 79$. Wir dürfen diese Summe nur an einem andern Orte, wo die Größe von $M - m$ bekannt ist, auffuchen. In Rom haben wir die Temperatur im

Januar $7^{\circ} 70$
Mai $17^{\circ} 77$ Unterschied $9,99$
September $20^{\circ} 76$ — $2,99$

Es ist mithin die Summe der Unterschiede $12^{\circ} 98$. Der Werth von $M - m$ ist in Rom $15^{\circ} 89$; er wird also in Palermo in dem Verhältnisse von $12^{\circ} 98$ zu $10^{\circ} 79$ kleiner, mithin $13^{\circ} 24$. Sezen wir diese Größe in den oben gefundenen allgemeinen Ausdruck und bezeichnen wir die mittlere Temperatur mit x , so erhalten wir für den

Januar $x - 6^{\circ} 40 = 10^{\circ} 78$
Mai $x + 2^{\circ} 24 = 17^{\circ} 71$
September $x - 4^{\circ} 16 = 21^{\circ} 57$

und hieraus $x = 16^{\circ} 69$, was mit der durch Beobachtungen gefundenen Größe $16^{\circ} 77$ vollkommen übereinstimmt.

In Uleo in 65° N. B. ist nach den Beobachtungen Julin's die mittlere Temperatur $0^{\circ} 66$ (v. Buch's Reise durch Norwegen und Lapp-land II. 295). Bleiben wir hier bei denselben Monaten stehen, welche der

Vergleichung in Palermo zum Grunde gelegt wurden, so erhalten wir folgende Temperaturen

Januar	15°,54 C.	
Mai	4°,94	Unterschied 18,48
September	5°,05	— 8,11

Die Summe der Unterschiede beträgt 21°,59. Diese Größe mit der gleichartigen für Rom verglichen giebt $M - m = 26,49$. Darnach erhalten wir, wenn x die mittlere Jahreswärme bezeichnet,

Januar	$x - 12°,72 = - 18°,54$
Mai	$x + 0°,88 = 4°,41$
September	$x + 8°,33 = 8°,05$

und hieraus im Mittel $x = 0°,99$, was von der durch Beobachtungen gefundenen Größe $x = 0°,66$ um $\frac{1}{3}$ Grad abweicht.

über Quellen- oder Bodentemperatur im Allgemeinen,
von Kupffer *).

Kupffer bemerkt, daß die Quellen in bergigen Gegenden keine so sichere Anzeige von der Temperatur des Bodens geben können, als die Quellen des flachen Landes; weil die ersten ihren Ursprung von Höhen haben können, wo sie dann eine tiefere Temperatur zeigen, als ihnen nach der Lage des Ortes, wo sie sich befinden, zukommen würde. Auch Quellen, welche aus einem sumpfigen Boden kommen, sind zur Bestimmung der Bodenwärme ungeeignet, weil ihre Temperatur durch Vermischung mit dem stagnirenden und der Wirkung der Luft stets ausgesetzt Sumpfwasser verändert wird.

Durch Vergleichung einer namhaften Menge von Beobachtungen (siehe die Tabellen derselben im folgenden Artikel) hat Kupffer **) ferner ausgemittelt:

1) daß die Quellentemperatur, so wie die mittlere Wärme der Luft, sich auf demselben Parallelkreise nicht gleich bleibt. Wenn man durch alle Punkte, die dieselbe Quellen- oder Bodentemperatur haben, Linien zieht, so ähneln diese Linien, die Kupffer Isothermen nennt, den (sich auf die Temperatur der Luft beziehenden) Isothermen darin, daß sie dem Äquator nicht parallel sind, weichen aber übrigens von diesen mehrfach ab***).

2) Daß die Bodenwärme, so wie die mittlere Wärme der Luft, abnimmt, indem die geographische Breite zunimmt, aber auf eine regelmäßige Weise. Die Abnahme der Wärme vom Äquator nach den Polen zu geschieht desto rascher, je näher man sich dem Parallelkreise von 45° nähert; höher hinauf geschieht sie wieder minder rasch. Hieraus läßt sich der

*) Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 372.

**) Pogg. XV. 180.

***) Kupffer hat seiner Abhandlung eine Verzeichnung der Isothermen zugleich mit den Isothermen, so daß sich ihr Verhältniß mit einem Blicke übersehen läßt, beigegeben.

von Fahrenheit bekannte Punkte wählen, wenn sie in niedrigeren niedriger ist, als die mittlere Lufttemperatur. Bekanntlich nimmt diese bis 32° F. sehr wenig ab: die Bodentemperatur also, die dahin immerfort abnimmt, und in hohen Breiten geringer sein, wenn sie am Äquator eben so groß war, als die mittlere Wärme der Luft einer mittleren Breite entspricht, hat die Bodentemperatur die mittlere mit der Luft wieder ein, in tieferen nicht so richtig abnimmt, d. letztere. In höheren Breiten entspricht überhaupt nur demselben Grad Bodentemperatur der mittleren Wärme der Luft vorerst.

5) Hinsichtlich der Lufttemperatur am Äquator findet man meistens France, die auf durchschnittliche Höhen oder Inseln fallen, niedrigeren Temperatur haben, als diejenigen, die sich weiter in einem der Continente befinden. Der nämliche Punkt bei Äquator befindet sich in Japan von Tokio: im Norden zwei Punkte, nördlicher in den, die nicht über 30° gehen, haben die Temperatur eine stark genug nach Norden. Der höchste Temperatur bei Äquator liegt südlich zwischen 30° nördlicher und 60° nördlicher Länge (von Paris gerechnet) zwischen der Halbinsel von Afrika und der Halbinsel von Asien; von hier aber nimmt die Bodentemperatur nach Osten und Westen rasch zu.

6) Es ist wahrscheinlich, daß weder die mittlere Bodentemperatur noch die mittlere Lufttemperatur, noch die mittlere Temperatur mit dem Ort; doch reichen die Beobachtungen noch nicht aus, darüber etwas bestimmt festzusetzen.

Gleichung für die Abhängigkeit der Lufttemperatur der geographischen Breite.

Laplace*) findet, daß man die Abhängigkeit der auf der Höhe Meeresspiegel beobachteten, mittleren Lufttemperatur von Breite, bei bestimmten Breiten besser, sehr genügend durch folgende Formel ausdrücken kann:

$$t = a - b \sin^2 \phi,$$

wo a und b aus den Beobachtungen zu bestimmenden Constanten, geographische Breite, t die Lufttemperatur ist. In der That ist es mit einzelnen Ausnahmen eine sehr genaue Übereinstimmung der Rechnung und Beobachtung, wenn man (für bestimmte Grade) sehr

für den Meridian

	a	b
von Paris, 0° L.	21,5	30,9
von Ruze, 20° O. L.	24,4	25,6
von Ural, 60° O. L.	22,9	27,5
von Cumana 80° O. L.	24,0	33,7

*) Ann. de Ch. et de Ph. XLII. p. 36 oder Pogg. XV. 121.

aus folgender Zusammenstellung erhellt. Die beobachtete Quelltemperatur ist in den nachfolgenden Tabellen nicht diejenige, welche wirklich beobachtet worden ist, sondern die, welche man erhält, wenn man für je Meter Erhebung des Beobachtungsortes über der Meeresfläche 1° R. der wirklich beobachteten Quelltemperatur abzieht, um dadurch die Correction auf die Temperatur zu erlangen, welche der Boden haben würde, wenn er im Niveau des Meeres läge. Diese Reduction ist allerdings auf eine wahrscheinliche Annahme vom Abnehmen der Temperatur mit Erhebung über der Meeresfläche gegründet.

Meridian von Paris 0° L.			Meridian von Umeo 20° O. L.		
	berechnet.	beobachtet.		berechnet.	beobachtet.
tor	21,3		Äquator	24,4	
riffa	16,5	14,4	Cairo	18,0	18,0
Pago	19,9	19,6	Berlin	8,8	8,1
seaur	11,6	11,6	Carlstrona	6,7	6,8
	10,4	10,3	Upsala	5,2	5,2
	9,5	9,5	Umeo	3,7	2,3
in	7,8	7,7	Giwartenfäll	3,0	3,0
ist	7,4	7,4	Pol	-1,2	
burg	7,0	7,0			
	+ 0,4				

Meridian des Ural 60° B. L.			Meridian von Cumana 80° B. L.		
	berechnet.	beobachtet.		berechnet.	beobachtet.
tor	22,9		Äquator	24,0	
Selewa	4,7	4,7	Rockfort	20,9	20,9
rei-La-			Cumana		20,5
guilist	3,1	3,1	Paranna	18,8	18,8
potourie	2,7	2,7	Cincinnati	10,5	10,5
lowell	2,3	2,3	Philadelphia	10,2	10,2
	- 4,6		Pol	- 9,7	

Die einzelnen Ausnahmen betreffend, so bemerkt Ruppert, Amerissa schon sehr weitlich, gehöre mithin eigentlich nicht unter den Meridian Paris; bei Cumana und Umeo, wo ebenfalls starke Abweichungen in Rechnung von der Beobachtung Statt finden, müssen locale Ursachen, die die Quelltemperatur erniedrigen, zur Erklärung angenommen werden. übrigens ist auch in Betracht zu ziehen, daß die Formel

$$a - b \sin^2 l = t$$

nur als eine empirische Annäherungsformel betrachtet werden darf, da, wenn sie genau wäre, man denselben Werth für den Pol finden müßte, auf welchen Meridian man auch denselben bezöge, was aber zufolge der Tabelle nicht der Fall.

Abgesehen hiervon läßt sich nach der gegebenen Formel leicht die Bodentemperatur für jeden Breitengrad unter einem von den Meridianen, für welchen die Constanten bestimmt sind, finden, so wie umgekehrt für einen der genannten Meridiane die Punkte, in welchen die Quellen-temperatur 5, 10, 15 u. Grade beträgt *).

Kupffer hat hievon zur Verzeichnung der Isothermen Gebrauch gemacht.

Wenn die vorstehende Formel von Kupffer nur eine empirische ist, so hat dagegen Brewster **) eine, mit der Natur des Problems zusammenhängende, Formel aufzustellen gesucht, unter der Annahme, daß zwei Pole der größten Kälte Statt finden, welche (was wohl eine sehr precise Annahme sein möchte), in den gerade entgegengesetzten Meridianen liegen und eine gleiche Temperatur besitzen.

Diese Formel ist folgende:

$$T = (t - \tau) (\sin^a \delta + \sin^a \delta') + \tau$$

Hierin bedeutet:

T die mittlere Temperatur irgend eines Punktes der Erdoberfläche (auf das Meeresniveau reducirt);

t das Maximum der Äquatorialtemperatur;

τ die Minimumtemperatur an jedem der Kältepole;

δ und δ' die Abstände des Ortes von jedem der Kältepole. Diese Abstände werden durch die Formeln erhalten:

$$\cos \delta = \frac{\cos L \cos (l - \delta')}{\cos \delta'}$$

$$\tan \delta = \cos M \tan L$$

Hier ist:

L die Colatitude des Poles der größten Kälte;

l die Colatitude des Ortes;

M der Längengradsunterschied zwischen dem Orte und dem Kältepole.

t ist nach Brewster nahe 82°,5 F. (28°,5 C.), und τ fällt zwischen 0° bis - 3°,5 F. (- 17°,3 bis - 19°,3 C.). Der Exponent n beträgt nahe $\frac{1}{2}$. Die Beobachtungen scheinen nach ihm am besten dargestellt werden zu können, wenn man den amerikanischen Pol unter 73° N. B. und

*) Kupffer setzt zu diesem Zweck die Formel unter folgender Form an:

$$\cos^2 l = 1 - 2 \frac{a - t}{b}$$

) Pogg. **XXI. 323 oder ausführlicher in Fourier's Notiz. Nr. 18. und 19. des **XXX.** Bandes.

100° R. z. von Greenwich, den ostl. Pol unter 78° R. B. und 80° D. z. liegt.

Über Temperaturabnahme mit der Höhe.

Bekanntlich hat man über die Temperaturabnahme, welche bei der Erhebung über die Erdoberfläche Statt findet, ausnehmend viel verschiedene nicht unter einander übereinstimmende Angaben *). Der Grund dieser Nichtübereinstimmung kann jetzt wohl als ziemlich aufgeklärt angesehen werden. Diese Abnahme nämlich ist nicht zu allen Jahreszeiten eine constante Größe für gleiche Höhen Differenzen, sondern ändert sich mit der absoluten Temperatur der Standpunkte, von denen man ausgeht, oder ist eine Function derselben, und zwar in solcher Art, daß im Sommer (oder allgemein bei höherer Temperatur des untern Standpunktes) gleichen Temperaturdifferenzen geringere Höhen Differenzen, oder, was dasselbe sagt, gleiche Höhen Differenzen größeren Temperaturdifferenzen entsprechen, als im Winter. So fand Guezi n **) mittelst häufiger Ersteigung des Berges Ventoux bei Avignon, daß, um eine Temperaturverminderung von 1° R. zu erlangen, ein Erhebung nöthig war:

im Sommer von	80 Toisen,
im Winter von	100 Toisen,
in den Zwischenjahreszeiten von	90 Toisen.

In denselben Resultaten führen in noch weiterm Umfange die gleichzeitig zu Genf und auf dem St. Bernhard angestellten Beobachtungen, welche wegen ihrer großen Anzahl durch ihre mittleren Resultate zugleich dienen können, die Formeln, durch die man etwa versuchen möchte, die von der Erhebung abhängigen Temperaturabnahmen als Function der Temperatur des untern Standpunktes auszudrücken, zu prüfen.

Nun genügt den Beobachtungen sehr gut folgende Formel ***). Es sei:
 t die Temperatur der untern Station;
 t' die absolute Temperatur des Planetenraumes;
 c ein durch die Beobachtungen zu bestimmender Coefficient;
 dann hat man für die Erhebung um die ersten 1000 Meter eine Temperaturabnahme

$$\frac{t - t'}{c}$$

Für die Abnahme bei der Erhebung um die zweiten, dritten, vierten 1000 Meter u. s. f.

*) Eine Zusammenstellung derselben in Gehler's Wörterb. III. 1020.

**) Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 429.

***) Walz in Bibl. univ. 1830. Juhn. p. 127.

$$\left(\frac{c-1}{c}\right)\left(\frac{t-t''}{c}\right); \left(\frac{c-1}{c}\right)^2\left(\frac{t-t''}{c}\right)^2 \\ \left(\frac{c-1}{c}\right)^3\left(\frac{t-t''}{c}\right)^3 \text{ u. f. f.}$$

Der Werth von t'' kann so wie der von c nach der vorigen Formel aus den Beobachtungen selbst bestimmt werden; und ersterer findet sic dann $= -45^\circ \text{C.}$, welcher von dem durch Fourier bestimmten -50°C. nicht gar zu weit abweicht; der Werth von c ergibt sich nach einem Mittel aus mehr als 7000 Beobachtungen $= 0,094$ oder merklich $= \frac{1}{11}$ und die gute Uebereinstimmung der nach dieser Formel aus den verschiedenen Beobachtungen berechneten Werthe von c , die aus der in der Annäherung beigefügten Tabelle erhellt, spricht allerdings gar sehr für die Gültigkeit dieser Formel.

Indes scheint es doch, daß die obige Bestimmung der Constanten im Verhältniß zu der Temperaturabnahme, welche man aus den atmosphärischen Refractionen schließt, eine etwas zu rasche Temperaturabnahme lassen würde. Vielleicht rührt dies daher, daß Beobachtungen auf einem Berge keine den Umständen der Temperaturabnahme in freier Atmosphäre ganz entsprechenden Resultate liefern möchten.

Rupffer ***) fand bei seiner Erstigung des Ebnus im Julimonat von 1300 bis 10400 Par. Fuß (Schneeegränze) Erhebung über die Meeressfläche eine mittlere Temperaturabnahme von 1°R. für je 630 Fuß Erhebung, von 10400 Fuß bis 14300 Fuß Erhebung an aber 1°R. mittlere Abnahme für 630 Fuß Erhebung †).

*) Diese Formeln sind, wie leicht erhellt, nur eine Folgerung der ersten.

**) Folgendes sind die einzelnen Werthe, welche sich aus den verschiedenen Beobachtungsmitteln für c ergeben:

	Frühling.	Herbst.	Sommer.	Winter.	Mittel.
1826	0,097	0,105	0,097	0,082	0,095
1827	0,109	0,097	0,101	0,106	0,103
1829	0,099	0,096	0,098	0,078	0,097
1838	0,089	0,089	0,095	0,095	0,092
Minimum	0,108	0,092	0,089	0,101	0,097
9 Uhr	0,095	0,091	0,092	0,084	0,090
12 Uhr	0,095	0,094	0,095	0,088	0,090
3 Uhr	0,101	0,097	0,100	0,091	0,097
Maximum	0,096	0,098	0,098	0,085	0,094
Mittel	0,098	0,094	0,095	0,090	0,094

***) Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 110.

†) Bei der untern Station von 1300 Fuß war zu derselben Zeit die Temperatur 23°R. , wo sie in 10400 Fuß Höhe $9^\circ,6 \text{R.}$ war, und in erster Station zu derselben Zeit 21°R. , wo sie in 14300 Fuß $1^\circ,5$ war.

Eine Bemerkung von Forbes über Leslie's Formel zur Bestimmung der Wärmeabnahme mit der Höhe in der Atmosphäre s. in Brewster's Edinb. J. of sc. July. 17.

Über die Temperatur des Planetenraumes vgl. S. 1.

Über die Temperatur im Innern der Erde.

Zu den früheren Beobachtungen über die Zunahme der Temperatur im Innern der Erde mit der Tiefe sind manche neue hinzugekommen:

1) Auf Veranlassung des Herrn Alexander von Humboldt sind von 1828 bis Ende 1830 in mehreren Bergwerken des preussischen Staates Beobachtungen mit großer Sorgfalt angestellt worden, indem in den Bergwerken an solchen Punkten, wo es trocken ist und kein Luftzug hinbringt, Bohrlöcher in das feste Gestein geschlagen, und in diese Thermometer, welche mit schlechten Leitern umgeben waren, versenkt wurden, und zwar so, daß ihre Scalen daraus hervorrägten. Die genaue Beschreibung der Art, wie die Versuche angestellt wurden, und detaillierte Darlegung ihrer Resultate findet sich in Pogg. XXII. 497.

2) Mehrere, in Bergwerksschächten angestellte, Temperaturbeobachtungen von verschiedenen Beobachtern hat Penwood gesammelt. Sie wurden im Grubenwasser selbst unmittelbar bei seinem Austritte aus dem Gestein, woher es kam, oder in einer geringen Entfernung davon angestellt. Die Tabelle dieser Beobachtungen mit hinzugefügten Bemerkungen findet sich im Journ. of sc. Nr. XX. p. 234 oder Baumg. VII. 218.

3) Einige neuere Angaben zu seinen früheren über die Temperatur der Grubenwässer in Cornwall fügt Fox in Pogg XXI. 171 zu.

Diese sämmtlichen Beobachtungen bringen uns indess in der Kenntniß des Gegenstandes noch nicht viel weiter als früher, indem sie zwar die Zunahme der Erdwärme mit der Tiefe bestätigen, übrigens aber so sehr von einander abweichende Werthe für die absolute Größe dieser Zunahme geben, daß kein Gesetz daraus abgeleitet werden kann. Ich überhebe mich daher auch der detaillirten Anführung der Beobachtungen, und will nur anführen, daß nach dem Mittel der in Preußen angestellten Beobachtungen bis zu einer Tiefe von 339,8 Par. Fuß unter der Oberfläche die Temperaturzunahme von 1° R. der Tiefe von 218 Par. Fuß entspricht; daß ferner bei einer Tiefendifferenz der Thermometer von 332,96 Par. Fuß und einer Tiefe des obern unter der Erdoberfläche von 169,3 Par. Fuß der Wärmezunahme von 1° R. die Tiefe von 172°,5 entspricht.

Temperatur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen, von Lenz *).

Lenz hat über diesen Gegenstand auf der Russischen Expedition (um die Welt) in den Jahren 1823 bis 1826 sorgfältige Versuche mit seinem

*) Pogg. XX. 73.

ten, die Temperatur ist noch 10° bei 400 Fathen; allein vielleicht ist diese Beobachtung durch die Nähe des Landes modificirt, da sie im atlantischen Ocean nur 15° N. von Greenwich, also ziemlich nahe an der europäischen Küste, geschah, während die übrigen auf offener Südsee, fern von allem Festlande, Statt fanden. Aber auch bei der geringen Temperaturabnahme bemerkt man hoch deutlich den Punct des Unmerklichwerdens derselben bei 200 Fathen.

4) Die niedrigste Temperatur, die in der Tiefe gefunden wurde, war 2.2° C., und von dieser Temperatur sind ungefähr alle Tiefen, wo die Abnahme unmerklich zu werden anfängt. Diese Temperatur rückt also nach Obigem mit höherer Breite immer mehr herauf, und es wäre interessant zu beobachten, in welcher Breite dieselbe die Oberfläche erreicht.

Bildung des Grundeises.

Bekanntlich liegt die Schwierigkeit einer Erklärung des Grundeises *) darin, daß das auf den Frostpunct abgekühlte Wasser leichter ist, als das bei einigen Graden über 0° , da das Maximum der Dichtigkeit des Wassers auf $+3^{\circ}$ R. fällt; so daß man erwarten sollte, das Eis könne sich nur an der Oberfläche des Wassers bilden. Indes sind doch auch neuerdings wieder mehrere unzweideutige Fälle von Grundeis beobachtet worden (vergl. u. a. Berzel. Jahresber. 1831. S. 78), und es leiten namentlich die Beobachtungen von Hugi (Schweigg. J.) und Deaumont (le Globe. 17. Févr. 1830.) zu folgender einfachen Erklärung desselben:

Wasser kann, gleich vielen anderen flüssigen Körpern, ohne zu frieren bis unter die Temperatur, wobei es erstarrt, oder wobei es vom festen Zustande in den flüssigen übergeht, abgekühlt werden, und zwar ist dies eben so gut bei starker Bewegung als in völliger Ruhe der Fall. Folglich wird Wasser in einem reißenden Strome leicht bis zu -2 oder -3° ohne zu frieren abgekühlt, und durch die Bewegung wird alles so durch einander gebracht, daß das kalte Wasser auch auf den Boden gelangt; die hervorragenden Steine determiniren alsdann das Erstarren des Wassers in Folge des bekannten Einflusses, den feste Körper auf die KrySTALLISATION haben, indem sie ein Kern für die im KrySTALLISIREN begriffene Substanz werden. Erhöht sich die Kälte noch darüber hinaus, so verwandelt sich das Wasser in eine Masse kleiner KrySTALLen, deren Vereinigung eine Zeit lang durch die Bewegung verhindert wird, die aber doch zuletzt Statt findet, wodurch nun die Masse ihre Flüssigkeit verliert.

*) Die Bildung des Grundeises besteht bekanntlich darin, daß bei einer schnell eintretenden heftigen Kälte sich die Steine auf dem Boden von Flüssen, von einer gewissen starken Strömung, mit Eis überkleiden, welches auf ihnen anwächst, sich endlich ablöst und auf der Oberfläche schwimmt, und daß bei lange anhaltender Kälte sich zuletzt die ganze Wassermasse in einen Brei von Eisknauern verwandelt, der endlich nicht weiter fließen kann, während unterwärts das Flußbett trocken wird.

über den Einfluß der Windestrichtung auf die mittlere Temperatur, von Dove.

Durch Berechnung 27jähriger Beobachtungen in Paris *) und 14jähriger Beobachtungen in London **) hat Dove folgende Resultate gefunden:

1) Die Veränderung der mittlern Windestrichtung innerhalb der jährlichen Periode äußert einen merklichen Einfluß auf den Gang der Temperatur. In London wird durch die mehr nördliche Richtung im Sommer die Temperatur erniedrigt **), durch die mehr südliche im Winter erhöht. Im Frühling und Herbst sind die Wirkungen hier unerheblich, doch schließt sich der Frühling an den Sommer, der Herbst an den Winter an. Die unten folgende Tabelle enthält das Resultat für beide Orte.

2) Die mittlere Windestrichtung in London für das ganze Jahr, welche als vollkommener Westwind anzusehen ist, ist auf die mittlere Temperatur von London ohne Einfluß, da die Berechnung bloß $+ 0^{\circ},005$ C. als Erhöhung über die mittlere Temperatur, welche ohne Einfluß des Windes Statt finden würde, ergab; dagegen bewirkt die mehr südliche mittlere Windestrichtung des Jahres in Paris eine merkliche Temperaturerhöhung, indem sie $= + 0^{\circ},217$ C. gefunden ward.

Folgende Tabelle enthält eine Zusammenstellung der Veränderungen, welche die mittlere Windestrichtung, sowohl der einzelnen Jahreszeiten als des ganzen Jahres, in der mittlern Temperatur der Jahreszeiten und des Jahres hervorbringt. (Es sind bloß die Differenzen von derjenigen Temperatur angegeben, welche bei Elimination des Einflusses der Windestrichtung Statt haben würde, in Graden C.).

	Paris.	London.	Paris.	London.
Jahr	$+ 0,217$	$+ 0,045$	W. N.	N.
Winter	$+ 0,886$	$+ 0,321$	S. N.	W. N.
Frühling	$+ 0,622$	$- 0,036$	W. N.	W. N.
Sommer	$- 0,777$	$- 0,189$	N.	W. N.
Herbst	$+ 0,500$	$+ 0,086$	S. N.	W. N.

Ein Theorem in Bezug auf die isothermischen Linien, von Cauchy †).

Wenn man in einem Körper oder im Raume von einem gegebenen Punkte zu einem zweiten sehr nahen Punkte übergehen will, der so gele-

*) Pogg. XI. 545.

**) Ebenb. XXIII. 54.

***) d. h. über diejenige erniedrigt, welche Statt finden würde, wenn alle Winde gleich oft geweht hätten oder keine mittlere Windestrichtung Statt fände.

†) Cauchy Exera. de math. III. p. 124.

gen ist, daß die Differenz der an beiden Puncten vorhandenen Wärmequantitäten die größtmögliche sei, so muß man der Richtung der Normale folgen, welche vom ersten Puncte auf die isothermische Fläche errichtet wird, in welcher sich dieser (erste) Punct befindet.

Diesen Satz leitet Cauchy, indem er die Wärme als eine Flüssigkeit betrachtet, als Folgerung aus folgendem allgemeinem Satze ab, der sich auf feste und flüssige Massen jeder Art bezieht und durch mathematische Betrachtungen erwiesen wird:

Wenn man eine feste oder flüssige Masse durch Oberflächen, welche einander unendlich genähert sind, in homogene Schichten theilt, und von einem beliebigen Puncte, der auf einer dieser Oberflächen genommen wird, zu einem zweiten sehr nahen Puncte übergeht, so wird die Abnahme oder Zunahme der Dichtigkeit die größtmögliche sein, wenn der Abstand beider Puncte senkrecht auf die in Rede stehende Oberfläche ist.

Literatur der meteorologischen und physikalisch-tellurischen
Beobachtungen, die seit Anfang des Jahres 1829
erschienen sind *).

Im Folgenden bedeutet Pogg. Poggendorff's Annalen; Schweigg. Schweigger's Jahrbuch; Kastn. R. Arch. Kastner's Archiv für Chemie und Meteorologie; Kastn. Arch. Kastner's Archiv für die gesammte Naturlehre.

I. Kosmische Verhältnisse.

Über Bestimmung der Dichtigkeiten des Äthers im Planetenraume, von Salz, Bibl. univ. XLIV. 113. — über die Temperatur des Planetenraumes, von E van berg, Bibl. univ. XLIII. 367. — Beobachtungen an Sonne, Planeten und Kometen während des Jahres 1831; Schwabe Kastn. R. Arch. IV. 393. — Sonnenflecken in den Jahren 1829 u. 1830 Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 342; XLV. 392. — Vulkanischer (?) Perdrauch und ungewöhnliche Himmelserscheinungen von Kastner in J. R. Arch. IV. 124. — Feuerkugel am 26. Nov. 1831 beobachtet zu Edgell in Ardenberg, Forst. Not. Nr. 10. des XXXII. Bandes S. 154.

Meteorsteine im Allgemeinen. Beitrag zur Geschichte der Meteorsteine aus morgenländischen Schriftstellern; Hammer Baumg. Zeitschr. VII. 264. — Einige ältere Nachrichten über Meteorsteinmassen, von Ritter, Pogg. XVIII. 621. — über den Ursprung der Meteorsteine; Bul-

*) Diese Literatur ist unstreitig nicht vollständig. Die hieher gehörigen Notizen und Abhandlungen sind in so vielen Werken zerstreut, daß mehr Mittel, als mir zu Gebote stehen, dazu gehört haben würden, hier etwas Unfassendes zu liefern. Eben deshalb aber werde ich an denen, welche Gelegenheit zu Ergänzungen der obigen Literatur finden, sehr für Mittheilung derselben verbunden sein, um sie in der nächsten Lieferung dieses Repertoriums nachtragen zu können.

ter, *Frortep's Notiz*. Nr. 8. des XXVII. Bandes *E.* 33 oder *Bull. univ. des sc. math. et phys.* XV. 239. — Neue Beiträge zu Chladni's Verzeichnissen von Feuermeteoriten und herabgefallenen Massen; Hoff, *Pogg.* XVIII. 174, 315; XXIV. 221. — Bemerkungen über Meteorsteine; Elessen, *Rastn. R. Arch.* V. 25. — Modell zu Bahnen von Feuertugeln; Boguslawsky, *Rastn. R. Arch.* V. 126.

Eingelne Meteorsteinfälle: in Virginien bei Richmond; Gode in *Rastn. Arch.* XVII. 31 oder *Schweigg. J.* LVII. 47. — Shepard über denselben Stein in *Schweigg. J.* LVII. 50; — in den vereinigten Staaten bei Drake's Creek am 9. Mai 1827; *Kirkpatrick Bibl. univ.* XLIII. 114; XLV. 422; auch *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 416; — zu Jorshth in Georgien am 8. Mai 1829; *Sillim. Journ.* XVIII. 388, oder *Journ. of the royal Instit.* 1831. Nr. 2. p. 415; oder *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 417; — zu Atacama; *Edinb. N. phil. J.* 1830. Jan. — Avril. p. 390; — am Bord eines Schiffes am 5. April 1820; *Shotsky, Baumg. Zeitschr.* VII. 253, 382; — zu Wessely am 9. Sept. 1831; *Frort. Not.* Nr. 19. des XXXII. Bandes *E.* 298; — zu Augsburg am 13. Nov. 1831; *Greuzburg Rastn. R. Arch.* IV. 285.

Analysen von Meteorsteinen: vom Cap, von Folger; *Baumg. Zeitschr.* VIII. 279; — von Lenarto und Agram, von Folger; *ebend.* VII. 129; von Bohumitz, von Folger; *ebend.* IX. 323; — von Louisiana, von Shepard; *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 430. — Ruyter und Polybän in Meteorsteinen; Stromeyer, *Pogg.* XXIV. 651.

Erdregen: zu Orleans am 1. Oct. 1829; *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 417; — zu Siena am 6. Mai 1830; *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 419; — Blutartige Erscheinungen in Ägypten, Arabien und Sibirien, nebst einer Kritik der früher bekannten; Ehrenberg, *Pogg.* XVIII. 477. — Sogenannte Getreide- oder Schwefelregen; Göppert, *Pogg.* XII. 550.

II. Physikalische Geographie und Geologie.

über den innern Bau der Erde; Leslie, N. *Edinb. J.* Oct. — Dec. 1823 oder *Schweigg. LVI.* 396. — über den Einfluß, den Wasser, Luft, Electricität auf Hervorbringung chemischer Veränderungen auf der Oberfläche der Erde äußern; Davy, *Frort. Notiz.* Nr. 21. des XXVIII. Bandes. — über Bildung der Erde; Davy, *Edinb. N. phil. J.* 1830. Jan. — Avril. p. 320. — Untersuchung der geologischen Phänomene, welche am besten mit theoretischen Speculationen zusammenhängen; Conybeare, *Phil. magaz.* 1831. March. 188.

Versuche, den Unterschied in der Schwingungszahl zu bestimmen, welche von einem unveränderlichen Pendel auf dem königl. Observatorium

zu Greenwich und Altona gemacht worden ist; *Edsine*, *Philos. transact.* 1830, P. II. p. 185 (Auszug *Bull. univ.* XVI. 185).

Untersuchungen über einige Revolutionen der Oberfläche der Erde, welche Beweise der Übereinstimmung des Aufstehens der Lagen verschiedener Gebirgssysteme und der physischen Veränderungen liefern, wodurch die Gränzlinien entstanden sind, die man bei gewissen auf einander folgenden Stufen des Terrains, aus Niederschlägen gebildet, antrifft; *Beaumont*, *Ann. des sc. natur.* XVIII. oder *Frar. Not.* XXVI. 97. — Revolution der Erdoberfläche, welche zwischen der Periode der Kreideablagerung und der der tertiären Gebirge eingetreten ist; *Beaumont*, *Frar. Not.* Nr. 5. des XXVII. Bandes. S. 64 und Nr. 6. S. 83. — Allgemeine Betrachtungen über die Natur der Vegetation, welche die Erdrinde in den verschiedenen Perioden ihrer Bildung bedecken; *Brogniart*, *Ann. des sc. nat.* XV. 225 oder *Pogg.* XV. 385.

über den geognostischen Charakter von Italien; *Hoffmann*, *Edinb. N. phil. J.* 1829, Oct. 76. — über Geologie und Vegetation von Sicilien; *John Pogg*, *Frar. Notiz.* Nr. 22. des XXVII. Bandes. 337. — Physikalische Notizen über die Bay von Neapel; *Forriep's Notiz.* XXIII. 493, 209. — Physische und botanische Geographie des Königreichs Neapel; *Tenore*, *Frar. Not.* Nr. 22. des XXVIII. Bandes. 341. — Notizen über die Geologie von Spitzbergen; *Reilhau*, *Edinb. N. phil. J.* 1829, Oct. 144.

über Höhlen: in Tonkin; *Brewster's* *Edinb. J. of sc.* 1830, Nr. 4 p. 263; — in Booban, ebend. 268; — in Roquefort; *Buge-reignes*, *Ann. de Ch. et de Ph.* XLV. 362.

Entdeckung urweltlicher Excremente; *Buckland*, *Pogg.* XXI. 336. — Salfen und Feuer in Bafu; *Pogg.* XXIII. 297.

Berge.

Höhe der Berge: der Berge im Herzogthume Steyermark aus den Protokollen der Generaldirection der K. K. Katastral-Landesvermessung ausgezogen; *Baumgartner*, *Baumg. Zeitschr.* X. 129. — Der Berge in Tyrol, nach denselben Quellen; derselbe ebend. 301. — Der Berge im Herzogthum Krain, mit Einschluß des Görzer und Triester Kreises; nach denselben Quellen, ebend. 410. — Der Berge im steinigen Arabien; *Rappel*, *Bibl. univ.* XLVIII. 47. — Der vornehmsten Gipfel der Cordilleras und Andes in Peru; *Edinb. N. phil. J.* 1830, Jan.—Avril. p. 350. — Einige Berge Peru's; *Ann. de Ch. et de Ph.* XLII. 435. — Der Berge in Thüringen, von *Hoff*, *Kastn. Arch.* XVIII. 401. — Barometrische Höhenbeobachtungen von *Galbraith*; *Jameson's* *Edinb. N. philos. J.* 1830, Oct.—Dec. p. 40; 1831, Jul.—Oct. p. 316. — Der höchste bekannte Erdenort; *Kastner*, *Kastn. N. Arch.* II. 96. — über das relative Alter der Berge, *Beaumont*, *Forriep's Not.* XXV. 81. — über Dauer der Felsen; *Edinb. N. phil. J.* 1830, Jan.—Avril. p. 392.

über das eigenthümliche Getöse zu Natuhs am Sinai; Ehrenberg, Pogg. XV. 312. — Magnetische Eigenschaften des Felsens auf dem Gipfel von Arthurs Seat; Galbraith, Jamesons Edinb. N. phil. J. 1831. July—Oct. 285. — Tag- und Nachtwechsel auf den höchsten Alpen und thermometrisches Höhenmessen; Fugt, Kastn. N. Arch. IV. 181. — Wärmestralung und Lufterlektricität auf dem großen St. Bernhard und am Genfer See; de la Rive, Kastn. N. Arch. II. 224. — Leuchten der Firmassen; Fugt, Kastn. N. Arch. II. 390.

Gletscher: das Const und Jegt derselben; Veneq, Kastn. N. Arch. II. 225.

Vulkane insbesondere.

Betrachtungen über die Ursache vulkanischer Ausbrüche; Guibourt, Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 39. — Verzeichniß von vulkanischen Ausbrüchen; Poff, Pogg. VII. 159, 289; IX. 589; XII. 555; XV. 363; XVI. 38; XVIII. 38; XXI. 202. — über die seit 1827 bemerkten vulkanischen Erscheinungen zu Culworth. Fror. Not. Nr. 18. des XXIX. Bandes. 281. — über die Erscheinungen der Vulkane; Davy, Baumg. V. 222. — Erscheinungen beim letzten Ausbruche des Vesuv; Morgan, Bull. univers. des sc. math. XII. 348; Donati im Journ. of the royal Inst. 1831. Nr. 2. p. 296. — Ausgezeichnetes Lozen des Vesuv im Mai 1830; Kastn. N. Arch. IV. 121. — über das beim vulkanischen Ausbruche von Lanzarote ausgeworfene Wasser; Brandes, Schweigg. LVI. 394. — über Fortpflanzung des Lones und weite Verbreitung der ausgeworfenen Materialien beim Ausbruche des Schwefelberges; Fror. Not. Nr. 18. des XXXII. Bandes S. 280.

über Bergketten und Vulkane von Innerasten und über einen neuen vulkanischen Ausbruch in der Andeskette; Humboldt, Pogg. XVIII. 1, 119 oder Ann. de Ch. et de Ph. XLV. 337. — über Vulkane in Japan; Flaprotz, Pogg. XXI. 331 oder Ann. de Ch. et de Ph. XLV. 348. —

über den neuen Meervulcan in der Nähe von Sciacca in Sicilien; Castner in f. N. Arch. IV. 50; — verschiedene Nachrichten ebend. 121, 79, 429; — von Brun-Tropis-Isidore in Fror. Not. Nr. 17. des XXXI. Bandes. 257; — von Smith, ebend. Nr. 19. S. 298; — von einem Officier der Philomela in Edinb. N. phil. J. 1831. July—Oct. 365; — von Poffmann (besonders beachtenswerth) Pogg. XXIV. 65. — über den Vulkan Bimpen in Australien; Wilton in Brewster's Edinb. J. of sc. 1830. Nr. 4. p. 270. — über einen Vulkan in Neuseeland; Fror. Not. Nr. 18. des XXXI. Bandes. 280. — über einen Vulkan in Neu-Südwallis; Macle in Fror. Not. XXIV. 215. — über den Vulkan Piraeas; Stewart, Fror. Not. Nr. 3. des XXXII. Bandes. 65. — Ersteigung des Vulkans Merapi in Java und Untersuchung seines Vaters; Eschenault, Fror. Not. XXVI. 305. — über einen neuen Schlammvulcan; Fror. Not. XXIII. 218. — Beschreibung einer Reise nach

Exhibits

[illegible]

III-12

[illegible]

222

Beschreibung des See's Magul; Alexander Kuzim Sch, Pogg. XXIII, 295. — über die Variationen im Verhalten der großen Ameri-

nischen Seen; Dearborn, Bull. univ. des sc. math. XII. 444. — über den See bei Salzungen; Hoff, Pogg. XIX. 429. — über den Salz- und Jader im asiatischen Rußland; Alexander, Edinb. N. phil. J. 1830. an—Avril. p. 18. — Höhe und Temperatur des Bodensees im Jahre 1833; Schöblier, Schweigg. LIX. 31; LXV. 56. — über periodisches Anschwellen von Seen und Flüssen; Rittel, Kasn. Arch. XVIII. 463.

Quellen und Flüsse.

Thatsachen in Bezug auf die Bildung der Quellen und ihre Stärke zu verschiedenen Jahreszeiten; Penwood, Phil. mag. 1831. March. 170. — über Eänen von Mineralquellen nach Art chemischer Harmonika; Kastner, Kasn. R. Arch. I. 426. — über den Schluß von der Temperatur der Quelle auf ihre Compression; Bibl. univ. XLV. 64. — Übersicht der Mineralwässer und warmen Quellen der Niederlande und eines Theils von Preußen, mit Angabe ihrer geologischen Übereinstimmung. Nach einem Aufsatze von Dethier, mit Anmerkungen und Zusätzen von Courtois; For. Notiz. XXIV. 336. — über die Fontaine ronde, eine periodische Quelle im Jura; Dutrochet, Ann. de Ch. et de Ph. XXXIX. 434 der Pogg. XV. 533. — Höhe des Nectars in verschiedenen Jahreszeiten; Schöblier, Schweigg. LIX. 32. — Überschwemmung in Ostindien; Kasn. R. Arch. II. 96. — Bestimmung der Höhe des mittlern Donaustandes bei Regensburg über dem Meere; Schmödger, Kasn. Arch. XVIII. 392. — Einfluß der Jahreszeiten auf den Wasserstand der Brunnen; Bland, For. Not. Nr. 22. XXXII. 343. — über die heißen Quellen zu Anaval in Suraa; For. Not. Nr. 5. XXXIII. 70. — über die Bedeutung der Mineralquellen und der Gaserhalationen bei der Bildung und Veränderung der Erdoberfläche, dargestellt nach geognostischen Beobachtungen und chemischen Versuchen; Bischof, Schweigg. LXIV. 577.

Artessische Brunnen.

Ramazzini, de fontium Mutinensium admiranda scaturigine. Geneve 1717; ein Auszug daraus in den Act. erud. von 1692. p. 505. — J. Selbmann, vom Erd- und Bergbohrer und dessen Gebrauch. Leipzig 1823. — *Garnier*, de l'art du fontainier sondeur et des puits artisiens. 1821; zweite Auflage 1826. (Von der ersten Ausgabe erschien im Jahre 1824 zu Wien eine deutsche Übersetzung von Waldauf von Walenstein; auch ist ein Auszug in Pogg. XVI. 592 gegeben). — *Héricart*, considérations géologiques et physiques sur la cause du jaillissement des eaux des puits forés ou fontaines artificielles etc. Paris 1829. — Poppe, die artessischen Brunnen 2c. 1830. — Blume, die artessischen Brunnen. 1831. — Spegler, Anleitung zur Anlage artessischer Brunnen. 1832. — Sambhler, gründliche Anweisung 2c. beim Bohren artessischer Brunnen. 1832. — über artessische Salzquellen und Gasbrunnen in China; Baumg. Zeitschr. VII. 463; Pogg. XVIII. 603; Kastner in f. Archiv.

XVIII. 466 und *N. Arch.* II. 238. — Jacquin, artesische Brunnen im Unterösterreich; *Baumg. Zeitschr.* VIII. 257. — Partsch, ebendaf. 277; *Pogg.* XXI. 352. — Eine Nachricht von den meisten artesischen Brunnen, die in Frankreich gebohrt worden sind; *Dingler's polytechn. Journal* XL. Heft 5. S. 395 oder *Allg. Anzeiger* 1831. Nr. 194. S. 2650. — Nachricht von den vier, im Schloßgarten zu Reibersdorf bei Bittau, im Nov. 1830 gebohrten Brunnen; *Allgem. Anz.* 1831. Nr. 95. S. 1345; Vergl. auch *Pogg.* XVI. 592; XXI. 352.

Farbe des Wassers.

Davy *Edinb. J. of sc.* Nr. XVIII., oder *Rastn. Arch.* XVII. 223 oder *Baumg.* V. 238; — *Jackson Bibl. univ.* XLIII. 420; — *Edinb. N. phil. J.* 1829. Oct. p. 193.

Eis.

Über das Vorkommen schwimmender Eisberge in ungewöhnlich niedrigen Breiten der südlichen Halbkugel; *Horsburgh, Pogg.* XVIII. 624 oder *Bibl. univ.* 1831. Jun. 154. — Grunbeis und Eisineln; *Hugi, Bibl. univ.* XLI. 201, oder *Rastn. Arch.* XIII. 59, oder *Schweigg.* LVII. 408, oder *Gror. Not.* XXVI. 211. — über Grunbeis; *Berzelius, Bergd. Jahrsber.* 1831. 81. — über Bildung des Grunbeises; *Duhamel, Bull. univ. des sc. math.* XV. 243. — über Verdunstung des Eises; *Chéabier, in Naturwiss. Abh.* I. 211.

Gasquellen.

Über Quellen entzündlichen Gases in China; *Edinb. N. phil. J.* 1829. Oct. 108. — Natürliches Ausströmen entzündlichen Gases bei *Belap; Thomson, Edinb. J. of sc.* 1829. June 67, oder *Bull. un. des sc. math.* XII. 142 oder *Gror. Notiz.* XXV. 177. — Entwicklung von Stickstoffgas aus heißen Quellen; *Daubeny, Bibl. univ.* XLV. 374. — Kohlensturentbindung in der *Kuvergne; Fournet, Bull. univ. des sc. math.* XII. 350 oder *Gror. Not.* XXV. 209.

II. Allgemeine meteorologische Verhältnisse.

Fragmente zu einer Geschichte der Meteorologie von *Siber; Rastn. Arch.* IV. 237, 420; V. 53. — über Meteorologie der Chinesen; *Gror. Not.* Nr. 4. XXXIII. 58. — übersicht der meteorologischen Veränderungen in Vergleich mit den physiologischen Erscheinungen, nach den auf der königl. Sternwarte zu Paris angestellten Beobachtungen und den neuesten statistischen Untersuchungen entworfen; *Guerrey, Gror. Not.* XXV. 83. — über Bitterungsperioden von *Lampadius, Schweigg.* LVII. 266. —

über den Einfluß des Mondes auf die Bitterung; Schädler's Schrift über diesen Gegenstand, Schweigg. LXIV. 343, Rastn. N. Arch. IV. 17, 162.

Vorherbestimmung der Bitterung.

über die Zugvögel als Bitterungspropheten; Schädler, Rastn. N. Arch. IV. 399. — Bitterungsanzeigen von Davy; Edinb. phil. J. Nr. 10. p. 387 oder Baumg. Zeitschr. V. 241. — über Biegmann's Regel; Rastn. Arch. X. 491; XV. 495; XVI. 54. 230 und Rastn. N. Arch. II. 332; IV. 335.

Meteorologische und klimatische Verhältnisse gewisser Orte.

Bericht über die meteorologischen Beobachtungen auf Duperrey's Reise, in Mém. de l'Acad. 1830. T. IX. p. LXXXII. — Zur Klimatologie der Schweiz in Rastn. N. Arch. IV. 126. — Zur Kenntniß der klimatischen Verhältnisse von Grönland und Labrador, aus verschiedenen Berichten der Missionäre Knuth, Rehlhose und Ulbricht in Rastn. N. Arch. IV. 132. — über das Klima von Mullye, von Zytler; Forstrep's Rot. Nr. 7. XXXI. 97. — über die klimatischen Verhältnisse von Gießen; Forst. Rot. Nr. 6. XXXI. 81. — über das Klima der Magellanstraße; Ring, Forst. Rot. Nr. 8. XXXI. 219. — Siebenhaar's meteorologische Beobachtungen auf der Schneekoppe und meteorologischer Apparat; Rastn. N. Arch. III. 85. — Zur Meteorologie in Oberguinea; Rastner, Rastn. Arch. XVIII. 152.

Allgemeine Bitterungsverhältnisse einzelner Perioden.

Beiträge zur Geschichte der Bitterung und der Krankheiten im Jahre 1831; Clarus, Rastn. Mittheilungen über die Cholera. 1832. Nr. 65. — über einige meteorologische Eigenthümlichkeiten des Sommers 1831, beobachtet zu Danzig; Rastn. Mittheilungen über die Cholera. 1832. Nr. 61. — über den Winter von 1829 bis 1830 und die meteorologische Constitution dieses letzten Jahres; Baron v'Hombrès (Firmas), Bibl. univ. 1831. Janv. 73. oder Baumg. Zeitschr. IX. 480. — über die meteorologischen Erscheinungen der beiden Monate September und October 1831 in Wien; Pittrow, Wiener Zeitschr. für Kunst, Lit. u. 1832. N. 6. S. 41, Nr. 7. S. 49, Nr. 8. S. 57. — Denkwürdigkeiten der berühmten Winter von 1740 u. 1809 u. von G. G. v. F. Leipzig bei Barth. 1830.

Meteorologische Beobachtungen, welche das Barometer, Thermometer, Hygrometer, Wind- und Wetterverhältnisse, alle oder wenigstens mehrere dieser Punkte zugleich betreffen.

A. Fortlaufende Beobachtungen.

Für Berlin (vierteljährig), Pogg. Ann. zum Schluß jedes Quartals; — auf dem großen St. Bernhard (monatlich), in der Bibl. univ. zum Schluß jedes Festes, (jährliche Übersichten in den Januarheften); —

XVIII. 466 und N. Arch. II. 288. — Jacquin, artesische Brunnen in Unterösterreich; Baumg. Zeitschr. VIII. 257. — Partsch, ebendas. 277; Pogg. XXI. 352. — Eine Nachricht von den meisten artesischen Brunnen, die in Frankreich gebohrt worden sind; Dingler's polytechn. Journal XL. Heft 5. S. 395 oder Allg. Anzeiger 1831. Nr. 194. S. 2650. — Nachricht von den vier, im Schloßgarten zu Reibersdorf bei Bittau, im Nov. 1830 gebohrten Brunnen; Allgem. Anz. 1831. Nr. 95. S. 1345; Bergl. auch Pogg. XVI. 592; XXI. 352.

Farbe des Wassers.

Davy Edinb. J. of sc. Nr. XVIII., oder Kasn. Arch. XVII. 223 oder Baumg. V. 238; — Jackson Bibl. univ. XLIII. 420; — Edinb. N. phil. J. 1829. Oct. p. 193.

Eis.

Über das Vorkommen schwimmender Eisberge in ungewöhnlich niedrigen Breiten der nördlichen Halbkugel; Forsburgh, Pogg. XVIII. 624 oder Bibl. univ. 1831. Juin. 154. — Grunbeis und Eiseinseln; Fugt, Bibl. univ. XLI. 201, oder Kasn. Arch. XIII. 59, oder Schweigg. LVII. 408, oder Forr. Not. XXVI. 211. — über Grunbeis; Bergelius, Bergd. Jahresber. 1831. 81. — über Bildung des Grunbeises; Duhamel, Bull. univ. des sc. math. XV. 243. — über Verdunstung des Eises; Schüller, in Naturwiss. Abh. I. 211.

Gasquellen.

Über Quellen entzündlichen Gases in China; Edinb. N. phil. J. 1829. Oct. 108. — Natürliches Ausströmen entzündlichen Gases bei Beblay; Thomson, Edinb. J. of sc. 1829. June 67, oder Bull. un. des sc. math. XII. 142 oder Forr. Notiz. XXV. 177. — Entwicklung von Stickstoffgas aus heißen Quellen; Daubeny, Bibl. univ. XLV. 374. — Kohlensäureentbindung in der Auvergne; Fournet, Bull. univ. des sc. math. XII. 350 oder Forr. Not. XXV. 209.

II. Allgemeine meteorologische Verhältnisse.

Fragmente zu einer Geschichte der Meteorologie von Eiber; Kasn. N. Arch. IV. 287, 420; V. 53. — über Meteorologie der Chinesen; Forr. Not. Nr. 4. XXXIII. 58. — Übersicht der meteorologischen Veränderungen in Vergleich mit den physiologischen Erscheinungen, nach den auf der Königl. Sternwarte zu Paris angestellten Beobachtungen und den neuesten statistischen Untersuchungen entworfen; Guerry, Forr. Not. XXV. 33. — über Bitterungsperioden von Campadius, Schweigg. LVII. 266. —

über den Einfluß des Mondes auf die Witterung; Schöbler's Schrift über diesen Gegenstand, Schweigg. LXIV. 348, Rastn. N. Arch. IV. 17, 162.

Vorherbestimmung der Witterung.

über die Zugvögel als Witterungspropheten; Schöbler, Rastn. N. Arch. IV. 399. — Witterungsanzeigen von Davy; Edinb. phil. J. Nr. 10. p. 387 oder Baumg. Zeitschr. V. 241. — über Wiegmann's Regel; Rastn. Arch. X. 491; XV. 495; XVI. 54. 230 und Rastn. N. Arch. II. 382; IV. 385.

Meteorologische und klimatische Verhältnisse gewisser Orte.

Bericht über die meteorologischen Beobachtungen auf Duperrey's Reise, in Mém. de l'Acad. 1830. T. IX. p. LXXXII. — Zur Klimatologie der Schweiz in Rastn. N. Arch. IV. 126. — Zur Kenntniß der klimatischen Verhältnisse von Grönland und Labrador, aus verschiedenen Berichten der Missionäre Knuth, Mehlhose und Ulbricht in Rastn. N. Arch. IV. 132. — über das Klima von Mullye, von Lütler; Forster's Not. Nr. 7. XXXI. 97. — über die klimatischen Verhältnisse von Gießen; Forst. Not. Nr. 6. XXXI. 81. — über das Klima der Magellansstraße; Ring, Forst. Not. Nr. 8. XXXI. 219. — Siebenhaar's meteorologische Beobachtungen auf der Schneekoppe und meteorologischer Apparat; Rastn. N. Arch. III. 85. — Zur Meteorologie in Oberguinea; Rastner, Rastn. Arch. XVIII. 152.

Allgemeine Witterungsverhältnisse einzelner Perioden.

Beiträge zur Geschichte der Witterung und der Krankheiten im Jahre 1831; Clarus, Rastn. Mittheilungen über die Cholera. 1832. Nr. 65. — über einige meteorologische Eigenthümlichkeiten des Sommers 1831, beobachtet zu Danzig; Rastn. Mittheilungen über die Cholera. 1832. Nr. 61. — über den Winter von 1829 bis 1830 und die meteorologische Constitution dieses letzten Jahres; Baron d'Hombres (Firmas), Bibl. univ. 1831. Janv. 73. oder Baumg. Zeitschr. IX. 430. — über die meteorologischen Erscheinungen der beiden Monate September und October 1831 in Wien; Littrow, Wiener Zeitschr. für Kunst, Lit. u. 1832. N. 6. S. 41, Nr. 7. S. 49, Nr. 8. S. 57. — Denkwürdigkeiten der berühmten Winter von 1740 u. 1809 u. von G. G. v. F. Leipzig bei Barth. 1830.

Meteorologische Beobachtungen, welche das Barometer, Thermometer, Hygrometer, Wind- und Wetterverhältnisse, alle oder wenigstens mehrere dieser Punkte zugleich betreffen.

A. Fortlaufende Beobachtungen.

Für Berlin (vierteljährig), Pogg. Ann. zum Schluß jedes Bandes; — auf dem großen St. Bernhard (monatlich), in der Bibl. univ. zum Schluß jedes Festes, (jährliche Übersichten in den Januarheften); —

dirender Beobachtungen an 7 Orten in Italien). — Ursachen der täglichen Änderung; Dove, Pogg. XXII. 219 (enthält u. a. die Resultate einjähriger Beobachtungen, von 2 zu 2 Stunden am Tage in Kpenrabe ange stellt). — Tafel, enthaltend die Änderungen von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags für viele Orte; Bouvard, Schweigg. LIX. 158. — über die Größe der täglichen Änderung an verschiedenen Orten; Räm g, Schweigg. LIX. 162. — über die Zeit der Wendepunkten an verschiedenen Orten; Räm g, Schweigg. LIX. 159. — Tägliche Barometerschwankungen zu Halle, nach 34jährigen Beobachtungen von 1827 bis 1829; Räm g, Schweigg. LIX. 154; — zu Göttingen; Gunt her, Kastr. R. Arch. IV. 11.

Jährliche Barometerschwankungen.

Monatliche Mittel des Barometer- und Thermometerstandes in der Capstadt, vom Jahre 1819 bis zum Jahre 1826, mitgetheilt von Eich-
tenstein; Pogg. XV. 316. — Monatliche Mittel des Barometerstandes für 19 Orte zwischen 22° S. B. und 52° N. B. liegend*), zusammenge-
stellt von Leopold v. Buch in Pogg. XV. 357. — Monatliche Mittel, Maxima und Minima zu Kasan und Slatoust im Jahre 1828, mitgetheilt von Kupffer in Pogg. XV. 497. — Monatliche Mittel zu Calcutta, nach 8jähriger Beobachtung, von Dove; Pogg. XXIV. 205. — Mittlere Größe der monatlichen Veränderungen zu Stuttgart (10jähr. Beobachtung); Schädler, Schweigg. LXIV. 255. — über Barometerbeobachtungen zu Bågow in den Jahren 1781 bis 1789, von Ernst Rißze. 1831. Stralsund bei Köpfer. 27. S. 4. — Monatliche Mittel der Barometerstände zu Genf und auf dem großen St. Bernhard um 9 Uhr Morgens und 3 Uhr Abends, von den Jahren 1826 und 1827, in Pogg. XXII. 149; von den Jahren 1828, 1829, 1830, Pogg. XXIII. 119. — Monatliche Mittel zu Paris von 1826 bis 1827; Bouvard, Schweigg. LIX. 129. — Gang der monatlichen mittleren Barometeränderungen; Buch, Pogg. XV. 355.

Jährliche Mittel.

Zu Paris von 1816 bis 1826; Bouvard, Schweigg. LIX. 129; — zu Ralmanger und Ullenswang in Norwegen von 1798 bis 1828; Herz-
berg, Edinb. J. of sc. Nr. XVIII. p. 292 oder Baumg. Zeitschr. V. 491 (vgl. auch III. 248). — Mittlerer Barometerstand an der Nord- und Ostsee; Riese, Pogg. XVIII. 130. — Die Höhe Marburgs über dem Meere aus Barometerbeobachtungen, berechnet von Gerling. 1829. 8.

*) Capstadt, Rio Janeiro, St. Pé de Bogota, Savannah, Matanzas, Missisippi, Seringapatam, Bangalore, Madras, Calcutta, Benares, Rhatmanah, Macao, Cairo, Paramatta, Palermo, Zèle de Leon, Mastia, Paris, Berlin.

V. Hygro-Meteorologie.

Hygrometrischer Luftzustand.

Über die von der Windesrichtung abhängigen täglichen und jährlichen Veränderungen der Dampfatmosphäre; Dove, Pogg. XVI. 285. — Über die täglichen und jährlichen Veränderungen der Dampfatmosphäre; Dove, Pogg. XVI. 293. — Über den hygrometrischen Zustand der Luft in einigen Theilen von Asien; Humboldt, Pogg. XXIII. 74. — Außerordentliche Trockenheit der Atmosphäre in Griechenland; Edinb. N. phil. J. 1829. Oct. p. 190. — Hygrometrische Beobachtungen mit dem Psychrometer im nördlichen Asien und an den Ufern des Caspischen Meeres, von Humboldt, in August über die Fortschritte der Hygrometrie. Berlin 1830. S. 25. — Größe der wässerigen Ausdünstung, Feuchtigkeit und Trockenheit der Luft im Jahre 1828 in Tübingen; Schüller, Schweigg. J. LVIII. 208, 209; in Stuttgart im Jahr 1830, Schweigg. LXV. 56. — Resultate hygrometrischer Beobachtungen, ein Jahr hindurch von 2 zu 2 Stunden am Tage mit dem Daniell'schen Hygrometer zu Apenrade angestellt; Pogg. XXII. 222.

Wolken.

Über merkwürdige Wolkenbildungen; Parvey, Brewster's Edinb. J. of sc. 1829. Janv. p. 33, 148, oder Bull. univ. XI. 205, 366, oder Baumg. Zeitschr. VI. 244. — Die Ringelwolke, vielleicht eine eigenthümliche Wolkenform; Kastner, Kastn. N. Arch. I. 386. — Eine merkwürdige elektrische Wolke; Macvicar, Edinb. J. of sc. N. ser. Nr. 1. 177 oder Schweigg. J. LVI. 384.

Nebel und Heerr Rauch.

Über einige Besonderheiten verschiedenartiger Nebel; B. Mons in Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des sciences et belles lettres de Bruxelles. T. IV. 371 oder Bull. des sc. math. et phys. 1830. Janv. 124. — Über die Bedeutung der trocknen heerrauchartigen Nebel nach Wiegmann's Regel, von Schön, Kastn. N. Arch. IV. 385. — Über Heerr Rauch und späte Abendröthe; Brandes in Kastn. N. Archiv. IV. 387. — Über den am 11. August 1831 zu Lemberg gesehenen Höhenrauch; Korosiewicz, Kastn. N. Arch. V. 65. — Zur Kenntniß des Heerr Rauchs; Kastner in f. N. Arch. V. 72. — Über den Heerr Rauch von Schmöger, Kastn. Arch. XVII. 55, XVIII. 462; von Schön, ebend. XVIII. 129; von Wiegmann, Kastn. N. Arch. I. 208; von Hoff, Kastn. N. Arch. II. 89.

Regen.

Einfluß des Mondes auf die Menge und Häufigkeit des Regens; von Schüller in seiner Schrift über den Einfluß des Mondes u. — Starker Regenfall zu Galf of Man am 16. September 1830; Jameson's Edinb.

N. phil. J. 1830. Oct. — Dec. 176. — über die wässerigen Meteore auf den Rißer Alpen in Ungarn; Romy, Baumg. Zeitschr. V. 57, 161. — über Eisregenbildung; Merian, Kastn. N. Arch. IV. 125.

Regenmenge: Zusammenstellung der jährl. Periode der Regenmenge für 10 Gegenden Deutschlands nach vieljähr. Beobachtungen; Schädler, im 9. Abschnitte der Meteorologie der Encyclopädie der Landwirthschaft der Deutschen; Leipzig 1829. 132. — Regenmenge zu Bombay von 1817 bis 1827; Abie, Edinb. J. of sc. 1828. Janv. 367 oder Bull. univ. des sc. math. XI. 367; oder Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 366; — zu Savanah von 1821 bis 1827; Bibl. un. XLI. 33 oder Schweigg. LV. 405; — zu Jopense von 1805 bis 1827; Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 363; — zu Mailand von 1764 bis 1828; Baumg. Zeitschr. VI. 244; — im Staat New-York im Jahr 1829; Brewster's Edinb. J. of sc. 1831. Janv. p. 80; — zu Rochelle von 1777 bis 1793; Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 361; — zu Vallée; Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 362.

Schnee.

über die Ursache der Färbung des Schnees; Bibl. univ. 1829. Oct. p. 172 oder Baumg. Zeitschr. VII. 240. — über den frühesten und spätesten Schnee bei Regensburg; Schmöger, Kastn. N. Arch. IV. 120. — über die Gestalt des Schnees; Quetelet, Bull. univ. 1830. Jun. 442.

Hagel.

über den Hagel und die elektrischen Erscheinungen unserer Atmosphäre von Ideler; Pogg. XVII. 435. — über die Ursachen des Hagelwetters und die dasselbe begleitenden Erscheinungen von Dilmstedt; Schweigg. LXI. 154 oder For. Rot. Nr. 8. XXVIII. — über die Hagelstürme in Indien und die Theorie der Hagelbildung überhaupt; Reßmann, Schweigg. LXIV. 358. — über Bildung des Hagels; Perevoschtschikoff, Bull. univ. XVI. 259. — Bemerkenswerther Hagel zu Overdun; Bibl. univ. XLIV. 336. — Ungewöhnlicher Hagel zu Mastricht, in Correspondance math. et phys. III. p. 95 oder Pogg. XVI. 383. — Ratz in Bezug auf Hagelfall; Bibl. univ. XLIV. 60. — Geräusch vor dem Niederfallen des Hagels von Morier; Schweigg. J. LVI. 393. — Hagelwetter in Indien von Craigie in Jameson's Edinb. N. phil. J. 1831. Jan. pag. 303. — Die königliche Academie zu Paris über Hagelableiter; Mém. de l'Acad. 1830. T. IX. p. LII.

Tromben.

Von einer merkwürdigen, mit einem leuchtenden Meteor verbundenen, Windhose in der Gegend von Trier am 25. Juni 1829; Röggerath, Schweigg. J. LVI. 377. — Tromben auf dem See von Neuschâtel am 9. Juni 1830; Bibl. univ. 1830. Juin. oder Ann. de Ch. et de Ph. XLV. 424.

VI. Verschiedene Bestandtheile der Atmosphäre.

über die Schwankungen des Kohlensäuregehaltes der Atmosphäre; *Saussure*, Ann. de Ch. et de Ph. XLIV. 5 oder *Pogg.* XIX. 391. — Salpetrige Atmosphäre zu Zirkoot; *Pogg.* XXIII 160.

VII. Wind.

über die jährlichen Perioden in den mittlern Windrichtungen Deutschlands; *Schäbler*, *Schweigg.* LV. 135. — über die nächste Ursache gewisser Winde und Stürme; *Mitchell*, *Jameson's Edinb. N. phil. J.* 1831. Jun. — Oct. p. 288. — Einfluß des Mondes auf die Windrichtung; *Schäbler* in *f. Unterf.* über den Einfluß des Mondes 2c. S. 23 und 41. — über den Zug der Stürme im Departement der kleinen Eotze; *Tristan* in *Schweigg.* LVII. 280. — Einfluß der Winde auf den Barometerstand; *Bouvard*, *Edinb. J. of sc.* Nr. 17. p. 77 oder *Baumg. Zeitschr.* V. 243. — über die von der Windrichtung abhängigen Veränderungen des Druckes der trocknen Luft und der Feuchtigkeit darin; *Dove*, *Pogg.* XVI 285; XXIV. 211. — über den Einfluß der Windrichtung auf die mittlere Temperatur; *Dove*, *Pogg.* XXIII. 54. — über *Moussons* und *Passat*; *Dove*, *Pogg.* XXI. 177. — über den *Samum*; *Ramß*, *Schweigg.* LX. 145. — über den *Sirocco*; *Rastner*, *Rastn. N. Arch.* I. 400; *Heineken*, *Brewster's Edinb. J. of sc.* 1829. July. 34. — Betrachtungen über den Nord- und Südwind; *Blanc*, Ann. de Ch. et de Ph. XLV. 421. — Orkane und Sturmfluthen in Südcarolina; *Rastner*, *Rastn. N. Arch.* I. 408. — Bemerkenswerthe Fortpflanzung des Windes bei Albany am 12. Juli 1829; Ann. de Ch. et de Ph. XLV. 420. — Sturm zu Hauenstein im Canton Basel am 16. Juli 1830; *Bibl. univ.* XLV. 209. — Elektrischer Wind; *Blact*, *Journ. of the royal Instit.* Nr. 1. p. 198. — über ein sich im Sturm auflösendes Gewitter am 13. August 1830 zu Dresden; *Campadius*, *Schweigg.* LX. 171. — Ein Sturm auf dem mittelländischen Meere mit Gaster- und Vollurlichtern; *Schweigg.* LVII. 234. — Resultate 9jähriger Windbeobachtungen zu Elberfeld, zusammengestellt von *Förstemann*; *Rastn. N. Arch.* I. 196. — über Stürme zu Köln im Januar 1832; *Günter*, *Rastn. N. Arch.* V. 44.

VIII. Atmosphärische und tellurische Electricität.

Einfluß der Electricität der Erde auf meteorologische Erscheinungen; *Matteucci*, *Schweigg.* LVII. 287; — Abhängigkeit der atmosphärischen

Electricität von der Windrichtung; Schüller, Schweigg. LV. 249. — über Electricität des Windes; Black, Journ. of the royal Instit. 1831. Nr. 1. p. 198. — über Wärmestrahlung und Lufterlectricität auf dem großen St. Bernhard und am Genfer See; de la Rive, Kastn. N. Arch. II. 224. — Merkwürdige elektrische Wolke; Macvicar, For. Notiz. XXV. 100 oder Schweigg. LVI. 390. — Merkwürdige elektrische Erscheinungen auf dem Meere, beobachtet auf dem Schiffe l'Harmonie; For. Not. Nr. 9. XXVII. 137. — Castor- und Polluxlichter bei einem Sturm; Schweigg. LVII. 284; auf dem Vesuv; Morgan, Schweigg. LVII. 405; auf Schiffsmasten, Milne, Edinb. philos. Journ. 1830. Oct. 214 oder Schweigg. LXI. 52. — Bligzdhren bei Blankenburg; Schweigg. LVI. 481; LVII. 206; Ribbentrob's Schrift darüber.

über die Zahl der Gewitter über oder nahe bei Regensburg von 1774 bis 1830; Schmöger, Kastn. N. Arch. IV. 119.

Beschreibung von Gewitter- und Bligzschlägen.

Strehle in Pogg. XIX. 151. — Schmöger in Kastn. N. Arch. I. 384. — Williams in Brewster's Edinb. J. of sc. 1829. Janv. p. 81 oder Bullet. univ. XI. 366. — Trifan in Bullet. univ. XII. 347. — Bryant in Schweigg. J. LXI. 48. — Campadius in Schweigg. LX. 171. — Höggerath in Schweigg. LXIII. 189. — Eiber in Kastn. N. Arch. IV. 59. — Westmann in Kastn. N. Arch. IV. 120. — Huber-Burnand in Bibl. univ. 1831. Aout. p. 443. — Reichenbach Baumg. Zeitschr. X. 74. — Lebauld de Rans in Kastn. N. Arch. III. 87. — Schön, ebenb. IV. 378.

IX. Erdmagnetismus.

Seculäre Veränderungen der Elemente des Erdmagnetismus.

Tabelle über die Variationen der Magnetnadel zu Boston und in den umgebenden Ländern, von 1672 bis 1800; Bull. des sc. math. et ph. XV. 239; oder Edinb. J. of sc. 1829. Janv. p. 22 oder Bibl. univ. 1830. Mars. p. 249. — Eine Zusammenstellung und Vergleichung älterer und neuerer Abweichungs- und Neigungsbeobachtungen zur Bestimmung des jährlichen Ganges der Abweichung und Neigung, nebst einigen Bemerkungen über die magnetische Intensität; auch einer Abweichungs- und Neigungskarte zur Erläuterung; Hansteen, Pogg. XXI. 362.

Tägliche und jährliche Änderung der Elemente des Erdmagnetismus.

über den Gang der täglichen Änderung der horizontalen Intensität; Reich, Pogg. XVIII. 57; Moser und Rieß, Pogg. XIX. 173; —

über den Gang der horizontalen sowohl als der ganzen Intensität zu Spitzbergen, vom 30. Juli bis 9. August (stündliche Beobachtungen am Tage); Forster, Phil. transact. 1829. 303 oder Bull. univ. des sc. math. XIII. 442. — über die regelmäßigen täglichen Veränderungen sämtlicher Elemente im Januar 1831 zu Berlin; Erman, Pogg. XXII. 554. — über den Gang der täglichen Variation der Declination in unserer Hemisphäre, nach den durch Humboldt veranlaßten correspondirenden Beobachtungen in Berlin, Freiberg, Petersburg, Kasan, Nicolajew, nebst Tabellen dieser Beobachtungen; Pogg. XIX. 357. — über gleichzeitige Störungen der täglichen Veränderung der Intensität und Declination; Dove, Pogg. XX. 545. — über tägliche und jährliche Veränderung der Inclination in Petersburg; Pogg. XXIII. 449.

Declination insbesondere.

Tabelle über Declination in Indien; White, Phil. mag. 1829. Août. p. 153 oder Baumg. Zeitschr. VII. 89. — Tabellen über beobachtete Declinationen auf einer Reise durch Rußland, von Erman, Pogg. XVI. 143 und XVII. 335. — über die isogonischen Linien im Jahre 1829; Erman, Pogg. XXI. 119. — über Declination in Berlin; Erman, Pogg. XXIII. 485. — über Declination zu Cracau; Weiße, Schweigg. LXV. 48. — über Declination in Petersburg; Erman, Mém. prés. à l'Acad. impér. des sc. de St. Pétersb. par divers savans. T. I.

Inclination insbesondere.

Tabelle von Beobachtungen über die Inclination, gemacht auf einer Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Caspischen Meere von Alex. v. Humboldt, zwischen 45° bis 60° N. B. und 42° bis 82° D. L. (von Paris); Pogg. XVIII. 335. — Tabelle über Inclination in den Jahren 1798 bis 1803 von $48^{\circ} 50'$ N. B. bis 12° S. B. und $3^{\circ} 2'$ D. L. bis $106^{\circ} 22'$ W. L. (von Paris), in Frankreich, Spanien, den canarischen Inseln, dem atlantischen Ocean, Amerika und der Südsee, von Humboldt; Pogg. XV. 336. — Tabellen über Inclination, beobachtet auf einer Reise durch Rußland; Erman, Pogg. XVI. 143, XVII. 335. — über die isoklinischen Linien im Jahre 1829; Erman, Pogg. XXI. 119. — über Inclination zu London; Sabine, Phil. transact. 1829. P. I. 47 (Auszug in Baumg. Zeitschr. VII. 87). — über Inclination zu Petersburg; Ruppfer, Pogg. XXIII. 449; Erman, Mém. prés. à l'Acad. impér. de St. Pétersb. par divers savans. T. I. — über Inclination in Berlin; Erman, Pogg. XXIII. 485. — Bestimmungen der Inclination Behufs künftiger Vergleichen in den Jahren 1826 bis 1828 von Humboldt für folgende Orte: Reg, Frankfurt a. M., Leptig, Prag, Millischauer, Porphyrschieferberg, Freiberg, Dresden; Pogg. XV. 319.

Intensität insbesondere.

Beobachtungen über die Intensität; Sabine, Quart. J. Nr. XI. 14 oder Baumg. Zeitschr. VIII. 221. — über die Intensität an verschiedenen Orten Deutschlands und der Niederlande; Quetelet, For. Not. Nr. 9. XXVIII. oder Bibl. univ. XLIII. 360. — Intensitätsbeobachtungen in Italien; Quetelet, Pogg. XXI. 153. — Tabellen über Intensität in den Jahren 1798 bis 1803 von $48^{\circ} 50'$ N. B. bis $12^{\circ} 30'$ S. B. und $3^{\circ} 2'$ O. L. bis $106^{\circ} 22'$ W. L. (von Paris), in Frankreich, Spanien, den canarischen Inseln, dem atlantischen Ocean, Amerika und der Südsee, von Humboldt, Pogg. XV. 336. — Tabellen über Intensität, beobachtet auf einer Reise durch Rußland, von Erman, Pogg. XVI. 143, XVII. 334. — über die Intensität zu Kunchal, Copenhagen, Island; Hansen, Magaz. for Naturvid. VIII. p. 314 (Bull. un. 1831. Sept. 148). — über die Abnahme der Intensität des Erdmagnetismus mit der Höhe; Kupffer, Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 103 (Ausg. Schweigg. LVIII. 79.) — über die isodynamischen Linien im Jahre 1829; Erman, Pogg. XXI. 119. — über Intensität in Berlin; Erman, Pogg. XXIII. 485. — über Intensität in Petersburg; Erman, Mém. prés. à l'Acad. impér. de St. Pétersb. par divers savans. T. I.

Einfluß des Nordlichtes auf die Magnetnadel, vgl. S. 119.

X. Atmosphärische Lichterscheinungen.

Ungewöhnliche Lichtbrechung der Atmosphäre; Grunffhant, Edinb. phil. J. Nr. 14. p. 254 oder Baumg. Zeitschr. VII. 249. — Fata Morgana in Mittellindien; For. Not. XXVI. 289 oder Edinb. J. of sc. 1830. Nr. 4. p. 265. — Schatten in der Luft, von Bergen gesehen; Grant, Jameson's Edinb. N. phil. J. 1830. Oct.—Dec. p. 165; Naphterson, For. Not. Nr. 16. XXX. — über späte Abendröthe in Leipzig am 25. September 1831; Brandes, Kastn. N. Arch. IV. 387; an einigen anderen Orten, ebend. IV. 391, V. 128. — Lichtmeteore im Jahre 1829 in New-York; Brewster's Edinb. J. of sc. 1831. Jan. 80; — zu Plymouth, Brewst. J. of sc. 1830. Nr. 4. p. 371; — zu Stradaub am 8. Januar 1829; Bull. univ. des sc. math. 1830. Mars. p. 226; — zu Augsburg am 13. November 1831; Kastn. N. Arch. IV. 285. — Über einige atmosphärische Lichterscheinungen; Stokes, Phil. mag. 1829. Dec. 416. — über die späte Dämmerung im Sommer 1831; Dfann, Kastn. N. Arch. V. 129.

Nebensonnen, Nebenmonde, Höfe u. dergl. :

Wahrnehmungen von Nebensonnen, Nebenmonden und Halo's zu Göttingen, nebst einigen Bemerkungen über solche Erscheinungen überhaupt; Hoff,

Kastn. Arch. XVI. 57, XVII. 478. — Halo's, Nebensonnen und Nebenmonde im Jahre 1830; Hoff, Kastn. N. Arch. II. 361. — Erklärung der Hölle und Ringe um leuchtende Körper; Moser, Pogg. XVI. 67. — über eine in Danzig beobachtete Nebensonne mit Hölle und Ringen; Streblitz, Pogg. XVIII. 617. — Nebensonne am 1. Februar 1831 zu Wedford gesehen; Phil. mag. 1831. March. 232. — über einen Lichtkreis im Januar 1832 zu Glinz; Günther, Kastn. N. Arch. V. 44.

Regenbogen.

über die Theorie des Regenbogens; Kinger, J. of the royal Inst. 1831. Nr. 2. 281. — Arago Ann. de Ch. et de Ph. XXXIX. 430 oder Pogg. XV. 537; Brewster in Brewst. Edinb. J. of sc. 1829. Janv. 163 oder Bull. univ. XI. 367; Rämig, Schweigg. LVI. 387; Meyer, Kastn. N. Arch. II. 391. — Jameson's Edinb. N. phil. Journ. 1831. Jan. p. 310.

Nordlicht im Allgemeinen.

über die Erscheinung des Nordlichtes und seine Höhe über der Erdoberfläche; Farquharson, Philos. transact. 1829. 103 oder Baumg. Zeitschr. VII. 242. — über Entstehung des Nordlichtes; ein Ungenannter, Bibl. univ. 1830. Mars. 110 oder Baumg. Zeitschr. VIII. 110. — über das Nordlicht, mit Berechnungen, um die Lage und den Zug (course) der Bögen im Verhältniß zur Erdoberfläche zu bestimmen; Brewster's Edinb. phil. J. 1831. July. 23. — Erinnerung an gewisse nordlichtartige vulkanische Erscheinungen; Kastner, Kastn. N. Arch. III. 84. — Dietmar's Schrift über die Polarscheine. — über den Einfluß der Nordlichter auf die Magnetnadel s. Literatur S. 119.

Übersichten von Nordlichtern.

Im Jahr 1830 in Schottland; Jameson's Edinb. N. phil. J. 1830. Oct. — Dec. 177. — Übersicht von Nordlichtern in den Jahren 1828 bis 1830; Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 351, XLV. 403. — Verzeichniß der vom Juli 1830 bis April 1831 zu Christiania beobachteten Nordlichter; Hansteen, Pogg. XXII. 534. — Angabe der Nordlichter im Jahr 1830 von vielen Orten im Staate New-York; Brewster's Edinb. phil. J. 1830. Nr. 10. p. 259. — Angabe der Nordlichter im December 1830 an verschiedenen Orten; Kastner, Kastn. N. Arch. II. 376. — Angabe der Nordlichter im December 1829, Januar und Februar 1830 zu Alford; Farquharson, Philos. transact. 1830. P. I. p. 95. — Angabe der Nordlichter vom 19. April 1830 bis 11. Jan. 1831 zu Wedford; Whistler, Phil. mag. 1831. April. 393 (Bull. univ. 1831. Sept. p. 145).

Beschreibungen einzelner Nordlichter.

Zu Perth; Edinb. J. of sc. 1829. Jan. 179; — am 8. September 1827 in Augusta; Sawboin, Bibl. univ. 1830. Dec. 425 oder Gror.

Not. Nr. 9. XXVIII.; — am 1. und 26. December 1828 und 29. September 1828 zu Manchester; Blackwall, Phil. mag. 1829. Febr. 153; — am 23. März 1829 in Biggleswade; Maclear, Phil. mag. 1829. Mai. 373; — am 19. und 20. December 1829; Doue, Pogg. XX. 333; — am 5. und 6. Mai 1830 zu Petersburg; Kupffer, Pogg. XVIII. 611; — am 5. October 1830 in Gosport; Phil. mag. 1830. Dec. 465; — am 20. October 1830 in London; Phil. mag. 1830. Oct. 316; — am 7. Januar 1831 s. nachher; — im März 1831 zu Schled in Curland (Blaues Nordlicht); Büttner, Rastn. N. Arch. III. 76; — am 9. März 1831 zu Fayetteville (anomaler Bogen); Pogg. XXIII. 158; — am 19. April 1831 zu Berlin und am 20. April 1831 zu Rißingen; Rastn. N. Arch. III. 85.

über das Nordlicht am 7. Januar 1831 insbesondere.

Reichhaltige Zusammenstellung von Beobachtungen an vielen Orten; Pogg. XXII. 434, 497; — eine andere Zusammenstellung in Rastn. N. Arch. III. 1 ff., 53 ff.; vergl. ferner Rastn. N. Arch. IV. 7, 134; Schweigg. LXI. 136, 266; Den's Isis 1831. S. 567; Baumg. Zeitfchr. IX. 212; J. of the royal Instit. 1831. Nr. 2. p. 262; Phil. mag. 1831. March. 233.

über Irrellichter, Blesson, Rastn. N. Arch. V. 29.

über Sternschnuppen. Modell zu Bahnen von Sternschnuppen; Boguslawsky, Rastn. N. Arch. V. 126.

XI. Temperaturverhältnisse.

über die Frage, ob vor der Sündfluth ein gleichförmiges Klima auf der Erde obwaltete; H—u, Jam. Edinb. N. phil. J. 1830. Jan.—Avril. 320. — über Veränderungen des Klima's im Laufe der Jahrhunderte; Jamel. Edinb. N. phil. J. 1831. Jul.—Oct. 333. — über das frühere Klima der arktischen Regionen; Fleming, Edinb. N. phil. J. 1829. Oct. p. 65. — Daß Klima und sonstige Naturverhältnisse nur einen geringfügigen Einfluß auf den Charakter der Völker haben; Schouw, Forcip's Notiz. XXIII. 113. — Betrachtungen über die Temperatur in einigen Theilen von Asien; Humboldt, Pogg. XXIII. 74. — über die Temperatur des Erdballes; Brewster, For. Not. Nr. 16. und 17. XXX. (Einiges daraus auch Pogg. XXI. 323). — über Quellen- und Bodentemperatur; Kupffer, Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 372. — über das Klima der südlichen Hemisphäre; Chanticleer, Edinb. N. phil. J. 1829. Oct. p. 191. — über die Temperaturverhältnisse der Schwäbischen Alp; Kern, Rastn. N. Arch. IV. 20. — über das Klima von Coolthoo und Kotguth;

Patriz Gerhards, *For. Rot.* XXIII. 65. — über das Klima von Senaar; Brocchi, *For. Rot.* XXV. 275.

über Temperaturabnahme mit der Höhe; Guérin, *Ann. de Ch. et de Ph.* XLII. 429; Salz, *Bibl. un.* 1830. Juin. 127; Ruppfer, *Ann. de Ch. et de Ph.* XLII. 110.

über Temperatur im Innern der Erde vgl. S. 141 dieses Bandes.

über den Gang der Temperatur im Jahre (enthält u. a. die monatlichen Mittel von 11 Orten); Kämk, *Schweigg.* LV. 377. — über den Einfluß der Windesrichtung auf die mittlere Temperatur der Orte; Dove, *Pogg.* XXIII. 54. — über Vorausbestimmung strenger Fröste und Winterlätze; Schön, *Kastn. N. Arch.* II. 382, 385. — Mittlere monatliche Beobachtungen für vier Stunden des Tages zu Bombay im Jahr 1827; Abie, *Brewst. Edinb. J. of sc.* 1829. Oct.—Avril. p. 17. — Monatliche Mittel der Thermometer- und Barometerstände in der Capstadt von den Jahren 1819 bis 1826; Lichtenstein, *Pogg.* XV. 316. — Mittlere Wärme an der Oberfläche der Erde zu Düsseldorf; Benzenberg, *Kastn. N. Arch.* V. 108. — Temperatur des Quellwassers zu Gayetteville in Nordamerika; Field, *Amer. J.* XV. 190 oder *Kastn. Arch.* XVII. 254. — Tägliche Maxima und Minima des Thermometerstandes von 1758 bis 1777 in Frankfurt; Meermann, *Schweigg.* LVII. 257. — Mittlere jährliche Temperatur zu Funchal; Heineken, *Brewst. Edinb. J. of sc.* Vol. I. Nr. 1. 1829. July. — Mittlere Temperatur zu Kasan; Chersakof (Beobachtungen vom 1. November 1827 bis 1. November 1828) und Bronner (vom Jahre 1814 bis 1827), *Ann. de Ch. et de Ph.* XLII. 368. — Mittlere Thermometerstände zu Malmangar und Ullensmang in Norwegen von 1798 bis 1828; Perzberg, *Edinb. J. of sc.* XVIII. 292 oder *Baumg. Zeitschr.* V. 491. — über die mittlere Temperatur von 29 verschiedenen Orten im Staate Neu-York im Jahre 1829; Brewst. *Edinb. J.* 1831. Jan. p. 77. — über die mittlere Temperatur von 34 verschiedenen Orten im Staate Neu-York im Jahre 1830; Brewster's *Edinb. J.* 1831. Oct. p. 255. — Mittlere Temperatur zu Penzanse nach 7jährigen Beobachtungen; Gibby, *Edinb. J. of sc.* Nr. 17. oder *Baumg. Zeitschr.* V. 493. — Minima der Temperatur im Winter 1829 bis 1830 an verschiedenen Orten; Schön, *Kastn. N. Arch.* II. 380. — Höchste Temperatur im Sommer 1830 und 1831 zu Würzburg und späte Himmelsröthe; Dsann, *Kastn. N. Arch.* II. 367; IV. 376. — Die 10 heißen Tage des Sommers 1830 zu Siengen; *Kastn. N. Arch.* II. 82. — Die Erlanger Temperaturen der letzten Januarwochen in den Jahren 1820 bis 1831; Rüttlinger, *Kastn. N. Arch.* II. 364. — über die kalten Tage im Februar 1829 an vielen Orten; *Kastn. Arch.* XVI. 54, 230, 500; XVII. 88, 486; XVIII. 60. — über bemerkenswerthe Fröste zu England und an anderen Orten; *Bull. univ. des sc. math.* 1830. Janv. 126. — über die Temperatur der letzten Woche des Januar und der ersten des Februar im Jahre 1830 zu Yverdon; Huber-Burnand, *Bibl. univ.*

XLIII. 355. — über eine außerordentliche Kälte zu Yverdon, in der Nacht vom 25. zum 26. December; Huber-Burnand, Bibl. univ. XLVI. 100. — Witterungsbeobachtungen, besonders thermometrische, im Winter 1830 zu Gießen, Gotha, München, Würzburg, Regensburg; Kastn. N. Arch. I. 194, 207, 209, 215, 380. — Kälte in Südafrika im Jahre 1829; Kastn. N. Arch. II. 98. — über die kalte und regnichte Witterung des Jahres 1829; Bibl. univ. XLIII. 155.

Literatur neuerer Abhandlungen über Gegenstände der mathematischen Physik und Mechanik.

Ich habe mich im Folgenden nicht darauf beschränkt, die seit 1829 erschienenen Abhandlungen dieser Art anzuführen, sondern man wird überhaupt die in folgenden periodischen Schriften enthaltenen oder angezeigten Abhandlungen hier angezeigt finden.

Mémoires de la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut de France. T. I. — XIV.

Mémoires de l'Académie royale des sciences de l'Institut de France. T. I. — X.

Mémoires présentés par divers savans à l'Institut. T. I. — II.

Journal de l'école polytechnique. Cahier XIV. — XX.

Annales de mathématiques par *Gergonne*. T. I. — VIII. und T. XIX. — XXI.*).

Annales de Chimie et de Physique. T. I. — XLVIII. (mit Ausnahme von XXXIV., XXXV. und XXXVI.).

Bulletin universel des sciences mathématiques et physiques. 1825 bis zum Novemberheft 1831.

Bulletin de la société philomatique. 1815 bis 1826.

Exercices de mathématiques, par *Cauchy*. Livraison 1. — 51.

Philosophical transactions. P. I. 1824 bis 1831.

Commentationes soc. Gott. recent. T. I. — VI.

Abhandlungen der Berliner Akademie aus den Jahren 1804 bis 1828.

Poggendorff's Annalen. Band I. bis XXIV.

Baumgartner's Zeitschrift. Band I. bis X.

Anderer benutzte Zeitschriften, in denen sich bloß wenig Ausbeute gefunden oder von denen ich bloß einzelne Bände zu Gesicht bekommen konnte,

*) Die Literatur aus den Bänden IX. bis XVIII. hoffe ich in der nächsten Lieferung mittheilen zu können; gegenwärtig konnte ich diese Bände nicht erhalten.

sind hier nicht mit angeführt. Durch die Benutzung des Bulletin universel hat übrigens diese Literatur eine viel größere Vollständigkeit erlangt, als es nach der vorstehenden Aufzählung der direct von mir durchgesehenen Zeitschriften scheinen möchte, da sich darin die Abhandlungen vieler ausländischen Zeitschriften, die mir selbst nicht zu Gebote standen, angezeigt finden. Doch hat dies den Übelstand mit sich geführt, daß man mehrere Abhandlungen, die eigentlich englisch oder italienisch abgefaßt sind, unter französischen Titeln angezeigt finden wird.

Ungeachtet der Mangelhaftigkeit dieser Literatur, die durch den in Leipzig Statt findenden Mangel einer hinreichend vollständigen öffentlichen Bibliothek entschuldigt werden mag, hoffe ich doch, daß dieselbe nicht ganz nutzlos sein wird, da wenigstens keine der wichtigeren neueren physikalisch-mathematischen Abhandlungen darin fehlen dürfte, und ich durch eigene Erfahrung weiß, wie wünschenswerth es oft ist, nur den Ort von Untersuchungen zu wissen, die theils wegen der geringen Zugänglichkeit der Quellen, theils des schweren Verständnisses halber wenig verbreitet und nur selten angeführt werden. In späteren Lieferungen dieses Repertoriums hoffe ich übrigens dieser Literatur noch mehr Vollständigkeit und Ausdehnung zu geben.

Der Kürze halber bezeichne ich im Folgenden das Bulletin de la société philomatique durch Bull. phil.; die Mém. de la classe des sciences math. et phys. de l'Institut durch Mém. de math. de l'Inst.; die Mém. de l'Académie royale des sciences de l'Inst. aber durch Mém. de l'Acad. — Die übrigen Abkürzungen wird man von selbst leicht zu deuten wissen.

Übersicht der Anordnung.

I. über verschiedene Gegenstände der reinen Mathematik, von besonderer Anwendung auf physikalische Probleme.

- 1) Bestimmte Integrale;
- 2) Partielle Differenzialgleichungen;
- 3) Entwicklung der Functionen in periodische Reihen und Summation derselben;
- 4) Mittlere Werthe und Wahrscheinlichkeitsrechnung;
- 6) Variation der willkürlichen Constanten.

II. Allgemeine Principien und Methoden der Mechanik.

III. Verhältnisse und Beziehungen der Kräfte im Allgemeinen. Allgemeine Gleichgewichts- und Bewegungsgleichungen.

IV. über Rotation und Trägheitsaren.

V. Gleichgewicht und Bewegung, mit Bezug auf den physikalischen Zustand der Körper im Allgemeinen. Druck, Zug im Allgemeinen.

VI. Gleichgewicht und Bewegung, Druck und Zug fester Körper.

VII. Gleichgewicht und Bewegung elastischer und biegsamer fester Körper insbesondere. Schallschwingungen fester Körper.

- VIII. Attraction und Repulsion.
- IX. Bewegungen der Himmelskörper.
- X. Gestalt der Himmelskörper.
- XI. über verschiedene Verhältnisse des Planetensystemes.
- XII. Bewegung schwerer Körper, Fall, Schwerpunkt.
- XIII. Pendel insbesondere.
- XIV. Stoß fester Körper.
- XV. Verschiedene Probleme der Statik fester Körper.
- XVI. Verschiedene Probleme der Dynamik fester Körper.
- XVII. Gleichgewicht, Druck tropfbarer flüssiger Körper.
- XVIII. Capillarität insbesondere.
- XIX. Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten und schwimmender Körper.
- XX. Gleichgewicht, Expansivkraft elastisch-flüssiger Körper.
- XXI. Bewegung, Schallschwingungen elastisch-flüssiger Körper.
- XXII. Verschiedene Gegenstände der angewandten Mechanik.
- XXIII. Electricität und Galvanismus.
- XXIV. Magnetismus.
- XXV. Elektromagnetismus.
- XXVI. Licht.
 - 1) Allgemeine Untersuchungen über das Licht.
 - 2) Undulationstheorie, Interferenzen.
 - 3) Brennpunkte, kausische Curven, gleichbeleuchtete Einten.
 - 4) Atmosphärische Lichterscheinungen, atmosphärische Refraction.
 - 5) Verschiedene specielle Gegenstände der Lichtlehre.
- XXVII. Wärme.
 - 1) Allgemeine Untersuchungen.
 - 2) Temperatur des Erbkörpers und damit in Beziehung stehende Probleme.
 - 3) Temperatur der Gase.
 - 4) Verschiedene die Wärme betreffende Probleme.
- XXVIII. Verschiedenes.

I. Über verschiedene Gegenstände der reinen Mathematik, von besonderer Anwendung auf physikalische Probleme.

1. über bestimmte Integrale.

- 1) Abel, Crelle J. II. 22.
- 2) Cauchy, Exerc. de math. T. I. p. 54, 92, 95, 211; II. 112, 233.
 — Mém. prés. par divers savans. Tom. I. 1827. p. 599 — 784. —
 J. de l'école polyt. Cah. 19. p. 571. — Bull. univ. des sc. math.
 III. 214. — Gergonne's Annales XVI. Nr. 4.; XVII. Nr. 3. —

f. Leçons de calcul infinitif. p. 130. — f. Mém. sur les intégrales déf. etc. Paris 1825. — Bull. philom. 1822, p. 161—174.

3) Defflers, Bull. phil. 1819. p. 161—166.

4) Dirichlet, Crelle J. IV. 94. (Ausg. Bull. univ. XI. 262—264).

5) Jacobi, Crelle J. II. 1.

6) Laplace, Mém. math. de l'Inst. T. XI. 1810. P. I. p. 279—347.
— J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 235.

7) Legendre, Mém. math. de l'Institut. T. X. p. 416—509.

8) Poisson, Mém. de l'Acad. T. VI. p. 570—602. (Ausg. im Bull. univ. X. 116.) — J. de l'école polyt. T. IX. cah. 16. p. 215—246.
— T. X. cah. 17. p. 612—631. — T. XI. cah. 18. p. 295—341.
— T. XII. cah. 19. p. 476—501 (Ausg. im Bull. phil. 1822. 134. Ausg. im Bull. univ. I. 332).

2. über partielle Differenzialgleichungen.

9) Ampère, J. de l'école polyt. T. XI. cah. 17. p. 549—611. — T. XII. cah. 18. p. 1—138.

10) Briffon, J. de l'école polyt. cah. XIV. p. 191—261.

11) Cauchy, J. de l'école polyt. T. XII. cah. 19. p. 510—589. — T. XIII. cah. 20. p. 297—309. — Bull. philom. 1819. p. 10—21; 1821. 101—112, 145—152; 1822. p. 49—54. — Bull. univ. IV. p. 71—75; XIII. 273—279.

12) Cytelwein, Berl. Abh. 1824. S. 53—82.

13) Jacobi, Crelle J. II. 317.

14) Laplace, Mém. de l'Acad. des sc. 1779. — J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 235.

15) Poisson, Mém. de l'Acad. royale T. III. 1818. p. 121—126. — J. de l'école polyt. T. XII. cah. 19. p. 215—243; 464—476. — (Ausg. Bull. un. III. 81—83). — Bull. philom. 1815. p. 183—185; 1817. p. 180—183; 1822. p. 81—85).

3. Entwicklung der Functionen in periodische Reihen und Summation derselben.

16) Cauchy, Mém. de l'Acad. T. VI. p. 603—612.

17) Defflers, Bull. philom. 1819. p. 161—166.

18) Dirksen, Berl. Abh. 1827. S. 85—113.

19) Poisson, J. de l'école polyt. T. XI. cah. 18. p. 417—489. — T. XII. cah. 19. p. 145—162, 404—464.

4. über mittlere Werthe und Wahrscheinlichkeitsrechnung.

20) Cauchy, Sur le système des valeurs, qu'il faut attribuer à deux éléments déterminés par un grand nombre d'observations, pour que la plus grande de toutes les erreurs, abstraction faite du signe, devienne un minimum; Bull. phil. 1824. p. 92—99.

- 21) Cauchy, Sur le système de valeurs, qu'il faut attribuer à divers éléments, déterminés par un grand nombre d'observations, pour que la plus grande des erreurs, abstraction faite du signe, devienne un minimum; J. de l'école polyt. T. XIII. cah. 20. p. 175.
- 22) Fourier, Sur les résultats moyens d'un grand nombre d'observations et sur les erreurs de mesures; Bull. un. II. p. 88; XIII. 89.
- 23) Gauß, Theoria combinationis observationum minimis erroribus obnoxiae etc. in 4°. Pr. 12 Gr. Gött. Dietrich.
- 24) Gauß, Supplementum Theoriae comb. etc.; comment. Gott. Rec. VI. p. 57—98.
- 25) Hauber, über Bestimmung der Genauigkeit der Beobachtungen; Baumg. Zeitschr. V. 286, 406.
- 26) Hauber, Theorie der mittleren Werthe; Baumg. Zeitschr. VIII. 25, 147, 295, 443; IX. 302; X. 425.
- 27) Ivory, Sur la méthode des moindres carrés; Phil. mag. LXV. p. 3, 81 et 161. (Auszug Bull. univ. V. 97); ibid. 1826. Sept. 161. (Auszug Bull. univ. VII. 96).
- 28) Legendre, Méthode des moindres carrés, pour trouver le milieu le plus probable entre les résultats de diff. observ.; Mém. math. de l'Inst. T. XI. P. II. p. 149—154).
- 29) Littrow, Bemerkungen zum praktischen Gebrauche der Wahrscheinlichkeitsrechnung; Baumg. IX. 433.
- 30) Poisson, Sur la probabilité des résultats moyens des observations; Connaiss. du temps pour 1827. p. 273. (Auszug Bull. univ. III. p. 208—211; XI. 335—341; XIII. 266—271).

5. über die Variation der willkürlichen Constanten.

- 31) Lagrange, Sur la théorie générale de la variation des constantes arbitraires dans tous les problèmes de la mécanique; Mém. math. de l'Inst. T. IX. 1808. p. 257—302.; T. X. p. 343—352.
- 32) Ostrogradsky, Note sur la variation des constantes arbitraires; Mém. de St. Péterb. 6me ser. T. I. livr. 1. 1850. (Auszug Bull. univ. XIV. p. 2—5).
- 33) Poisson, Sur la variation des constantes arbitraires dans les questions de mécanique; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 266. — Mém. de l'Acad. royale. T. I. 1816. p. 1. (Auszug Bull. phil. 1816. p. 140).

II. Allgemeine Principien und Methoden der Mechanik.

- 34) Binet, Sur les principes généraux de dynamique, et en particulier sur un nouveau principe de mécanique générale; J. de l'école polyt. T. XII. cah. 19. p. 163. (Auszug Bull. univ. p. 79).

- 35) Cauchy, Mémoire sur l'application du calcul des résidus à la solution des problèmes de physique mathématique. Paris 1827.
 - 36) Cauchy, Second mémoire sur l'application du calcul des résidus aux questions de physique mathématique; Mém. de l'Acad. Tom. VII. p. 463.
 - 37) Cauchy, Sur un nouveau principe de mécanique; Bull. univ. XII. 116—122.
 - 38) Dubuat, Doutes et réflexions sur quelques principes fondamentaux de la mécanique rationnelle; Ann. de Gerg. VI. 201.
 - 39) Gauß, Neues Princip der Mechanik; Grelle J. IV. Heft 3. (Inß. Bull. univ. XII. 304).
 - 40) Möbius, Der barycentrische Calcul, in 8°, 454 S., Leipzig 1827. Barth. (Inß. Bull. un. IX. p. 77—80).
 - 41) Schubert, Reflexions sur les principes de la mécanique. (Handelt bloß vom Princip der Proportionalität der Kräfte zu den Geschwindigkeiten); Mém. de St. Pétersb. T. X. p. 57. (Auszug Bull. univ. IX. p. 68—74).
-
- 42) Gournot, Extension du principe des vitesses virtuelles au cas, où les conditions de liaison du système sont exprimées par des égalités; Bull. univ. VIII. 165.
 - 43) Navier, Détails historiques sur l'emploi du principe des forces vives dans la théorie des machines et sur diverses roues hydrauliques; Ann. de Ch. et de Ph. IX. 146—159.
 - 44) Petit, Sur l'emploi du principe des forces vives, dans le calcul de l'effet des machines; Ann. de Ch. et de Ph. VIII. 287—305.
 - 45) Power, Démonstration générale du principe des vitesses virtuelles; Transact. of the Cambridge phil. soc. T. II. p. 273, (Ausg. Bull. univ. X. 123).
-

II. Verhältnisse und Beziehungen der Kräfte im Allgemeinen. Allgemeine Gleichgewichts- und Bewegungsgleichungen.

- 3) Cauchy, Recherches des équations généraux d'équilibre pour un système de points matériels assujétis à des liaisons quelconques; Exerc. de math. II. 1. (Auszug Bull. univ. VIII. 20).
- 4) Cauchy, Sur les mouvemens, que peut prendre un système invariable, libre ou assujéti à certaines conditions; Exerc. de math. II. 70.
- 5) Chasles, Mémoire de géométrie pure sur les systèmes de force, et le système d'aires planes etc.; Quatrelet Corresp. VI. livr. 2. (Inß. Bull. univ. XIII. 246—249).

- 49) Chasles, Note sur les propriétés généraux du système de deux corps semblables entr'eux et placés d'une manière quelc. dans l'espace et sur le déplacement fini, ou infiniment petit, d'un corps solide libre; Bull. univ. XIV. 321—326.
 - 50) Cauchy, Sur les momens linéaires; Exerc. p. 66. (Zñh. Bull. univ. VI. 266).
 - 51) Cauchy, Sur les momens linéaires de plusieurs forces appliquées à différens points; Exerc. p. 117. (Ausg. Bull. un. VII. 11).
 - 52) Cauchy, Sur les conditions d'équivalence de deux systèmes de forces appliqués à des points liés invariablement les uns aux autres; Exerc. p. 151. (Ausg. Bull. univ. VII. 11. p. 12).
 - 53) Dirksen, über die Bedingungen des Gleichgewichts eines freien materiellen Punktes; Verh. Abh. 1826. S. 271.
 - 54) Levy, Sur quelques propriétés des systèmes de forces; Quetelet's Corresp. math. T. VI. livr. 4. Nr. 10. (Zñh. Bull. univ. 1831. Juillet. p. 12).
 - 55) Möbius, Entwicklung der Bedingungen des Gleichgewichts zwischen Kräften, die auf einen freien festen Körper wirken; Crelle J. VII. 205.
 - 56) Poisson, Sur une propriété des équations généraux du mouvement; Bull. philom. 1826. p. 109—112.
 - 57) Poisson, Sur le mouvement d'un système de corps, en supposant les masses variables; Bull. philom. 1819. p. 60—62.
-
- 58) Binet, Sur la composition des forces et sur la composition des momens; J. de l'école polyt. T. X. cah. 17. p. 321.
 - 59) Cauchy, Sur la résultante et les projections de plusieurs forces appliquées à un seul point; Exerc. de math. I. 29. (Zñh. Bull. un. VI. 101).
 - 60) Chasles, Sur quelques propriétés des centres des moyennes distances des points d'application de plusieurs forces; Quet. Corresp. math. T. V. livr. 2. (Zñh. Bull. univ. XI. 324).
 - 61) King, Nouvelle démonstration du parallélogramme des forces; Transactions of the Cambridge Phil. soc. T. II. P. I. p. 45. (Ausg. Bull. un. VII. 223; vgl. auch ibid. VIII. 238).
 - 62) Fionb, Nouvelle démonstration de la composition des forces; Phil. J. Dublin. Nr. 1. p. 41. (Ausg. Bull. univ. V. 313).
 - 63) Paucker, Neuer statisch-geometrisch-elementarer Beweis des Parallelogrammes der Kräfte. Jahresverh. der Kurländ. Gesellsch. 1819. I. 238. (Zñh. Bull. un. IV. 85).
 - 64) Poinso, Sur la composition des momens en mécanique; Mém. de l'Acad. T. VII. p. 557.
 - 65) Poinso, Notes sur la composition des momens en mécanique; Bull. un. VIII. p. 230—237; IX. p. 74—77.
 - 66) Poinso, Sur la composition des momens et des aires; J. de l'école pol. cah. XIII. p. 191 ou Statique par Poinso. 317. 4e. édit.

- 67) Poincaré, Sur les momens linéaires; Bull. un. VII. p. 224—226.
- 68) Poisson, Note sur la composition des momens; Bull. univ. VII. p. 357—358; VIII. 338—339.
- 69) Kralls, Über Zusammensetzung der Kräfte als mathematische Aufgabe betrachtet; Berl. Abh. 1804—11. S. 161—187.
- 70) Ballez, Démonstration du parallélogramme des forces; Ann. de math. XX. 292.

IV. Über Rotation und Trägheitsaren*).

- 71) Ampère, Sur quelques nouvelles propriétés des axes permanens de rotation des corps et des plans directeurs de ces axes; Mém. de l'Acad. T. V. 1821—22. p. 86—152.
- 72) Binet, Sur la théorie des axes conjugués et des momens d'inertie des corps; J. de l'école polyt. T. IX. cah. 16. p. 41.
- 73) Cauchy, Sur les momens d'inertie; Exerc. de math. II. 93.
- 74) Cauchy, Mémoires sur l'équation, qui a pour racines les momens d'inertie principaux d'un corps solide, et sur diverses équations du même genre; Mém. de l'Acad. T. IX. p. 111.
- 75) Legendre, Du mouvement de rotation d'un corps solide autour d'un point fixe, in f. Traité des fonctions elliptiques et des intégrales eulériennes.
- 76) Poisson, Variations des constantes arbitraires, relatives au mouvement de rotation; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 314.
- 77) Poisson, Sur un cas particulier du mouvement de rotation des corps pesans; ibid. T. IX. cah. 16. p. 247.
- 78) Poisson, Note sur le plan invariable; Bull. univ. IX. 361—366.
- 79) Poisson, Variations des constantes arbitraires relatives au mouvement de rotation; J. de l'école polyt. T. VIII. p. 314—344.
- 80) Bessel, Sur le mouvement de rotation des corps; Transactions of the Cambridge Philos. soc. T. II. P. I. p. 11. (Sitz. Bull. un. VII. 169).

V. Über Gleichgewicht und Bewegung, mit Bezug auf den physikalischen Zustand der Körper im Allgemeinen. Druck und Zug.

- 81) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'un système de points matériels sollicités par des forces d'attraction ou de répulsion mu-

*) Vergl. hiebei IX.

- uelle; Exerc. de math. III. p. 188. (Inhalt Bull. univers. XI. p. 112—114).
- 82) Cauchy, De la pression ou tension dans un système de points matériels; ibid. p. 213. (Inh. Bull. un. XII. 11).
- 83) Cauchy, Sur les équations différentielles d'équilibre ou de mouvement pour un système de points matériels sollicités par des forces d'attraction ou de repulsion mutuelle; Exerc. de math. IV. 129.
- 84) Ostrogradsky, Méthode simple de trouver les équations de l'équilibre et du mouvement des corps solides, considérés comme composés de molécules disjointes; Bull. univ. XIV. 249—255.
-
- 85) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement intérieur des corps considérés comme des masses continues; Exerc. de math. IV. p. 293.
- 86) Cauchy, Sur les div. méth., à l'aide desquelles on peut établir les équations, qui représentent les lois d'équilibre ou le mouvement intérieur des corps solides ou fluides; Bull. univ. XIII. 169—176.
- 87) Cauchy, Sur la division d'une masse solide ou fluide en couches homogènes; Exerc. de math. III. p. 121.
- 88) Cauchy, Sur la condensation et la dilatation des corps solides; Exerc. de math. II. p. 60. (Ausg. Bull. un. XI. 174—178).
- 89) Cauchy, Sur quelques théorèmes relatifs à la condensation ou à la dilatation des corps; Exerc. de math. III. 237.
- 90) Cauchy, Sur les corps solides ou fluides, dans lesquels la condensation ou dilatation linéaire est la même en tous sens autour de chaque point; Exerc. de math. IV. p. 214. (Ausg. Bull. univ. XIII. 88—89).
- 91) Cauchy, Sur les relations, qui existent dans l'état d'équilibre d'un corps solide ou fluide, entre les pressions ou tensions et les forces accélératrices. Exerc. de math. II. 108.
- 92) Poisson, Sur les équations générales de l'équilibre et du mouvement des corps solides, élastiques et fluides; J. de l'écol. polyt. T. XIII. cah. 20. p. 1. (Ausg. Bull. univ. XIII. p. 394—412 ober Ann. de Ch. et de Ph. XLII. 145—170).
- 93) Béné, Sur les pressions. Bull. univ. IX. 7—22.

VI. Gleichgewicht und Bewegung. Druck und Zug fester Körper. per im Allgemeinen *).

- 94) Anderson, Mathematical Investigation of the motion of solids on surface etc.; Transact. of the Amer. phil. soc. Vol. III. P. II. N. ser. (Inh. Bull. un. XI. 178—180).

*) Vergl. hierbei V. und VII.

- 95) Cauchy, Sur les pressions ou tensions, supportées en un point donné d'un corps solide par trois plans perp. entre eux. Exerc. de math. IV. p. 30.
- 96) Cauchy, Sur la relation, qui existe entre les pressions ou tensions supportées par deux plans quelconques en un point donné d'un corps solide; Exerc. de math. p. 31. (Muséum Bull. univ. XI. 333—384).
- 97) Cauchy, De la pression ou tension dans un corps solide; Exerc. de math. II. p. 42. (Jnh. und Musé. Bull. univ. VIII. 22; XI. 8).
- 98) Cauchy, Addition à l'article précédent; ibid. 57.
- 99) Cauchy, Usage des momens linéaires dans la recherche des équations d'équilibre d'un système invariable entièrement libre dans l'espace; Exerc. de Math. I. p. 125. (Jnh. Bull. univ. VII. 13).
- 100) Cauchy, Usage des momens linéaires dans la recherche des équations d'équilibre d'un système invariable assujéti à certains conditions; ibid. p. 155.
- 101) Cauchy, Sur la force vive d'un corps solide ou d'un système invariable en mouvement; ibid. II. p. 104.
- 102) Gergonne, Recherche des conditions d'équilibre dans un système libre, de forme invariable; Ann. de Gergonn. VIII. 14.
- 103) Lamé und Clapeyron, Sur l'équilibre intérieur des corps solides homogènes; Crelle J. VII. 145, 337.
- 104) Einfeldt, über die Festigkeit der Körper; Pogg. Ann. VIII. 25—36; 151—164; 283—298.

VII. Über Gleichgewicht und Bewegung elastischer und biegsamer fester Körper, insbesondere Schallschwingungen fester Körper.

- 105) Binet, Sur l'expression de l'élasticité et de la raideur des courbes à double courbure; J. de l'école polyt. T. X. cah. 17. p. 418.
- 106) Cauchy, Sur les équations, qui expriment les conditions d'équilibre, ou les lois du mouvement intérieur d'un corps solide, élastique ou non élastique; Exerc. de math. III. p. 160. (Jnh. Bull. univ. XII. 10—11, 221).
- 107) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'une lame solide; f. Exerc. III. 245. (Jnh. Bull. univ. XII. 13).
- 108) Cauchy, Addition à l'article précédent; ibid. p. 327.
- 109) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'une plaque solide; ibid. p. 328. (Jnh. Bull. univ. XII. 15).
- 110) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'une verge rectangulaire; ibid. p. 356. (Jnh. Bull. un. XII. 16).

- 111) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'une plaque élastique, dont l'élasticité n'est pas la même dans tous les sens; *ibid.* IV. 1. (Zñh. Bull. univ. XII. 18).
- 112) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement d'une verge rectangulaire, extrait d'un corps solide, dont l'élasticité n'est pas la même en tous sens; *ibid.* p. 15. (Zñh. Bull. un. XII. 18).
- 113) Cauchy, Sur les vibrations longitudinales d'une verge cylindrique ou prismatique à base quelconque; *ibid.* p. 43.
- 114) Cauchy, Sur la tension et les vibrations tournantes d'une verge rectangulaire; *ibid.* p. 47 (auch Mém. de l'Acad. T. IX. p. 119; Zñh. Bull. univ. XII. 21).
- 115) Cauchy, Démonstration analytique d'une loi découverte par Savart et relative aux vibrations des corps solides ou fluides; Mém. de l'Acad. T. IX. p. 117. (Bull. univ. XI. 111—112).
- 116) Fourier, Note relative aux vibrations des surfaces élastiques et au mouvement des ondes; Bull. phil. 1818. p. 129—136.
- 117) Germain, Examen des principes, qui peuvent conduire à la connaissance des lois de l'équilibre et du mouvement des solides élastiques; Ann. de Ch. et de Ph. XXXVIII. 123—130.
- 118) Laplace, Sur la transmission du son à travers les corps solides; Bull. phil. 1816. p. 190—192.
- 119) Laplace, Sur une lame élastique, repliée naturellement sur elle-même en forme de spirale; J. de l'écol. polyt. T. VIII. 260.
- 120) Laplace, Sur l'action réciproque des pendules et sur la vitesse du son dans les diverses substances; Ann. de Ch. et de Ph. III. 162.
- 121) Monge, Construction de l'équation des cordes vibrantes; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 118.
- 122) Navier, Sur la flexion des plans élastiques; Bull. phil. 1823. p. 92—102. (Ann. de Ch. et de Ph. 264—278).
- 123) Navier, Sur la flexion des verges élastiques courbes; Bull. de la soc. philom. 1825. Juill. et Août. p. 98 et 114. (Ausg. Bull. un. V. 303; Bull. phil. 1825. 98).
- 124) Navier, Solution de diverses questions relatives aux mouvements de vibration des corps solides élastiques; (Ausg. Bull. phil. 1825. p. 178—182).
- 125) Navier, Sur les lois de l'équilibre et du mouvement des corps solides élastiques; Mém. de l'Acad. T. VII. p. 375. (Ausg. Bull. phil. 1823. p. 177—181).
- 126) Pagani, Sur les équations différentes d'une surface flexible et inextensible en équilibre; Quetelet's Corresp. math. T. III. Nr. 2. 1827.
- 127) Pagani, Mémoires sur le mouvement du fil flexible, in 4°. de 147 pag. Bruxelles 1826. oder Mémoires couronnés par l'Académie de Bruxelles. T. V. (Zñh. Bull. univ. IX. p. 83—85).

- 128) Pagani, Sur les vibrations normales d'une membrane élastique circul.; *Quetelet's Corresp. math. T. V. livr. 4. (Znſ. Bull. univ. XII. 99—201).*
- 129) Pagani, Note sur le mouvement vibratoire; *Quetelet. Corresp. V. 227. VI. 25.*
- 130) Pagani, Considérations sur les principes, qui servent de fondement à la théorie mathématique de l'équilibre et du mouvement vibratoire des corps solides élastiques *); *Quetelet. Corresp. VI. 87.*
- 131) Pagani, Mémoire sur l'équilibre des systèmes flexibles; *Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxelles. T. IV. p. 195. (Znſ. Bull. univ. XII. 195—197).*
- 132) Pagani, Explication mathématique du phénomène accoustique, connu sous le nom de résonnance; *Quetelet Corresp. math. 1827. Tom. III.*
- 133) Piola, Théorie des courbes élastiques dans les trois espèces d'élasticité; *Sull. appl. de' principii della mec. anal. etc. Milan, 1825.*
- 134) Plana, Sur les oscillations des lames élastiques; *J. de l'école polyt. T. X. cah. 17. p. 349. 633.*
- 135) Poisson, Sur l'équilibre et le mouvement des corps élastiques; *Mém. de l'Acad. T. VIII. p. 357—570. (Znſ. Bull. univ. XI. 98—191; ober Ann. de Ch. et de Ph. XXXVII. 337—354 ober Pogg. Ann. XIII. 383—399).*
- 136) Poisson, Addition au mémoire précédent; *ibid. p. 623.*
- 137) Poisson, Sur le mouvement d'une corde vibrante, composée de deux parties de matières différentes; *J. de l'écol. polyt. T. XI. cah. 18. p. 442.*
- 138) Poisson, Sur l'intégrale relative aux vibrations des plaques élastiques; *Bull. phil. 1818. p. 125—128.*
- 139) Poisson, über die Ausziehung elastischer Drähte und Platten; *Ann. de Ch. et de Ph. XXXVI. 384 ober Pogg. XII. 516—518.*
- 140) Poisson, Note sur la compression d'une sphère creuse; *Ann. de Ch. et de Ph. XXXVIII. 330—335 ober Pogg. XIV. 177—180.*
- 141) Discussionen von Navier und Poisson über die Loie de l'équilibre et du mouvement des corps élastiques; die Literatur hierüber s. in diesem Repert. I. S. 88.

*) Enthält eine Discussion der von Poisson und Navier zu Grunde gelegten Annahmen.

VIII. über Attraction und Repulsion *).

- 142) Airy, Sur l'attraction des sphéroides; Phil. mag. 1827. Juin. p. 442. Derselbe, Transact. of the Cambridge philos. soc. II. 379. (Znř. Bull. univ. IX. 150; X. 122).
- 143) Lagrange, Eclaircissement d'une difficulté singulière, qui se rencontre dans le calcul de l'attraction des sphéroides très-pen. différens d'une sphère; J. de Pécol. polyt. T. VIII. cah. 15. p. 57.
- 144) Laplace, Sur l'attraction des corps sphériques et sur la répulsion des fluides élastiques; Bull. phil. 1821. p. 83—87 ober Ann. de Ch. et de Ph. XVIII. 181—190.
- 145) Legendre, Sur l'attraction des ellipsoïdes homogènes; Mém. math. de l'Institut. 1810. T. XI. P. II. p. 153.
- 146) Ostrogradsky, Note sur une intégrale, qui se rencontre dans le calcul de l'attraction des sphéroides; Mém. de Pétersb. 6me ser. T. I. p. 89—53. (Musř. Bull. un. XIV. p. 81—88).
- 147) Poisson, Sur l'attraction des sphéroides. Additions à la connaissance des temps pour l'année 1829. (Znř. Bull. phil. 1829. p. 130; Bull. univ. VIII. 14).
- 148) Sharpe, On the solid of greatest Attraction; Phil. Mag. 1830. Oct. p. 256 (Znř. Bull. univ. 1831. Juillet. p. 7).
-
- 149) Résumé des discussions de Poisson, Ivory et Airy, sur l'attraction des sphéroides; Bull. univ. IX. 150—158; X. 122—123; XI. 411—413.
- 150) Airy, Sur la figure, que prend une masse fluide homogène, dont les particules sont assujetties à leur attraction mutuelle et des forces étrangères très-faibles; Transact. of the Cambridge Phil. soc. T. II. P. I. p. 203. (Znř. Bull. univ. VII. 286).
- 151) Ivory, Equilibre d'un fluide attiré vers un centre fixe; Phil. mag. LXVIII. p. 10. (Znř. Bull. univ. VI. 269).
-
- 152) Drobisch, Versuche zur Befestigung der von Parrot angegebenen Schwierigkeiten in der Theorie der Ebbe und Fluth; Pogg. Ann. VI. 233—238. (vgl. Pogg.
- 153) Enerr, Disquisitiones quaedam de aestu maris (Dissert.). Berol. 1830. 23. S. 4.
- 154) Laplace, Sur le flux et le reflux de la mer; Mém. de l'Acad. 1818. T. III. p. 1—90.
- 155) Parrot, über eine Unvollkommenheit in der bisherigen Theorie der Ebbe und Fluth; Pogg. IV. 219—230; VIII. 150.

*) Vergl. hiebei die Abhandlungen von Cauchy und Ostrogradsky unter V. S. ferner IX.

- 156) *Bergola*, Problème inverse des forces centrales pour les courbes algébriques, résolu facilement par les sections angulaires; *Mém. de l'Acad. des sc. de Naples T. I. Part. I. p. 287. (Znſ. Bull. univ. V. 167).*
 - 157) *Legendre*, Du mouvement d'un corps attiré vers deux centres fixes; *Traité des fonctions elliptiques.*
 - 158) *Littrow*, Sur le mouvement des corps, qui s'attirent en raison directe de leurs distances; *Effemeridi astronomiche di Milano, pour les années 1824 et 1825. p. 77. (Znſ. Bull. univ. III. 290).*
 - 59) *Piola*, Détermination du mouvement d'un corps considéré comme un point, qui est attiré vers un centre fixe par une force proportionnelle à une fonction de sa distance à ce même centre; in *[Sull'applicazione de' principii della Mec. analit. etc. Milan. 1825.*
 - 60) *Poletti*, Sur le mouvement d'un point, repoussé par un centre fixe, ou attiré et repoussé par deux centres fixes, la force d'attraction et celle de repulsion étant en raison inverse des carrés des distances; *Mém. della Reale Acad. della sc. di Torino. Tom. XXXI. 153. (Znſ. Bull. un. XI. 180—181).*
-
- 51) *Gauchy*, De la différence entre les attractions exercées par une couche infiniment mince sur deux points infiniment rapprochés, situés l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur de cette même couche; *Bull. phil. 1815. p. 53.*
 - 62) *Strang*, On central forces; *Sillim. American J. XXI. p. 66—69, 334—342.*

IX. über Bewegung der Himmelskörper.

- 63) *Bessel*, Analytische Lösung der Kepler'schen Aufgabe; *Berl. Abh. 1816—17. S. 40.*
- 64) *Bessel*, Untersuchung des Uebers der planetarischen Störungen, welcher aus der Bewegung der Sonne entsteht; *Berl. Abh. 1824. 52. (Ausg. Bull. phil. 1825. p. 33—34).*
- 65) *Binet*, Sur la détermination des orbites des planètes et des comètes; *J. de l'écol. polyt. T. XIII. cah. 20. p. 249.*
- 66) *Burkhardt*, Formules générales pour les perturbations de quelques ordres supérieurs; *Mém. math. de l'Institut. T. IX. 1808. P. II. p. 36—67.*
- 67) *Gauchy*, Sur l'équation, à l'aide de laquelle on détermine les inégalités séculaires des mouvemens des planètes; in *[Exerc. IV. p. 140.*
- 68) *Encke*, über die Bahn der Vesta; *Berl. Abh. 1826. S. 257—271.*

- 169) Lagrange, Sur la théorie des variations des élémens des planètes, et en particulier des variations des grandes axes; Mém. math. de l'Institut. T. IX. 1808. P. I. p. 1—72; P. II. p. 363.
- 170) Laplace, Sur les mouvemens des corps célestes autour de leurs centres de gravité; Mém. math. de l'Institut. p. 301—376.
- 171) Laplace, Sur les équations séculaires des mouvemens de la lune, de son époque et de ses noeuds; Mém. math. de l'Institut. II. p. 126—182.
- 172) Lubbock, über die Constanten in der elliptischen Bahn der Planeten; Philos. transact. 1830. p. 201. 327. (Znš. Bull. univ. XIV. 259—260).
- 173) Plana, Sur divers points relatifs à la théorie des perturbations planétaires, exposée dans la méc. cél.; Ann. of phil. 1820. Janv. p. 65. (Znš. Bull. un. V. 255).
- 174) Poisson, Sur le mouvement de rotation de la terre; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 198.
- 175) Poisson, Equations, dont dépendent les mouvemens de l'axe de rotation de la terre; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 337.
- 176) Poisson, Sur le mouvement de la terre autour de son centre de gravité; Mém. de l'Acad. Tom. VII. p. 199. (Znš. Bullet. univ. VIII. 117).
- 177) Poisson, Note relative à ce mémoire; ibid. T. IX. p. 309.
- 178) Poisson, Sur les inégalités séculaires des moyens mouvemens des planètes; J. de l'école polyt. T. VIII. cah. 15. p. 1.
- 179) Quetelet, Sur quelques constructions graphiques des orbites planétaires; Nouv. mém. de l'Acad. de Bruxelles. III. 163. (Znš. Bull. univ. VI. 316).
- 180) Utting, Sur une analogie planétaire ou sur une loi de mouvement, qui s'observe dans toutes les orbites planétaires; Phil. mag. and Journ. 1823. Août. p. 119; Sept. p. 124. (Znš. Bull. univ. I. 203).

X. Über Gestalt der Himmelskörper *).

- 181) Airy, On the figure of the earth; Philos. transact. 1826. P. I. p. 548—578.
- 182) Biot, Sur la figure de la terre; Mém. de l'Acad. T. VIII. 1.
- 183) Ivory, Sur la théorie de la figure de la terre; Phil. mag. 1825. Avril. p. 241. (Znš. Bull. univ. V. 87).

*) Vergl. hiebei VIII. und XVII.

- 184) Ivory, Sur la théorie de la figure des planètes, contenue au III. livre de la méc. cél.; Phil. mag. Déc. 1825. p. 429; Janv. 1826. p. 81 et Févr. p. 81. (Ausg. Bull. univ. VI. 36).
 - 185) Ivory, On the equilibrium of fluids and the figure of a homogeneous planet in a fluid state; Phil. transact. 1831. P. I. p. 109.
 - 186) Laplace, Sur la figure de la terre et la loi de la pesanteur; Bull. phil. 1818. 122—125; 1819. p. 97—100 oder Ann. de Ch. et de Ph. VIII. 813; XI. 31.
 - 187) Poselger, über die Figur der Erde; Berl. Mh. 1827. 57—84.
 - 188) Ivory, Ellipticité de la terre déduite des expériences faites avec le pendule; phil. mag. LXVIII. 3 et 92. (Znsh. Bull. un. T. VI. 269).
-
- 189) Ivory, Solution d'un problème de géodésie; Phil. mag. 1824. Juillet. p. 25. (Znsh. Bull. univ. II. 279).
 - 190) Eittrow, über die perspectivischen Projectionen der Erd- und Himmelskarten; Baumg. IX. 449.
 - 191) Puissant, Application de la méthode la plus avantageuse à la détermination de l'aplatissement du sphéroïde osculateur en France, par la comparaison d'un arc de méridien avec un arc de parallèle; Bull. univ. I. 271.
 - 192) Puissant, Moyen d'évaluer rigoureusement la longueur d'une ligne géodésique et celle de ses différentes parties, à l'aide d'un réseau de triangles appuyés sur deux bases, qui présentent entre elles une petite discordance; Bull. univ. II. p. 275 oder Bull. phil. p. 17.
 - 193) Puissant, Note sur une nouvelle formule générale propre à donner l'aplatissement terrestre par la comparaison de deux arcs. Bull. univ. III. p. 74—76.
 - 194) Puissant, Sur la mesure et le calcul des azimuts propres à la détermination des longitudes terrestres; Mém. de l'Acad. Tom. IX. p. 185.
-

XI. über verschiedene Verhältnisse des Planetensystems.

- 195) Cauchy, Sur la mécanique céleste et sur un nouveau calcul, qui s'applique à un grand nombre de questions diverses; Bull. univ. XV. p. 260—269.
- 196) Challis, über die Anwendung des von Bode gefundenen empirischen Gesetzes, rücksichtlich der Entfernungen der Planeten von der Sonne auf die Entfernungen der Nebenplaneten von ihren Hauptplaneten; Transact. of the Cambridge Phil. soc. Vol. III. P. I. (Znsh. Gött. gel. Anz. 1832. Nr. 20).

- 197) Ivory, Sur la variation de densité et de pression dans l'intérieur de la terre; Phil. mag. Nov. 1825. p. 321—329. (Ausg. Bull. univ. V. 159).
- 198) Lamont, über die Frage, ob sich aus der beschleunigten Bewegung des Enkliden Kometen auf Widerstand des Äthers schließen läßt; Astr. Nach. XVI. 65.
- 199) Laplace, Sur la diminution de la durée du jour par le refroidissement de la terre; Bull. phil. 1820. p. 81—85, 108—109 oder Ann. de Ch. et de Ph. XIII. 410—417; XIV. 315—316.
- 200) Lubbock, Recherches sur l'Astronomie physique; Phil. transact. 1831. P. I. p. 17. (Znh. Bull. univ. XVI. 183—185).
- 201) Poincot, Mémoires sur la théorie et la détermination de l'équateur du système solaire; Bull. univ. XIII. 327—341.
- 202) Poisson, Note sur l'invariabilité du jour moyen; Bull. philom. 1819. p. 100—103.

XII. Bewegung schwerer Körper, Fall *), Schwerpunct.

- 203) Abel, Auflösung eines Problems, betreffend die Bewegung eines schweren Punctes auf einer krummen Fläche; Græll. J. d. Math. Th. I. 153. (Ausg. Bull. un. VII. 220).
- 204) Euler, Enodatio maximi paradoxii in problemate quodam mechanico (pertinens ad lapsum corporis curvam datam sequentis); Mém. de l'Acad. des sc. de Pétersb. T. X. p. 7. (Znh. Bull. univ. IX. p. 66—67).
- 205) Fuß, De descensu gravium super arcum lemniscatae; Mém. de Pétersb. T. IX. p. 91. (Znh. Bull. univ. III. 336).
- 206) Galbraith (Bill.), On the Deviation of a Falling Body from the Vertical to the Earth's surface; Phil. Mag. 1829. Nov. 321.
- 207) Grunert, über die Bewegung eines fallenden Körpers mit Rücksicht auf die Veränderung der Schwere; Pogg. Ann. X. 457—469.
- 208) Buffe, Erwiederung auf diese Abhandlung; Pogg. XII. 527—528.
- 209) Piola, Détermination du mouvement d'un point pesant, assujéti à parcourir une ligne droite, pendant que celle-ci décrit une surface conique à base circulaire, en tournant uniformément; in f. Sull. applicazione de' principii della Mecanica analitica, etc. in 4°. de 275 pag. Milán 1825.
- 210) Piola, Détermination du mouvement d'un point pesant dans la vis d'Archimède, qui tourne uniformément autour de l'axe de son

*) über Pendel besonders unter XIII.

- cle; Transact. of the American phil. soc. Vol. I. nouv. serie. 1818. p. 895. (Znř. Bull. un. IV. p. 226—227).
- 225) Poisson, Sur la longueur du pendule à secondes; Bull. ph. 1816. p. 172—174; 1817. p. 193—194.
- 226) Poisson, Mouvement d'un corps pesant, suspendu à l'extrémité d'un fil extensible; J. de l'école polyt. T. XI. cah. 18. p. 476.
- 227) Poisson, Sur les oscillations du pendule dans un milieu résistant et en ayant égard à l'extensibilité du fil; J. de l'école polyt. T. VII. cah. 18. p. 476.
- 228) Poisson, Addition au mémoire précédent; ibid. T. VIII. cah. 15. p. 845.
- 229) Poisson, Sur l'influence réciproque de deux pendules voisins; Addition à la connaissance des temps pour 1833. p. 3. (Zusř. Bull. univ. XV. p. 269—275 ober Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. p. 242—249).
- 230) Poisson, Sur le pendule de Borda. (Calcul des corrections suivantes: 1) flexibilité du fil de suspension; 2) frottement sur l'axe du couteau; 3) dilatation ou contraction du fil par suite du changement des temps); Addition à la connaissance du temps pour 1833. p. 41. (Znř. Bull. univ. XV. 275—276).

XIV. Stoß fester Körper.

- 231) Bêhr, Théorie mathématique du jeu de Billard; Quetel. Corresp. math. T. IV. Nr. 2.
- 232) Cauchy, Sur le choc des corps élastiques; Bull. phil. 1826. p. 180—182.
- 233) Cournot, Sur les percussions entre deux corps durs, qui se choquent en plusieurs points; Bull. univ. VII. p. 4—15; 85—90.
- 234) Navier, Note sur les effets des secousses imprimées aux pieds suspendus à des fils ou à des verges élastiques; Bull. phil. 1823. p. 73—76.
- 235) Schulten, Knodatio generalis problematis de collisione duorum corporum solidorum in unico puncto concurrentium; Mém. de Péttersb. IX. 200. (Znř. Bull. un. III. 338).

XV. Verschiedene Probleme der Statik fester Körper.

- 236) Bérard, Recherche des conditions de stabilité d'une échelle, en ayant égard au frottement; Ann. de Gerg. VIII. 196.

- 237) Bobillier, De l'équilibre de la chaînette sur une surface courbe, Ann. de math. XX. 285.
- 238) Cardinal, Solution d'un problème de mécanique, concernant le levier; Nuov. collez. di opusc. scient. Bologna 1824. cah. III. p. 143. (Inj. Bull. un. IV. p. 157).
- 239) Geytelwein, über den Druck belasteter Balken, wenn deren mehr als zwei sind; Berl. Abh. 1894—11. S. 28—64.
- 240) Gourgier, Mémoires d'analyse inédits, relative à plusieurs questions de mécanique; Bull. univ. II. 202.
- 241) Gergonne, Sur la stabilité de l'équilibre d'un corps pesant abandonné à lui même sur un plan horizontal; Ann. de Gergonne. VIII. 349.
- 242) Ein unbekannter, Recherche des conditions de stabilité d'une échelle, en ayant égard au frottement; Ann. de Gerg. VIII. 196.
- 243) Ein unbekannter, Solution d'un problème de statique*); Ann. de math. par Gerg. XIX. 339.
- 244) Masfetti, Théorie de l'équilibre d'une courbe rigide quelconque, laquelle doit, en tournant autour d'un point fixe, soulever un poids donné; Nuov. collez. di opusc. scient. Bologna. cah. 1. 1823. p. 37. (Inj. Bull. univ. IV. 157).
- 245) Navier, Note sur les questions de statique, dans lesquelles on considère un corps pesant supporté par un nombre de points d'appui surpassant trois; Bull. phil. 1825. Mars. p. 35. (Inj. Bull. univ. V. 166).
- 246) Nicuport, Sur l'équilibre des corps, qui se balancent librement sur un fil flexible et sur celui des corps flottans; Nouv. mém. de l'Acad. de Bruxell. I. 1820. p. 68—85. (Inj. Bull. un. II. 273).
- 247) Piola, Plusieurs problèmes relatifs à la caténaire non homogène; f. Sull. appl. de' principii della mec. anal. etc. Milan 1825.
- 248) Béné, Sur la résistance d'une plaque adhérente à une surface par des vis de pression: ou un enduit glutineux; Bull. univ. IV. p. 279—280.

*) Es ist folgendes: De quelle manière doit être posé un fil uniformément pesant, d'une longueur donnée, parfaitement flexible et inextensible, sur deux triangles fixes, rectilignes, horizontales et parallèles d'un diamètre infiniment petit, n'exerçant sur ce fil aucun frottement, pour s'y tenir en équilibre? Quelle est, en outre la moindre longueur de ce fil, qui puisse permettre l'équilibre. 2f

XVI. Verschiedene Probleme der Dynamik fester Körper.

- 249) Ampère, Solution d'un problème de dynamique*), suivie de considérations sur le problème général de forces centrales; Ann. de math. par Gerg. XX. 37.
- 250) Barbier, Solution d'un problème dynamique**); Ann. de math. par Gerg. XIX. 285. (Unrichtige Lösung).
- 251) Solution d'un autre problème de dynamique***); ibid. 359.
- 252) Barbier, Solution d'un problème relatif aux petites oscillations d'un corps solide, posé sur un plan horizontal; Ann. de Gergonne. VIII. 298.
- 253) Caynngt, Mémoire sur le mouvement d'un corps rigide, soutenu par un plan fixe; in 4°. de 32 pages. Paris 1829. Hachette. (Zsh. Bull. univ. XI. 264—266).
- 254) Kehmelt, Auflösung dreier specieller mechanischer Probleme; Grells Z. II. 217. (Zsh. Bull. univ. IX. 161).

*) Dies ist dasselbe Problem, was Barbier in den Ann. de Math. XIX. 285 richtig gelöst hatte. Vergl. Nr. 249.

**) Das Problem ist folgendes: Ein tube cylindrique rectiligne, d'une longueur indéfinie, est lié d'une manière invariable à un axe horizontal fixe, auquel il est perpendiculaire, de telle sorte, que l'axe de rotation passe par l'axe du tube, qui se trouve ainsi contraint de se mouvoir comme une lunette méridienne dans un plan vertical fixe.

On introduit dans l'intérieur de ce tube une sphère pesante, d'un diamètre égal au sien, dont le centre de gravité coïncide avec son centre de figure, qui de la sorte se trouve constamment dans l'axe du tube.

On suppose, que ce tube est contraint à tourner d'un mouvement uniforme sur l'axe horizontal fixe, qui le supporte, et l'on demande de déterminer les circonstances du mouvement du centre de la sphère dans le plan vertical, en faisant d'ailleurs abstraction de la résistance de l'air et du frottement.

***) Das Problem ist folgendes: Une roue circulaire porte à sa circonférence un canal annulaire, dont toutes les sections, suivant des plans conduits par l'axe de la roue, sont des cercles égaux, ayant leurs centres sur une circonférence située dans le plan de cette roue et concentrique avec elle.

La roue est mobile dans l'espace, mais de telle sorte, que son centre coïncide constamment avec le sommet d'un cône droit fixe, dont l'axe est vertical, qu'elle doit tourner uniformément autour de ce cône avec une vitesse donnée de manière à le toucher successivement, suivant toutes ses génératrices, et à n'avoir avec lui qu'un frottement du second degré.

Dans l'intérieur du canal, supporté par la roue, on a introduit une sphère pesante de même diamètre que ce canal, ayant son centre de gravité à son centre de figure et à laquelle on a imprimé une vitesse quelconque; et l'on demande de déterminer les lois du mouvement du centre de cette sphère, en faisant d'ailleurs abstraction de la résistance de l'air du frottement et en supposant d'ailleurs la sphère assez petite, pour qu'il soit permis de regarder toute sa masse comme étant réunie à son centre.

- 255) Paganì, Sur le problème de la rotation d'une chaîne; *L'Intel.* Corresp. math. T. IV. Nr. 5.
- 256) Paganì, Sur les mouvemens particuliers de rotation des corps, suspendus à un fil; *L'Intel.* Corresp. math. T. IV. Nr. 2. (Zus. Bull. un. X. 107).
- 257) Poisson, Sur le mouvement d'une chaîne pesante; *J. de l'école polyt.* T. VII. cah. 14. p. 319.
- 258) Poisson, Sur le frottement des corps qui tournent; *Bull. univ.* VI. 161—175.
- 259) Schulten, Sur le mouvement absolu et relatif d'un point sur une surface de figure invariable, qui se meut suivant une loi donnée; *Mém. de Pétersb.* X. 130. (Zus. Bull. un. IX. 164—165).
- 260) Sébénat, Théorie des petites oscillations d'un corps pesant terminé inférieurement par une surface courbe et posé sur un plan horizontal; *Ann. de Gerg.* IX. 98.
- 261) Sébénat, Théorie du mouvement d'une échelle pesante appuyée supérieurement contre un mur vertical et posant inférieurement sur un plan horizontal, en ayant égard au frottement; *Ann. de Gerg.* IX. 106.

XVII. Gleichgewicht, Druck, Widerstand tropfbar flüssiger und eingetauchter Körper *).

- 262) Cauchy, De la pression dans les fluides; *Exerc. de math.* II. pag. 23.
- 263) Cauchy, Sur les équations, qui expriment les conditions d'équilibre ou les lois du mouvement des fluides; *ibid.* III. 128.
- 264) Cournot, Observations sur les conditions d'équilibre des fluides; *Bull. univ.* IX. 158—161.
- 265) Gauss, Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibri; in 4°. 53 pag. Gott. 1830. (Zus. Bull. univ. XIV. p. 241—249).
- 266) Ivory, Note concernant la théorie de l'équilibre des fluides; *Phil. mag.* LXVII. 241, 340.
- 267) Ivory, On an Omission in Clairaut's Theory of the equilibrium of a homogeneous fluid; *Phil. Mag.* 1831. March. 183.
- 268) Ivory, Sur l'équilibre des fluides et la figure d'une planète homogène à l'état fluide; *Phil. transact.* 1831. P. I. 109—145. (Zus. Bull. univ. 1831. Juin. 323—329).

*) Vgl. hiebei VIII., X. und XVIII.

- 269) Ivory, On the figure requisite to maintain the equilibrium of a homogeneous fluid mass, that revolves upon an axis. *Phil. transact.* 1824. P. I. p. 85—150. (*Math. Bull. un.* III. 333—336).
- 270) Pagan, Solution d'un problème, concernant un corps plongé; *Quetel. Corresp. math.* T. II. Nr. 6. (*Math. Bull. univ.* VIII. 82).
- 271) Poisson, Observations sur ce mémoire d'Ivory; *Ann. de Ch. et de Ph.* XXVII. 225—235.
- 272) Poisson, Sur l'équilibre des fluides; *Mém. de l'Acad.* T. IX. p. 1—88. (*Math. Bull. univ.* XI. 409—411 oder *Ann. de Ch. et de Ph.* XXXIX. 333—335).
- 273) Scholtz, De figura guttae cadentis in aëre resistente; in 4°. p. 47. Breslau. 1826. Kupfer. (*Math. Bull. univ.* VII. 279).
- 274) Zeteborg, Nouvelle théorie de la résistance des fluides; *Phil. mag.* 1823. Avril. 245—262. (*Math. Bull. un.* X. 306—307).
- 275) Boltmann, Einige Bemerkungen und Erweiterungen über die Stellung und Standhaftigkeit (position et stabilité) fester Körper, wenn sie auf Wasser schwimmen; *Berl. Abh.* 1827. S. 115—138.

XVIII. Capillarität.

- 276) Gauß, Principia generalia theoriae figurae fluidorum in stata aequilibrii; in 4°. 53 pag. Gott. 1830.
- 277) Girard, Sur l'attraction qui se manifeste à des distances sensibles entre des surfaces solides, mouillées par un liquide, dans lequel elles sont submergées; *Ann. de Ch. et de Ph.* XXIX. 260.
- 278) Girard, Sur les atmosphères liquides et leur influence sur l'action mutuelle des molécules solides, qu'elles enveloppent; *Mém. de l'Ac.* T. IV. 1819 et 1820. 1—98. (*Math. Bull. un.* III. 142—144)*).
- 279) Laplace, Supplément au 10me livre du traité de mécanique céleste sur l'action capillaire. Paris. de 65 pages.
- 280) Laplace, Supplément à la théorie de l'action capillaire. Paris, de 78 pages.
- 281) Laplace, Considérations sur la théorie des phénomènes capillaires; *Ann. de Ch. et de Ph.* XII. 5—11.
- 282) Laplace, Sur le moyen de détruire les effets de la capillarité dans les baromètres; *Connaiss. du temps pour 1829.* Nr. 7.
- 283) Petit, Théorie mathématique de l'action capillaire; *J. de l'école polyt.* T. IX. cah. 16. p. 1.
- 284) Petit, Observations sur les mémoires, que Brunacci a insérés dans le Giorn. di Fis. etc., relativement à la théorie des tubes capillaires; *Ann. de Ch. et de Ph.* IV. 54—63; V. 404—406.

*) Bergl. auch Nr. 300), 301), 302).

- 285) Poisson, über die Wirkungen, die durch Capillarität und Affinität von heterogenen Substanzen hervorgebracht werden können; Ann. de Ch. et de Ph. XXXV. 98 oder Pogg. XI. 134—145.
 286) Poisson, Nouvelle théorie de l'action capillaire. 1831. Paris, de 300 pag. (Zñh. Ann. de Ch. et de Ph. XLIV. 61—69).
 287) Rubberg, Théorie mathématique des phénomènes de la capillarité; Mém. de l'Acad. royale de Stockholm. 1819, 153; 1822, 26.

XIX. Bewegung tropfbarer Flüssigkeiten und schwimmender Körper *).

- 288) Barbier, Essai sur les petites oscillations des corps flottans; Ann. de Gerg. VIII. 37.
 289) Belanger, Essai sur la solution numérique de quelques problèmes relatifs au mouvement permanent des eaux courantes; in 4°. de 38. pages. Prix 2 Fr. 25 Cent. Paris 1828. (Zñh. Bull. univ. XI. 114—115).
 290) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement des liquides et des fluides élastiques; Bull. univ. XI. 413—419.
 291) Cauchy, Sur la théorie de la propagation des ondes à la surface d'un fluide pesant d'une profondeur indéfinie; Mém. prés. par divers savans à l'Acad. royale. 1827. T. I. p. 3. (Zñh. Bull. univ. II. p. 13).
 292) Cauchy, Notes au précédent mémoire; ibid. p. 124.
 293) Cauchy, Sur une espèce particulière du mouvement des fluides; J. de l'écol. polyt. T. XII. cah. 19. p. 204. (Ausg. Bull. univ. III. p. 9—10).
 294) Challis, On the integration of the general equations of the motion of incompressible fluids; Phil. Mag. 1829. Aug. 123. Oct. 129. 1830. Mai 329.
 295) Challis, Sur les équations générales du mouvement des fluides incompressibles et compressibles, et sur la pression des fluides en mouvement; Transact. of the Cambridge phil. soc. Vol. III. P. III. p. 383. (Ausg. Bull. univ. XVI. 177—185).
 296) Corancez, Intégration de quelques équations aux différences partielles et du mouvement de l'eau dans les vases; Bull. univ. X. p. 111—116).
 297) Eytelwein, Untersuchungen über die Bewegung des Wassers, wenn auf die Contraction, welche beim Durchgange durch verschiedene Öff-

*) Vergl. hiebei V.

- nungen Statt findet, und auf den Widerstand, welcher die Bewegung längs der Wände der Gefäße verzögert, Rücksicht genommen wird; Berl. Abhandl. 1814—15. S. 137—178. (Ausg. Bull. phil. 1823. p. 113—116).
- 298) Cytelwein, Untersuchungen über die Bewegung des Wassers, wenn auf den Widerstand, welcher diese Bewegung längs den Wänden der Gefäße verzögert, Rücksicht genommen wird; Berl. Abh. 1818 1819. S. 9.
- 299) Cytelwein, Bestimmung der Wassermenge eines Stromes; Berl. Abh. 1820—21. S. 9—14.
- 300) Girard, Sur le mouvement des fluides dans les tubes capillaires et l'influence de la température sur ce mouvement; Mém. math. de l'Institut. 1813. T. XIV. p. 249—380. (Ausg. Bull. phil. 1815. 57).
- 301) Girard, Sur l'écoulement linéaire de diverses substances liquides par des tubes capillaires de verre; Mém. de l'Acad. royal. 1816. I. p. 187—259.
- 302) Girard, Sur l'écoulement de l'éther et de quelques autres fluides par des tubes capillaires de verre; ibid. p. 260.
- 303) Kramp, Essai d'application de l'analyse mathématique à la circulation du sang; Ann. de Gerg. III. 77; VII. 270.
- 304) Merian, über die Bewegung der Flüssigkeiten in den Gefäßen; in 4^o. 1823. 43 S. Schweighäuser. (Inh. Bull. un. XIII. 87).
- 305) Mosely, A proposition on the motion of Fluids; Phil. Mag. 1830. August. 145.
- 306) Roffotti, Sur le mouvement de l'eau des canaux; Actes de la soc. ital. des sc. de Modène. T. XIX. (Inh. Bull. un. VIII. 100).
- 307) Ravier, Sur les lois du mouvement des fluides, en ayant égard à l'adhésion de leurs molécules; Bull. phil. 1822. p. 75—79 oder Ann. de Ch. et de Ph. XIX.
- 308) Ravier, Sur les lois du mouvement des fluides; Mém. de l'Acad. T. VI. 1823. p. 389—440. (Ausg. Bull. phil. 1825. 49—52; Bull. univ. X. 11—14).
- 309) Piola, Théorie du mouvement des fluides rapporté à deux coordonnées; in seintr Applicazione de' principii della Mec. analit. etc. Milan. 1825.
- 310) Poisson, Sur la théorie des ondes; Mém. de l'Acad. T. I. 1816. p. 71. (Ausg. Bull. philom. 1815. p. 162—163; 1817. p. 85—89; Ann. de Ch. et de Ph. V. 122).
- 311) Poisson, Note sur le problème des ondes; Mém. de l'Acad. T. VIII. p. 571.
- 312) Poisson, Remarques sur les rapports, qui existent entre la propagation des ondes à la vitesse de l'eau et leur propagation dans les plaques élastiques; Bull. phil. 1818. 97—99).
- 313) Rubberg, Recherches théoriques sur la contraction de la veine

- fluide; Mém. de l'Acad. royale de Stockholm. (Snp. Bull. univ. I. p. 18).
- 314) **Aréogold**, Sur la résistance d'une molécule fluide heurtée par un corps en mouvement; Phil. Mag. T. LXVIII. 11 et 112. (Snp. Bull. univ. VII. 169).
-
- 315) **Barbier**, Sur les oscillations verticales d'un flotteur de révolution; Ann. de Math. XX. 175.
- 316) **Poisson**, Sur les petites oscillations de l'eau contenue dans un cylindre; Ann. de math. par Gerg. XIX. 225.
- 317) **Sarrus**, Sur les oscillations des corps flottans; Ann. de math. par Gerg. XIX. 185.
-

XX. Gleichgewicht, Expansivkraft, Widerstand elastischer Flüssigkeiten.

- 318) **August**, über Berechnung der Expansivkraft des Wasserdampfes; Pogg. XIII. 122—136.
- 319) **Avogadro**, Remarques sur la loi de la force élastique de l'air; Mém. de l'Acad. de Turin. XXXIII. (Ausg. Bull. univ. X. 291—301; XI. 115—121).
- 320) **Bouvard**, Berechnung der vom Monde bewirkten atmosphärischen Fluth; Mém. de l'Acad. des sc. T. VII. 267, oder Pogg. XIII. 137—149 oder Schweigg. LIX. 4—11.
- 321) **Cauchy**, Sur l'équilibre et le mouvement des liquides et des fluides élastiques; Bull. un. XI. 413—419.
- 322) **Dallari**, Recherche de la loi, suivant laquelle doit varier, pour l'équilibre, la densité des couches d'une masse gazeuse sphérique, dont les molécules ne sont soumises qu'à leur attraction mutuelle; Ann. de math. XX. 31.
- 323) **Dürfen**, über die mechanische Beschaffenheit der elastischen Flüssigkeiten; Berlin 1830. (Nüg. Lit. Zeit. 1832. Febr. Nr. 57. 239).
- 324) **Laplace**, Action de la lune sur l'atmosphère; Connaissance des temps pour 1826. p. 308; Ann. de Ch. et de Ph. XXIV. p. 280—293; Bull. un. III. 233—234).
- 325) **Mayer**, Lex Mariotti ex principiis theoreticis deducta; Comm. Gott. Rec. VI. p. 3—26.
- 326) **Hogg**, über den Einfluß der Feuchtigkeit auf barometrische Höhenmessungen und dessen Correction durch das Psychrometer; Pogg. XIV. 437—442.
- 327) **Schmidt**, Theorie des Widerstandes der Luft bei der Bewegung der Körper. Göttingen 1831.
-

XXI. Bewegung, Schwingungen elastischer Flüssigkeiten.

- 328) Cauchy, Sur l'équilibre et le mouvement des liquides et des fluides élastiques; Bull. un. XI. 413—419.
- 329) Challis, Über die Theorie der kleinen schwingenden Bewegung elastischer Flüssigkeiten; Transactions of the Cambridge Philos. soc. Vol. III. P. I. p. 269. (Ausg. Bull. univ. 1831. Nov. 233—245).
- 330) Challis, Some general Considerations respecting the propagation of Motion through Elastic Mediums; Phil. Mag. 1830. Mai 325.
- 331) Challis, Sur les équations générales du mouvement des fluides incompressibles et compressibles, et sur la pression des fluides en mouvement; Transact. of the Cambr. ph. soc. Vol. III. P. III. p. 383. (Ausg. Bull. univ. XVI. 177—183).
- 332) Ivory, Sur les lois de la condensation et de la dilatation de l'air et de gaz et sur la vitesse du son; Phil. Mag. Juillet 1825. p. 3. (Ausg. Bull. un. V. 233).
- 333) Ivory, Sur la vitesse du son; Phil. Mag. 1827. Avril. p. 249. (Ausg. Bull. un. VIII. 371).
- 334) Laplace, Développement de la théorie des fluides élastiques et application de cette théorie à la vitesse du son; Bull. phil. 1821. p. 161—172.
- 335) Laplace, Eclaircissements de la théorie des fluides élastiques; Ann. de Ch. et de Ph. XVIII. 273—279; XXI. 22—23.
- 336) Poisson, Sur la théorie des ondes; Mém. de l'Acad. Tom. I. 1816. p. 71. (Ausg. Bull. phil. 1815. p. 162—163; 1817. 85—89; Ann. de Ch. et de Ph. V. 122).
- 337) Poisson, Sur l'intégration de quelques équations linéaires aux différences partielles et particulièrement de l'équation générale du mouvement des fluides élastiques; Mém. de l'Acad. T. III. 1818. p. 121. (Ausg. Bull. phil. 1819. p. 113—115).
- 338) Poisson, Sur la théorie du son; J. de l'école polyt. VII. 319.
- 339) Poisson, Sur le mouvement des fluides élastiques dans des tuyaux cylindriques et sur la théorie des instrumens à vent; Mém. de l'Ac. Tom. II. 1817. p. 305—402; (Ausg. Bull. phil. 1818. p. 43—45; 1819. p. 28—31; Ann. de Ch. et de Ph. VII. p. 283—298; X. p. 129—141).
- 340) Poisson, Extrait d'un mémoire sur la propagation du son dans les fluides élastiques; Ann. de Ch. et de Ph. XXII. 266—249.
- 341) Poisson, Sur la vitesse du son. Addition à la connaissance des temps pour 1826. p. 257. (Ausg. Ann. de Ch. et de Ph. XXIII. 5—15 oder Bull. univ. III. 7—9).
- 342) Poisson, Sur le mouvement de deux fluides élastiques superposés; Mém. de l'Acad. X. 317.

- 343) Poisson, Sur la propagation du mouvement dans les milieux élastiques; Mém. de l'Acad. T. X. p. 549—606. (Znh. Bull. univ. II. 15—18; Ann. de Ch. et de Ph. XLVI. 423—435).
- 344) Girard, Rapport sur un mémoire de *Lagerhielm* relativement à l'écoulement de l'air par des orifices; Ann. de Ch. et de Ph. XXI. 204—209.
- 345) Girard, Sur l'écoulement de l'air atmosph. et du gaz hydrogène carboné dans des tuyaux de conduite; Mém. de l'Acad. Tom. V. 1821—1822. p. 1—26. (Znh. Bull. univ. VIII. 5).
- 346) Navier, Sur l'écoulement des fluides élastiques dans les vases et les tuyaux de conduites; Mém. de l'Acad. T. IX. 311. (Zusg. Bull. univ. XIII. 97—104).

XXII. Verschiedene Gegenstände der angewandten Mechanik (Maschinen).

- 347) Coriolis, Calcul de l'effet des machines. Rapport sur cet ouvrage; Bull. univ. XII. 103—116.
- 348) Goffe, Recherches balistiques sur les vitesses initiales, le recul et la résistance de l'air; 1 Vol. in-8°. Paris 1823. (Zusg. Bull. univ. I. 17).
- 349) Doolittle, Sur le mouvement d'une manivelle; American J. of sc. XIV. Nr. 1. p. 60. (Znh. Bull. univ. XI. 402).
- 350) Gytelwein, Theorie des Krummzapfens; Berl. Abh. 1812—13. S. 95—108.
- 351) Gytelwein, Bestimmung der Kraft, welche erfordert wird, den Widerstand der Getraideförner beim Getraidemalen zu überwinden; Berl. Abh. 1812—13. S. 109—118.
- 352) Gytelwein, Zusammenstellung der Gründe, von welchen der Gebrauch des Boltmann'schen hydrometrischen Flügels abhängt, unabhängig von jeder Theorie über den Stoß des Wassers; Berl. Abh. 1816—17. S. 23.
- 353) Garnier, Sur les machines; Nouv. Mém. Acad. Brux. I. 104—136. (Znh. Bull. un. II. 274).
- 354) Gerstner, Bemerkungen über das hydrometrische Pendel; 92 Seit. Prag 1829. (Znh. Leipz. Lit. Zeit. 1823. März. S. 590 oder Bull. univ. II. 18).
- 355) Girard, Recherches sur les canaux de navigation, considérés sous le rapport de la chute et de la distribution de leurs écluses; Mém. de l'Acad. T. V. p. 27; T. VII. p. 1; T. VIII. p. 165; Fechner's Repertorium d. Experimentalphysik. III. 13

XXVI. Über das Licht.

1. Allgemeine Untersuchungen über das Licht.

- 380) Ampère, Démonstration d'un théorème, d'où l'on peut déduire toutes les lois de la réfraction ordinaire et extraordinaire; Mém. math. de l'Institut. 1813. T. XIV. p. 235—248.
- 381) Fischer, Analytische Untersuchungen über die Zurückstrahlung des Lichtes von Metallspiegeln, die nach irgend einem Kegelschnitt gekrümmt sind; Berl. Abh. 1814—15. S. 1—29.
- 382) Gergonne, Du mouvement de la lumière dans un milieu transparent, dont la densité varie dans tous les sens, suivant une loi mathématique quelconque; Ann. de math. par Gergonne. XIX. 257.
- 383) Ratus, Optique; J. de l'école polyt. T. VII. p. 1. 84.
- 384) Schleiermacher, über den Gebrauch der analytischen Optik bei der Construction optischer Werkzeuge und über die Übereinstimmung der dadurch erhaltenen Resultate mit der Erfahrung; Pogg. Ann. XIV. 1—43.
- 385) Schleiermacher, Analytische Optik; Baumg. Zeitschr. IX. 1. 161. 454; X. 171. 329.
- 386) Schulten, Recherche générale sur la quantité de lumière directe ou indirecte, envoyée dans l'œil par les objets lumineux; Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. T. I. livr. 1. p. 39. Sav. étr.
- 387) Sorlin, Mémoires sur la dioptrique; J. de la soc. du Bas-Rhin. 1827. p. 224—258, (Inp. Bull. univ. XI. 401).

2. Erscheinungen des Lichtes, nach der Undulationstheorie erklärt, Interferenzen.

- 388) Ampère, Sur la détermination de la surface courbe des ondes lumineuses dans un milieu, dont l'élasticité est différente suivant les trois directions principales etc. Ann. de Ch. et de Ph. XXXIX. 113—144.
- 389) Cauchy, Application des formules qui représentent le mouvement d'un système de molécules sollicitées par des forces d'attraction ou de répulsion mutuelle à la théorie de la lumière; Exerc. de math. V. p. 19.
- 390) Cauchy, Sur le mouvement d'un système de molécules, qui s'attirent ou se repoussent à de très-petites distances et sur la théorie de la lumière; Mém. de l'Acad. IX. 114.
- 391) Cauchy, Théorie de la lumière, première partie; Mém. de l'Acad. X. 293—316 oder Bull. univ. XIII. 414—427.

*) Die Untersuchungen über die Undulationstheorie sind unten besonders zusammengestellt.

- 192) Cauchy, Sur la réfraction, la réflexion et la dispersion de la lumière dans le système des ondes; Bull. univ. XIII. 6—18.
 - 193) Fresnel, Sur la lumière (dans le syst. des ondes); in der franz. Übersetzung von Thomson's Chemie oder Pogg. III. 89—128, 303—328; V. 223—256; XII. 197—217; 366—398.
 - 194) Lagrange, De la théorie de la lumière par Huyghens; Ann. de Ch. et de Ph. IV. p. 128—145.
 - 195) Poisson, Sur le mouvement de deux fluides élastiques superposés; Mém. de l'Acad. X. 317.
 - 196) (Poisson, Extrait d'une lettre à Fresnel (sur le système des ondes); Ann. de Ch. et de Ph. XXII. 270—280).
 - 197) (Fresnel, Réponse à cette lettre; ibid. XXIII. 129—134).
-
- 198) Xirny, über die Natur des Lichtes in den beiden durch die Doppelbrechung des Bergkrystalles hervorgerufenen Strahlen; Transact. of the Cambridge phil. soc. T. IV. ober Pogg. XXIII. 204—280.
 - 199) Challis, Theory of the transmission of Light through Mediums, and of its Reflexion at their surfaces, according to the Hypothesis of Undulation; Phil. mag. 1832, March. 161—166.
 - 200) Challis, An Attempt to explain theoretically the different Refrangibility of the Rays of Light, according to the Hypothesis of Undulations; Phil. Mag. 1830, Sept. 169.
 - 201) Fresnel, Sur la double réfraction; Mém. de l'Acad. VII. 45—166 ober Pogg. XXIII. 372—431; 494—556.
 - 202) Fresnel, Explication de la réfraction dans le système des ondes; Ann. de Ch. et de Ph. XXI. 213—228.
 - 203) Fresnel, Sur la loi des modifications, que la réflexion imprime à la lumière polarisée; Ann. de Ch. et de Ph. XLIV. 225—264 ober Pogg. XXII. 90—125. (Ausg. Ann. de Ch. et de Ph. XXIX. 175—186).
 - 204) Fresnel, Résumé d'un mémoire sur la réflexion de la lumière; Ann. de Ch. et de Ph. XV. 379—386.
 - 205) Fresnel, Note sur la coloration des lames cryst.; Ibid. XVII. 167—195; 312—315.
 - 206) Fresnel, Note sur le phénomène des anneaux colorés; ibid. 129—134 ober Pogg. XII. 599—604.
 - 207) Fresnel, Sur la polarisation de la lumière; Ann. de Ch. et de Ph. XVII. 179. 312 ober Pogg. XXII. 68. 89.
-
- 208) Arago, Rapport fait à l'Académie des sciences sur les mémoires envoyés au concours pour le prix sur la diffraction; Ann. de Ch. et de Ph. XI. 5—30.
 - 209) Babinet, Sur les couleurs des réseaux; ibid. XL. 166—177 ober Pogg. XV. 505—516.

- 410) Fresnel, Sur la diffraction de la lumière; Mém. de l'Acad. T. V. 1821—1822. p. 339—475. Ann. de Ch. et de Ph. I. 239; XI. 245—255; 337—378.
- 411) Young, über die Farben der Gitter; Ann. de Ch. et de Ph. XL. 178—182.
3. Brennpuncte, caustische Curven, gleichbeleuchtete Linien.
- 412) Borboni, Sur les lignes uniformément éclairées; Giorn. di Fis.-Mat. et Juin. 1823. p. 196; Juillet et Août p. 253. (Znſ. Bull. univ. II. 105).
- 413) Chasles, Sur les lignes dirimantes à deux foyers conjugués ≡ Quetelet Corresp. math. V. 116.
- 414) Chasles, Sur la génération des focales; Quetelet Corresp. math. VI. 207.
- 415) Lambert, Sur les caustiques planes; Ann. de Math. XX. 97.
- 416) Pouillet, Sur les foyers du cristallin; Bull. phil. 1826. Janv. p. 6. (Zusg. Bull. univ. VI. 62).
- 417) Quetelet, Sur une nouvelle manière de considérer les caustiques, produites soit par la réflexion, soit par la réfraction; Nouv. Mém. de l'Acad. de Bruxelles. 1826. T. III. p. 89. (Znſ. Bull. univ. T. VII. p. 15).
- 418) Quetelet, Sur une nouvelle théorie des caustiques, suivie de différentes applications à la théorie des projections stéréographiques; in-4°. de 35 pag. 1827. (Auch Mém. de l'Acad. de Bruxell. T. IV.; Znſ. Bull. univ. VIII. 102).
- 419) Quetelet, Construction des points brillans et des courbes uniformément éclairées, déduite de sa théorie des caustiques; Quetelet Corresp. math. II. Nr. 1.
- 420) Quetelet, Quelques théorèmes nouveaux sur les caustiques ≡ ibid. Nr. 2.
- 421) Quetelet, Sur les lignes dirimantes à deux foyers conjugués ≡ Quetelet Corresp. math. V. 109.
- 422) De la Rive, Dissertation sur la partie d'optique, qui traite des courbes dites caustiques; in-4°. Genève 1824. (Znſ. Bull. univ. I. p. 231).
- 423) Zimmermann, Démonstration nouvelle du principe énoncé par Quetelet, sur les caustiques par réflexion et par réfraction; Quetelet Corresp. math. I. Nr. 6.
4. Atmosphärische Lichterscheinungen, atmosphärische Refraction.
- 424) Biot, Recherches sur les réfractions extraordinaires, qui s'observent très-près de l'horizon; Mém. math. de l'Inst. T. X. 1809. P. I. p. 1—260.

- 25) Dandelin, Solution du problème du plus court crépuscule, proposé d'abord par *Nonius*; *Quetelet Corresp. math.* II. Nr. 2.
- 26) Fraunhofer, über die Theorie der Hölle, Nebensonnen etc. in *Astron. Abh. von Schumacher*. 38 Heft S. 33. (*Snh. Bull. univ.* VI. 277).
- 27) Gergonne, Essai analytique sur le phénomène du mirage. *Ann. de math.* XX. 1.
- 28) Mitle, Sur la grandeur apparente des objets, causée par la réfraction de la lumière dans l'atmosphère; *J. de phys.* 1822. Nov. (*Ausg. Bull. univ.* I. 299).
- 29) Moser, über einige optische Phänomene und Erklärung der Hölle und Ringe um leuchtende Körper; *Pogg.* XVI. 67—81.
- 30) Spooner, über den Widerschein von Sonne und Mond in den Meeresswellen; *Pogg.* IX. 89—106.
- 31) Swanberg, *Disquisitiones analyticae in theoriâ refractionum astrorum*; Nov. act. reg. soc. scient. Upsal. IX. 89. (*Snh. Bull. un.* XII. 335—336).
- 32) Brede, über die scheinbare Lage paralleler Strahlen in der Atmosphäre und ihre Anwendung zu meteorologischen Messungen; *Pogg.* VII. 217—224; 305—310.
- 33) Forster, Mémoires sur les variations du pouvoir de réflexion, de réfraction et de dispersion de l'atmosphère; *Phil. mag.* 1824. Mars. p. 192. (*Snh. Bull. univ.* II. 110).
- 34) Ivory, On the astronomical refractions; *Phil. transact.* 1823. p. 409; *Ann. of Phil.* 1824. Avril. p. 299. (*Snh. Bull. un.* II. 382).
- 35) Ivory, Observations sur les nouveaux tableaux de réfractions; *Phil. mag.* 1824. Avril p. 261; Juin 418. (*Snh. Bull. univ.* III. 10—11).
- 36) Diers und Schumacher, Extension des séries inverses pour le calcul de la réfraction, avec une solution directe du problème; *Journ. of sc.* p. 139 Nr. 31. (*Snh. Bull. univ.* IV. p. 235).
- 37) Laplace, Sur les mouvemens de la lumière dans les milieux diaphanes; *Mém. math. de l'Institut*. T. X. 1809. p. 300—342).
- 38) Plana, Recherche analytique sur la densité des couches de l'atmosphère et la théorie des réfractions astronom; *Mém. de l'Acad. de Turin*. T. XXVII. 1823. p. 143. (*Snh. Bull. univ.* I. 206).
- 39) Recherches historiques sur les diverses solutions du problème des réfractions; *Quart. J. of sc.* 1825. Nr. 36. p. 347. (*Snh. Bull. univ.* III. p. 353).
- 40) Ein Unbekannter, über die astronomischen Refractionen von Bessel; *J. of sc.* 1823. Juillet. p. 356. (*Snh. Bull. un.* I. 343).
- 41) Young, A finite and exact expression for the refraction of an Atmosphere nearly resembling that of the earth; *Philos. transact.* 1824. P. I. p. 159—161.

- 442) Zach, Refraktions- und Correctionstabeln in Bezug auf Thermometer- und Barometerstand, nach den von Bessel bestimmten Werthen der Constanten berechnet; Astronom. Correspond. von Zach. Xh. IX. S. 214.
5. über verschiedene specielle Gegenstände der Lichtlehre.
- 443) Bary, Sur la détermination élémentaire du minimum de déviation, qu'un rayon de lumière homogène puisse subir en traversant un prisme donné; Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 88.
- 444) Biot und Arago, Sur les affinités des corps pour la lumière et particulièrement sur les forces réfringentes des différents gaz; Mém. math. de l'Institut. 1806. T. VII. P. II. p. 301—386.
- 445) Fischer, Theorie der Nebenbilder, welche ebene Glaspiegel zeigen, ihre Flächen mögen vollkommen parallel sein oder nicht; Berl. Abh. 1812—13. S. 45—74.
- 446) François, Des courbes d'intersection apparente de deux lignes, qui tournent avec rapidité autour de deux points fixes; Mém. Correspond. math. V. 120.
- 447) François, Théorie mathématique des courbes d'intersection apparente de deux lignes, qui tournent avec rapidité autour de deux points fixes; Mém. Correspond. math. T. V. livr. 2.
- 448) Schette, Théorie et description de l'héliostat; J. de l'école polyt. T. IX. cah. 16. p. 263.
- 449) Schette, Addition à ce mémoire; ibid. T. X. cah. 17. p. 682.
- 450) Sehot, Application de la loi mathématique de l'évaluation des distances; Bull. univ. IV. 17.
- 451) Littrow, über Sonnenuhren; Baumg. IX. 148.
- 452) Poisson, Sur le phénomène des anneaux colorés; Ann. de Ch. et de Ph. XXIII. 5—15.
- 453) Prevost, De l'effet du mouvement d'un plan réfringent sur la réfraction; Ann. de Ch. et de Ph. XV. 183—191.
- 454) Puissant, Nouvelle méthode analytique pour déterminer les effets de l'aberration sur la position des astres; J. de l'école polyt. T. X. cah. 17. p. 396.
- 455) Duetelet, Sur un problème de réflexion de la lumière; Mém. Correspond. math. T. IV. Nr. 2. (Znh. Bull. univ. X. 109).
- 456) Rubberg, über die Dispersion des Lichtes; Pogg. IX. 483—487.
- 457) Bignon, gegen diese Abhandlung; Ann. de Ch. et de Ph. XXXVII. 440—441).
- 458) Spunar, Beitrag zur Theorie der Refractionen; Baumg. Zeitscr. VIII. 410.

XXVII. Über die Wärme.

1. Allgemeine Untersuchungen über die Wärme.

- 459) Fourier, Théorie analytique de la chaleur, en 1 vol. in-4^e. de 650 pages, (Zñh. Bull. phil. 1822. p. 1—3 oder Ann. de Ch. et de Ph. III. 350).
- 460) Fourier, Théorie du mouvement de la chaleur dans les corps solides; Mém. de l'Acad. T. IV. 1819 et 1820. p. 185—555. (Zñh. Bull. un. III. 145—147).
- 461) Fourier, Suite du précédent mémoire; ibid. T. V. 1821—1822. p. 153—246.
- 462) Fourier, Sur la théorie physique de la chaleur rayonnante; Ann. de Ch. et de Ph. VI. 259—303.
- 463) Fourier, Remarques sur la théorie math. de la chaleur rayonnante; Ann. de Ch. et de Ph. VI. 337—365.
- 464) Fourier, Résumé théorique des propriétés de la chaleur rayonnante; Ann. de Ch. et de Ph. XXVII. 236—230 oder Bull. univ. IV. p. 3—7).
- 465) Fourier, Sur la distinction des racines imaginaires et sur l'application des théorèmes d'analyse algébrique aux équations transcendantes qui dépendent de la théorie de la chaleur; Mém. de l'Acad. VII. 605.
- 466) Fourier, Sur la théorie analytique de la chaleur; Mém. de l'Acad. T. VIII. p. 581—623. (Ausg. Bull. univ. XI. 13—30).
- 467) Fusinieri, De la différence qui existe entre le calorique ordinaire latent et spécifique et le calorique des expansions spontanées en lames très minces, et de l'influence de celui-ci sur la détermination de la capacité des corps pour le calorique; Giorn. di Fis. di Pavia. 1823. Avril. 131. (Zñh. Bull. un. I. 154).
- 468) Libri, Sur la théorie de la chaleur; Gräfe S. VII. 116.
- 469) Libri, Sur la théorie de la chaleur; *Libri* Memorie di Math. et Fis. 1827. 1 fasc. Pisa 1827. (Zñh. Bull. univ. XI. 121—124).
- 470) Biouville, Sur la théorie analytique de la chaleur; Ann. de Gerg. XXI. p. 133.
- 471) Poisson, Mémoire sur la distribution de la chaleur dans les corps solides; J. de l'école polyt. T. XII. cah. 19. p. 1. 145. 249. (Ausg. Bull. univ. II. 269; Bull. phil. 1815. p. 85; 1816. p. 11; 1820. p. 92; 1821. p. 177; Ann. de Ch. et de Ph. XIX. p. 337—349).
- 472) Poisson, Sur la chaleur rayonnante; Ann. de Ch. et de Ph. XXVI. 225—245.
- 473) Schitz, Grundgesetze der Wärme; Baumg. und Gtt. Zeitschr. VI. 138. 257.

- 474) Poisson, Discussion relative à la théorie de la chaleur rayonnante; Ann. de Ch. et de Ph. XXVIII. 37—55.
 475) Résumé de la discussion de *Fourier* et *Poisson* sur la chaleur rayonnante; Bull. univ. IV. p. 75—81; 135—140.

2. Temperatur des Erdbörpers und damit in Berührung stehende Probleme.

- 476) *Fourier*, Sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires; Mém. de l'Acad. VII. 570.
 477) *Fourier*, Remarques générales sur les températures du globe terrestre et des espaces planétaires; Ann. de Ch. et de Ph. XXVII. 136—166.
 478) *Fourier*, Sur le refroidissement séculaire du globe terrestre; (Ausg. Ann. de Ch. et de Ph. XIII. 418—436.).
 479) *Boory*, über die Temperatur der Atmosphäre in der Höhe; Phil. Mag. 1825. Août. p. 81; Oct. p. 242. (Ausg. Bull. un. V. 242).
 480) *Samé* und *Clapeyron*, Mémoire sur la solidification par refroidissement d'un globe liquide; Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 250 oder Bull. univ. XVI. 255—259).
 481) *Pagani*, Sur le mouvement de la chaleur dans une sphère composée de deux parties hétérogènes et concentriques; Quet. Corresp. math. IV. livr. 6. (Inh. Bull. un. XI. 163).
 482) *Poisson*, Sur la température des différens points de la terre et particulièrement près de sa surface; Connaiss. des temps pour 1827. p. 303. (Ausg. Bull. univ. III. 211—213).
 483) *Eralles*, über die Erwärmung der Erde von der Sonne; Berl. Abh. 1818—19. S. 57.

3. Temperatur der Gase.

- 484) *Ravier*, Sur la variation de température, qui accompagne les changemens de volume des gaz; Ann. de Ch. et de Ph. XVII. p. 372—379 oder Bull. philom. 1820. p. 97—101.
 485) *Poisson*, Sur la chaleur des gaz et des vapeurs; Ann. de Ch. et de Ph. XXIII. 337—352; 407—408.
 486) *Cantley*, Theory of the action of caloric in producing the expansion of Fluids and Solids, with a formula for the Modulus of Gravity; Brewster's Edinb. J. of sc. 1829. N. ser. Vol. I. 17.

4. Verschiedene, die Wärme betreffende, Probleme.

- 487) *Fourier*, Recherches expérimentales sur la faculté conductrice des corps minces soumis à l'action de la chaleur et description d'un nouveau thermomètre de contact; Ann. de Ch. et de Ph. XXXVII. 291—314 oder Pogg. XIII. 327—343.

- 488) Fourier, Sur la température des habitations et sur le mouvement varié de la chaleur dans les prismes rectangulaires; *Bullet. phil.* 1818. p. 1—11.
- 489) Navier, Note sur l'action mécanique des combustibles; *Ann. de Ch. et de Ph.* XVII. 357—379.
- 490) Poisson, Sur la distribution de la chaleur dans un anneau homogène et d'une épaisseur constante, lorsque la température du lieu; où il est placé, varie d'un point à un autre; *Connaiss. du temps.* 1826. p. 248. (*Ann. Bull. un.* II. 337.)

Verschiedenes.

- 491) Kriz, Die Höhe der Atmosphäre, mathematisch begründet; *Baumg. und Gtt. Zeitschr.* VIII. 420.

Verzeichniß der in- und ausländischen Schriften, welche seit 1829 über Physik, Mechanik und Meteorologie erschienen sind.

I. Allgemeine Lehr- und Wörterbücher der Physik*).

- 1) Masson de Granbsagne, Nouveau manuel complet de physique et de météorologie. Paris 1829. in-18. Fig. (Prix 6 Fr.)
- 2) Arnott (H.), Elemente der Physik oder Naturlehre, dargestellt ohne Hülfe der Mathematik. Nach der dritten Auflage aus dem Englischen übersezt; mit 9 Taf. Abbild. 1829. gr.-8°. 37 Bog. Weimar, Ind. Compt. (geh. 2 Thlr. 18 gl.).
- 3) Baumgartner (H.), Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande, mit Rücksicht auf mathematische Begründung. Dritte umgearbeitete und vermehrte Auflage; mit 8 Kupfertaf. in-Fol. 1829. gr.-8°. 50 Bogen. Wien, Feubner. (3 Thlr.).

*) Eine gute Literatur auch über die wichtigsten älteren physikalischen Lehrbücher und Journale wird man u. a. in Müncke's Handbuch der Naturlehre I. 17 ff. finden.

- 4) Baumgartner, (Andreas), Die Naturlehre nach ihrem gegenwärtigen Zustande, mit Rücksicht auf mathematische Begründung. Supplementband, den mathematischen und experimentellen Theil enthaltend. Wien 1830. 1831. bei Feubner. (Heidelberger Jahrb. 1831. Juli. 699).
- 5) Belli (Giuseppe), Corso elementare di Fisica sperimentale. Vol. I. Milan. 1830. della società tipografica de' classici italiani. (Prezzo 3,50 lir. austr.
- 6) Beudant (F. G.), Lehrbuch der Physik, nach der vierten französischen Originalausgabe, übersetzt von R. F. A. Hartmann, mit 15 lithogr. Taf. gr.-8°. 36 Bog. auf Druckpap. bei Brothaus (3 Thlr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Nr. 198. S. 1577).
- 7) Biot (J. B.), Lehrbuch der Experimentalphysik oder Erfahrungs-Naturlehre. Zweite Auflage der deutschen Bearbeitung, mit Hinzufügung der neuen und einheimischen Entdeckungen von G. Th. Fechner. 5 Bände mit Kupfern. 1828 bis 1830. (11 Thlr.).
- 8) Brandes (G. W.), Vorlesungen über die Naturlehre, zur Belehrung derer, denen es an mathematischen Vorkenntnissen fehlt. 3 Thle. 1830 bis 1831. Leipzig. Göschen. (Heidelb. Jahrb. 1831. Juli 727; — Leipz. Lit. Zeit. 1830. Juli. Nr. 181. S. 1441).
- 9) Desprez (G.), Traité élémentaire de physique, ouvrage adopté par le conseil royal de l'Instruction publique, pour l'enseignement dans les établissements de l'Université de France. Troisième édition, entièrement refondue et ornée de 16 planches, un très-fort volume in-8°. Prix broché 12 Fr. Paris 1832, chez Méquignon-Marvis, rue du Jardinets Nr. 13.
- 10) Desroches, Traité élémentaire de Chimie et de Physique. Paris 1830. 8°. avec des planches.
- 11) Eckerle (W. W.), Kleine Naturlehre zur Anregung und Begründung des religiösen Gefühls, für die Jugend und Jugendlehrer bearbeitet. 1831. gr.-8°. (8½ Bogen). Heidelberg. Schwab (Winter). (Preis 10 gl.).
- 12) Erley (Th.), Principles of natural philosophy; or a new theory of physics, founded on gravitation and applied in explaining the general properties of Matter, the phenomena of Chemistry, Electricity, Galvanism, Magnetism and Electromagnetism. 1829. 8vo. (price 14 sh.).
- 13) Fechner (G. Th.), Repertorium der Experimentalphysik, enthaltend eine vollständige Zusammenstellung der neuern Fortschritte dieser Wissenschaft. Als Supplement zu neuern Lehr- u. Wörterbüchern der Physik. 3 Bde. Leipzig, Bosc. 1832. (Leipz. Lit. Zeit. 1832. Mai. S. 857).
- 14) Fischer (G. G.), Mechanische Naturlehre im Auszuge, für den höhern Schulunterricht entworfen vom Prof. Dr. G. F. Aug u ft. 1829. 8°. 27 Bogen. Berlin, Nauf. (22 gl.).

- 5) Fischer (G.), *Physique mécanique. Traduite de l'Allemand avec des notes, par Biot. 4me édit. revue et augmentée. in-8°. de 35 feuilles avec 12 pl. Paris 1830. Bachelier. (7 fr. 50 c.).*
- 6) Fladung (J. A. H.), *Populäre Vorträge über Physik. Gehalten vor einem Kreise gebildeter Damen in den Gärten von Korompa; 2 Bändchen. — Auch unter dem Titel: Populäre Vorträge über Physik für Damen; 2 Bdchen. 16. 27½ Bogen mit vielen eingedructten Holzschnitten. Wien 1831. Bolkshäuser in Commiff. (1½ Thlr.).*
- 7) Foote (Dr. G.), *Lehrbuch der Physik, einfach und zum Selbstunterricht für Lehrer und Lernende abgefaßt. Mit 21 lithogr. Tafeln. 8°. 12 Bogen. Göttingen 1831. Käßler. geh. (21 gl.).*
- 8) Friedleben (Dr. Th.), *Populäre Experimentalphysik für angehende Mathematiker, Dilettanten und die Jugend. Erster Theil: Die allgemeine Physik. Mit 8 Stein tafeln, Zweiter und dritter Theil: Der speciellen Physik erste und zweite Abtheilung. Mit 8 Stein tafeln. (Die 3 Theile complet 2 Thlr.).*
- 9) Gehler (J. C. L.), *Physikalisches Wörterbuch, neu bearbeitet von Brandes, Gmelin, Horner, Muncke, Pfaff. 1829—1830. Fünfter Band, erste bis zweite Abtheilung, von H—K gehend, 1372 Seiten. Leipzig bei Schwikert.*
- 10) Kaffner (K. B. G.), *Grundzüge der Physik und Chemie, zum Gebrauch für höhere Lehranstalten und zum Selbstunterricht. Nürnberg bei Stein. Zweite Auflage erster Band. 1832.*
- 11) Kleine Naturgeschichte und Naturlehre für die Jugend, über alle Gegenstände der Natur, wie sie auf der Erde gefunden werden, wachsen, leben und erfunden worden sind. Mit 112 Holzschnitten und 1 illum. Titelkupfer. 8°. 14 Bog. München 1831. Lindauer. (geb. 12 gl.).
- 12) Lechevallier, *Cours de physique et de chimie industrielle. in-8°. Metz 1829. chez Me Thiel.*
- 13) Die Lehren der Physik in dialogischer Form. Zum Selbstunterricht und zum Gebrauch in Schulen, zunächst für die Jugend beiderlei Geschlechts. Aus dem Engl. nach der 4ten Auflage der *Conversations on natural philosophy*. Mit Zusätzen von Fr. Vogel. Zweite (wohlfeilere) Ausg. Mit 23 Kupf. 1830. gr.-8°. Darmstadt. Heyer.
- 14) Leuchs (J. E.), *Polytechnische Vorlesungen oder faßliche und praktische Darstellung der vorzüglichsten Lehren der Physik, Chemie u., Technologie u., ein Lehrbuch für Privatpersonen, für den Selbstunterricht und die häusliche Unterhaltung. Mit Holzschnitten. 1830. 8°. 26 Bog. Leuchs und Comp. (geh. 1 Thl.).*
- 15) Macvicar, *Elements of the Economy of Nature; or the principles of Physics, Chemistry and Physiology. Founded on the recently discovered phenomena of Light, Electro-Magnetism and Atomic-Chemistry. 8vo. 1831. Edinb. Black. (16 sh.).*

- handlung. 146 S. 4°. (16 gl.) (Leipzig. Liter. Zeit. 1830. Juli. Nr. 148. S. 1179).
- 44) Forstner (Alex. Frhr. v.), Lehrbuch der theoretischen Mechanik oder der Gleichgewichts- und Bewegungslehre fester, tropfbarer und luftförmiger Körper, so weit diese Lehren durch die Elementarmathematik vorgetragen werden können, mit Hinweisung auf die praktische Mechanik und auf die weitere Ausführung der Mechanik durch die höhere Mathematik. In 2 Bänden. Erster Band, enthaltend die Einleitung in die Mechanik, die allgemeine Statik, die Geostatik, Hydrostatik und Aerostatik. Mit 3 Kupfertaf. 1831. x und 483 S. in-8°. Berlin bei Fr. Baum. (Gött. gel. Anz. 1832. St. 41. S. 401. Bull. univ. XVI. 162).
- 45) Gerstner (F. J. v.), Handbuch der Mechanik, mit Beiträgen von neuen englischen Constructionen vermehrt. Erster Band in 4 Heften. Mechanik fester Körper. 653 S. in-4°. mit 40 Kupfertaf. in quer Fol. 1831. (Gött. gel. Anz. 1831. Nr. 175. — 176.); Zweiter Band, Mechanik flüssiger Körper, 2 Abtheilungen. 1832. (Prän. Pr. für 3 Bde mit 100 Kupfertaf. 24 Thlr.).
- 46) Hay (Sam.), A concise system of Mechanics in theory and practice etc. Edinb. 1829. Oliver et Boyd.
- 47) Lehmann (Dr. Jac. Wilh. Heinr.), Anfangsgründe der höhern Mechanik, nach der antiken, rein geometrischen Methode bearbeitet. Berlin bei Reimer. 1831. 620 S. 8°. mit 2 Steindrucktafeln. (3 Thlr.); (Berlin. Jahrb. der wiss. Kritik. 1831. Nov. Nr. 100.; Jen. Lit. Zeit. 1832. Jan. Nr. 17. 18. S. 130—138).
- 48) Meier (Dr. Christ. Ernst), Die Bedingungen und Gesetze des Gleichgewichts, nebst einem Versuch über die Ursachen der Ruhe und Bewegung der Körper. Zweite Ausgabe, mit einer Steindrucktaf. Erfurt, Knick 1830. x u. 221 S. 8°. (14 gl.) (Bed's Rep. 1830. IV. 224).
- 49) Roseley (H.), Treatise on Hydrostatics and Hydrodynamics for the Use of students in the University. Cambridge 1830.
- 50) Poinsot, Elemente der Statik, als Lehrbuch für den öffentlichen Unterricht und zum Selbststudium. Nach der 5ten Ausgabe aus dem Franz. überf. von Dr. J. G. Hartmann. 8°. 16 Bog. und 3 Steindrucktafeln in gr. 4°. 1831. Berlin, Rüder.
- 51) Young (H. R.), Elements of Mechanics comprehending the theory of Equilibrium and of Motion, and the first principles of Physical Astronomy; together with a variety of Statical and Dynamical Problems; by J. Souter, School Library. 78. St. Paul's Churchyard. (105. 6 d. in cloth.) 1832.

III. Meteorologische Literatur.

a) Allgemeine Schriften.

- Baillly (G.), *Résumé complet de Météorologie*; in-32. de 322 p. avec pl. Paris 1830. au Bureau de l'Encyclopédie portative.
- Bellingier (J. Ph.), *Das System der allgemeinen Witterungskunde und meteorologischer Prospectus der Jahre 1828 und 1829, nebst jenem des merkwürdigen Nachwinters von 1829 und 1830.* 1830. 8°. 3 Bogen. Coblenz, Peryt. (Wellsp. 16 gl.).
- Edmę (L. F.), *Lehrbuch der Meteorologie*; Halle in der Gebauer'schen Buchhandlung. 1831. 8°. Bb. I. mit 3 lithogr. Taf. xvi und 610 S. (Leipz. Lit. Zeit. 1832. Nr. 13. S. 98. Hall. Lit. Zeit. 1832. Nr. 44. S. 345. — 1832. Bb. II. mit 3. Taf. xx und 596 S.).
- Kastner (R. W. G.), *Handbuch der Meteorologie. Für Freunde der Naturwissenschaft.* In 2 Bänden: 2r. Bb. 2te Abth. mit 5 Kupfern. 1830. gr. 8°. 40½ Bogen. Erlangen, Palm und Enke. (2 Tpl. 20 gl.). (1r. Band und 2r. Band 1ste Abthell. ebenbas. 1823 und 1825 kosten 5½ Thlr.).
- Meteorik oder Witterungs- und Wetterkunde zur Erläuterung: alltäglicher Erscheinungen im Dufstkreife und deren Voraussicht. Aus dem Franz. überf. und nach den texturlichen Gründen und neuesten physischen Ansichten bearbeitet vom Prof. S. G. Dietmar. Mit 32 erläuternden Zeichnungen und colorirtem Plane zu einem Wettertelegraphen (auf 9 Stein tafeln). 8°. 1832. 22½ Bogen. Jünnenau, Voigt. (1 Tpl. 8 gl.).
- Molte (Dr. G.), *Die großen und merkwürdigen kosmisch-texturlichen Erscheinungen im Luftkreife unserer Erde in Folge 20jähriger Beobachtungen, auch in Beziehung zur Cholera dargestellt und beobachtet.* gr. 8°. 6½ Bogen. 1831. Hannover, Hahn'sche Buchhandl. (Druckvel. geh. 8 gl.).
- Schäbler (G.), *Untersuchungen über den Einfluss des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre, mit Nachweisung der Gesetze, nach welchen dieser Einfluss erfolgt.* Leipzig, bei Baumgärtner. 1830. iv und 94 S. in-8° mit 2 Kupfertaf. und mehreren Tabellen. (Leipz. Lit. 3. 1830. Dec. S. 2597; Beck's Repert. 1831. II. 441).
- Schäbler (G.), *Grundsätze der Meteorologie in näherer Beziehung auf Deutschlands Klima, mit 8 Kupfern, einer vergleichenden Thermometer-Scale und mehreren Tabellen.* (Ein integrierender Theil der allgemeinen Encyclopädie der gesammten Land- und Hauswirtschaft der Deutschen). Leipzig, in der Baumgärtner'schen Buchhandlung. 8°. 1831. 206 S. (Beck's Repert. 1831. II. 441).
- Sommer (Joh. Gottfr.), *Gemälde der physischen Welt; oder: Unterhaltende Darstellung der Himmels- und Erbkunde.* Nach den besten Forschern's Repertorium d. Experimentalphysik. III. 14

Wetter mit 26 Abbildungen. Nachsicht auf die neuesten Entdeckungen. Zweite, verbesserte und vermehrte Auflage IV. Band: Physikalische Beschreibung des Dunstkreises der Erdoberfl. 486 S. mit 4 Abbildungen und 2 Steinbrücken. VI. Band: Gemälde der organischen Welt. 2. Prag, bei Calve. 1830 und 1831. (Preis der 3 Bände 2 fl. 8 gr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1832. April S. 846).

- 51) *Beobachtungen über specielle Beobachtungen und Gegenstände der Meteorologie.*
- 52) *August, Über die Fortschritte der Hygrometrie in der neuesten Zeit. Eine vortragsmäßige Vorlesung nebst erläuternden Zusätzen und der Berechnung einiger Hygrometer. Beobachtungen, welche bei Gelegenheit der Reise des Freiherrn Alex. v. Humboldt im nördlichen Asien und an den Ufern des caspischen Meeres angestellt worden sind, mit einer Abbildung in Steinbr. 1830. gr. 4°. 4 Bogen. Berlin, Krautwein. (geb. 8 gl.).*
- 53) *August, Luftfeuchtigkeit und Cholera, ein meteorolog. Beitrag zur allgemeinen Charakteristik der Krankheit. Mit 1 Kupf. 4°. 3 Bogen. Berlin 1831, Krautwein. (geb. 12 gl.).*
- 54) *Bunsen (R. G.), Enumeratio ac descriptio hygrometrorum, quae inde a Saeculo temporibus proposita sunt. Commentatio praefata regio ornata Göttingae, apud Vandenhoeck et Ruprecht. 1830. 80 S. 4°. 10 S. Tafeln und 5 lithogr. Figurentaf. (1 Ablr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1831. April S. 750).*
- 55) *Collectanea meteorologica sub auspiciis societatis scientiarum Daniacae edita. fasc. I., continens observationes D. Newberi, Apenorae institutae. Hafniae 1829. 4°. (10malige Beobachtungen für jeden Tag aus dem Jahre vom Juni 1824 bis 1825 von Seite 1—181. Dann folgen die aus diesen Beobachtungen erhobenen Zusammenstellungen und Folgerungen von Schouw von S. 185—245).*
- 56) *Denkwürdigkeiten der berühmten Winter von 1740 und 1709. Nach meteorologischen Bemerkungen und Regeln, nach welchen besonders aus der Witterung des Winters auf die wahrscheinliche Witterung der folgenden Jahreszeiten zu schließen ist. Herausgeg. von E. G. v. F. 1830. 8°. 5 Bogen. Leipzig, Barth. (geb. 5 gl.) (Leipz. Lit. Zeit. 1830. Nr. 49. S. 389).*
- 57) *Dietmar, Der Polarschein oder das Nordlicht. Nach einer naturgemäßen Theorie erklärt. Mit 4 lithogr. colorirt. Zeichnungen. Berlin 1831. H. (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Juli S. 1432).*
- 58) *Weyling (Christ. Eudw.), Die Höhe Warburgs über dem Meere aus Barometerbeobachtungen berechnet. 1829. 64 S. 8°. (6 gl.) (Bells Mitth. 1830. IV. S. 286).*
- 59) *Kullisch (L.), Sammlung der vom 7. Mai 1817 bis 31 Decem-
ber 1827 im A. A. Conventgebäude nächst dem Piaristencollegium auf*

- der Kunstst. Prag Nr. C. 856. angestellten astronomischen, meteorologischen und physikalischen Beobachtungen. 1830. gr. 4°. 34 Bog. Prag, Calve. (3½ Thlr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1830. Jult. S. 1396).
- 6) Schubner (A.), *Observationes meteorologicae a Cal. Jun. 1824 ad Cal. Jun. 1825. Hafniae. 1829. xxiv und 245 S. 4°.* (Leipz. Liter. Zeit. 1830. Nr. 318).
- 7) Hopf (G.), *Enumeratio atque descriptio hygrometrarum, quae inde a Saenauril temporibus proposita sunt, additis formulis et tabulis, quarum ope vaporum, qui aëri atmosphaerico insunt, aquosorum vis elastica, densitas et copia determinari possunt. Commentatio, quam ampl. ord. phil. Gott. insigni cum laude ad praemium regium accessisse censuit. Gottingae, sumptibus Vandenhoeck et Repprecht. 1830. 57 S. 4°. 4 Bog. Kaf. und 8 lithogr. Figurentaf. (20 gl.)* (Leipz. Lit. Zeit. 1831. April S. 750).
- 8) Steiner (Dr. Jul. Ludw.), *über den Ursprung der Feuerfugeln und des Nordlichtes. gr. 8°. 6½ Bogen, Berlin, Th. Göschen. 1832. (12 gl.)*.
- 9) *Meteorologische Beobachtungen, angestellt zu Danzig in den Jahren 1807 bis 1830 von Dr. Miesfeld und vollständig herausgegeben von der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig. gr. 4°. 37½ Bog. Halle 1831. bei Neugeb. (5 Thlr.)*.
- 10) Ritzke (Ernst), *über Barometerbeobachtungen zu Bågon in den Jahren 1781 bis 1789. 1831. 37 S. 4°. Straßburg bei Ebner, (Halle Lit. Zeit. 1832. Jan. Nr. 17. S. 134).*
- 11) Schumöger (F. v.), *Tafeln für die Beobachter des Thermohygrometers. 1829. gr. 4°. 2 gedruckte und 3 lithographirte Bogen. Würzburg, Schöns.*

IV. Literatur über physikalisch-tellurische und kosmische Gegenstände.

- 1) Brandes (H. G.), *De cometarum caudis disquisitio mathematica. Pars I. Lips. 1830. (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Aug. S. 1552).*
- 2) Daubeny (G.), *Tabellarische Übersicht vulkanischer Erscheinungen, enthaltend ein Verzeichniß der feuerstehenden Berge und ihrer Ausbrüche, von der ältesten bis auf die gegenwärtige Zeit, nebst den damit zusammenhängenden bedeutendsten Erdbeben. Aus dem Engl. 1829. Imp. Fol. 1 Blatt, Weimar, geogr. Institut. (15 gl.)* (Mit beigezeichnet ist eine vergleichende und illuminirte Ansicht der Höhen der vulkanischen Berge).
- 3) Erman (Dr. Ab.), *Bericht an die Kön. Acad. der Wissenschaften zu Berlin, über die Fortsetzung seiner magnetischen Beobachtungen im*

Russischen Kissen durch den großen und atlantischen Ocean. (Abstr. aus Berghaus Annalen). Nebst 1 magnet. Karte in gr.-Fol. gr.8°. 2. Bog. Berlin 1830, Reimer. (geb. 10 gl.)

- 78) Girardin (M. G.), Considérations générales sur les volcans et examen critique des diverses théories, qui ont été successivement proposées pour expliquer les phénomènes volcaniques. Paris 1831. in-8°.

- 79) Humboldt (Alex. v.), Fragmens de géologie et de climatologie asiatiques. 2 vol. in-8°. Paris 1831. (Jah. Bibl. univ. 1831. Dec. p. 347).

- 80) Humboldt (Alex. v.), Fragments einer Geologie und Klimatologie Asiens. Aus d. Franz., mit Num., 1 Charte und 1 Tabelle vermehrt von Jul. Löwenberg. gr.-8°. 17½ Bogen. 2 Charten und 1 Tab. 1832. (geb. 2 Thlr.).

- 81) Klöben (Karl Friedrich), über die Gestalt und Urgeschichte der Erde, nebst den davon abhängenden Erscheinungen in astronomischer, geographischer, geographischer und physikalischer Hinsicht. Zweite vermehrte Auflage der Grundlinien zu einer Theorie der Erdgestaltung. Mit 6 illum. und schwarzen Kupfern. 1829. xxx und 384 S. 8°. Berlin bei Kaud. (Hall. Lit. Zeit. 1832. Febr. S. 231).

- 82) Pontécoulant (M. G. v.), Théorie analytique du système du monde. Paris 1829, Bachelier. 2 vol. in-8. (18 fr.).

- 83) Reuter (A. P.), Lehrbuch der mathematischen und physikalischen Geographie für Gymnasien. Kärnberg bei Schrag, mit 4 Kupferst. 1830. 8°. (1½ Thl.) (Hall. Lit. Zeit. 1831. Nr. 238, 239, 240).

- 84) Schmidt (J. G. G.), Lehrbuch der mathematischen und physikalischen Geographie. 2 Theile mit 4 Kupfern. 1830. gr.-8°. 70½ Bogen. Göttingen 1829. 1830. Vandenhoeck und Ruprecht. (4 Thl.) (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Nr. 103, 104. S. 877.; Hall. Lit. Zeit. 1831. Nr. 238. S. 457; Nr. 239. S. 466; Nr. 240. S. 473).

V. über Maße und Gewichte.

- 85) Abolp (J. G. B.), Theorie des Längen-, des Quadrat- und Klemen- und des Körper- und Schachtruthenmaßes, für angehende Geometer u., nebst Tafeln zum barometr. Höhenmessen und Vergleich der üblichen Thermometer, der Factoren von 1—10500; des Fuß-, Ellen-,achter-, Ruthen- und Meilenmaßes; des Selbes und der Münzfüße u., nebst mehreren anderen Reductionstabellen, Notizen und Nachrichten. 1829. 12. 12 Bog. und 6 Tab. Mainz, Neuberger. Leipzig, Hinrichs. (1 Thlr.).

- 6) **Challan (G.)**, Le Rhytolomètre, ou Tableau général des mesures de capacité, employées pour les liquides dans les principales villes d'Angleterre, d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Levant etc., mises en rapport avec l'hectolitre de France et entr'eux. in-18. de 10 feuilles f. 1831. à Marseille chez Anfonce et à Paris chez Lecointe, Quai des Augustins. Nr. 49. (4 fr.).
- 7) **Shelius (G. A.)**, Maß- und Gewichtsbuch. Dritte vom Verfasser selbst ganz umgearbeitete und sehr vermehrte Auflage. — Nach dessen Tode herausgegeben und mit Nachträgen begleitet von F. A. Hauschild. Mit einer Vorrede von H. L. Schumacher. gr.-8°. Frankfurt a. M. 1830. (2 Thlr. 8 gr. oder 4 fl. 8 Kr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Febr. S. 359).
- 8) **Jahn (G. A.)**, Tafeln zur Vergleichung der gebräuchlichen Thermometer- und Barometerscalen. 1830. gr.-12. 1 Bogen. Leipzig, Wof. (geh. 6 gr.).
- 9) **Riese (B.)**, Tafeln zur Berechnung der Höhenunterschiede aus beobachteten Barometer- und Thermometerständen, zum Gebrauche des k. k. militairisch-topographischen Bureau's für Meter-, Maß und hunderttheiliges Thermometer berechnet, mit 1 lithograph. Figur zur Correction für die Temperatur der freien Luft. Carlscruhe 1830, bei Braun. (16 gr.).

VI. Über Gleichgewichts- und Bewegungsercheinungen tropfbarer Flüssigkeiten.

- 10) **Bidone**, Mémoire sur la détermination théorique de la section contractée des veines liquides. Turin 1829.
- 11) **Bidone (G.)**, Expérience sur la forme et sur la direction des veines et des courans d'eau lancés par diverses ouvertures. in-4°. Turin 1829.
- 12) **Burbin**, Nouveau système d'écluses, évitant toute perte de forces vives, autrement dit, ne dépensant qu'un poids d'eau égal à celui des bateaux ascendans, et gagnant, au contraire, la même quantité de liquide à la descente de ces derniers. in-4°. de 31 pages, avec une planche gravée. Paris 1830. (Bericht darüber von Mallet im Bull. de la soc. d'encour. 1830. Oct. 391).
- 13) **Gmy (A. St.)**, Du mouvement des ondes et des travaux hydrauliques maritimes. 1 vol. in-4°. 183 pag. avec un atlas de 10 planches gravées. Paris 1831, chez Anselin.
- 14) **Gauß (G. G.)**, Principia generalia theoriae figurae fluidorum in statu aequilibril. Gott. sumt. Dieterich. 4°. 53 pag. 1830.

- 95) *Hydraulics*, in-8°. 1830. Londres. (6 *Pages* für jedes *Fest*).
 96) Knorr (Graf), *Disquisitiones quaedam de aestu maris*. Dissert. Barol. 1830. 23 pag. 4°. (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Nr. 311. S. 2437).
 97) Kossatz (H. B. K.), über die Bewegung des Wassers beim Ausflusse aus Behältern. Mit einer Figurentafel. 1830. in gr.-4°. gr.-8°. 5 Bog. Danzig bei Gerh. (geh. 12 gl.).
 98) Poisson (G. D.), *Nouvelle théorie de l'action capillaire*. Paris, Bachelier. 1831.
 99) Rudrauff (G. F.), Beiträge zur Hydrostatik und Aräometrie, angewandt auf die Ausübung der Apothekerkunst. Zweite Auflage. Mit 12 Stein tafeln. gr.-4°. Bern 1831. (1 *Thr.* 4 gl.).

über artesische Brunnen insbesondere.

- 100) Blume (J. K.), Die artesischen Brunnen. Dresden und Leipzig, bei Arnob. 1831. 31 S. 8°. (4 gl.) (Leipz. Lit. Zeit. 1831. Juli S. 1431).
 101) Girini, Delle pressioni idrostatiche a cui sono soggette le acque sotterranee anche in località non dominante de monti superiori, ossia cause idrostatiche-fisiche della forza saliente nei pozzi trivellati detti artesiani. Milano. 1831. presso Luigi Nervetti. in-8°. di p. 100.
 102) Héricart, Considérations géologiques et physiques sur la cause du jaillissement des eaux des puits forés ou fontaines artificielles etc. Paris 1829.
 103) Héricart, Concours sur le percement des puits forés à l'effet d'obtenir des eaux jaillissantes applicables aux besoins de l'agriculture. in-8°. 1830. chez veuve Huzard. 64 pag.
 104) Jacquin (J. v.), Die artesischen Brunnen in und um Wien, nebst Bemerkungen über dieselben von Paul Partsch; mit 1 lithograph. Tafel. 1831. 48 S. 8°. (8 gl.) (Jen. Lit. Zeit. 1832. Jan. S. 27).
 105) Poppe (J. F. M.), Die artesischen Brunnen, ihre Beschaffenheit, die Art ihrer Verfertigung und ihre Benützung, mit allen dazu gehörigen Instrumenten und Maschinen zum Bohren, Ausfüllern und gehörigem Einrichten dieser Brunnen als Spring-, Lauf- und Pumpbrunnen. Mit 3 Stein taf. 1830. 8°. 4½ Bog. (8 gl.). (Leipz. Liter. Zeit. 1831. Jan. S. 125).
 106) Spegler (J. K.), Anleitung zur Anlage artesischer Brunnen. Mit 6 Stein tafeln. Rubei bei Rohden. 1832. 90 S. 8°. (18 gl.) (Leipz. Lit. Zeit. 1832. März. S. 506; Gött. gel. Anz. 1832. den 19. April S. 623).
 107) Waldauf v. Waldenstein (J.), Die neuesten Beobachtungen und Erfahrungen von Garnier, Héricart de Thury, Baillet, Dmalius d'Halloy, Flachet, Beurrier, v. Bruckmann u. A. m. über die Anlage der artesischen Brunnen. Als Anhang und Nachtrag zur Übersetzung von Garnier's Preischrift, über die An-

Anwendung des Bergbohrers, zur Auffuchung von Brunnengässen. Mit lithogr. Tafeln. Wien bei Bed. 1831. 192 S. 8°. (1 Tpl. 8 gl.) (Eripz. Lit. Jdt. 1832. März S. 506).

II. Über Gleichgewichts- und Bewegungsercheinungen und Widerstand gasförmiger Körper.

- 1) Benzenberg, über die Dalton'sche Theorie. 8°. 192 S. mit 3 Kupfertafeln. Düsseldorf 1830, Schaub. (Gött. gel. Anz. 1830. St. 196. S. 1945; Bull. univ. 1831. Nov. 249).
- 2) Dirksen (G. F.), über die mechanische Beschaffenheit der elastischen Flüssigkeiten. 1830. 27 S. 4°. Berlin. (Hall. Lit. Zeit. 1832. Febr. Nr. 37. S. 289).
- 3) Fanchette, Notice historique sur les machines à vapeurs. in-8°. Paris 1829.
- 4) Fanchette, Histoire des Machines à vapeurs, depuis leur origine jusqu'à nos jours. in-8°. Paris 1830. (Bull. des sc. techn. XV. 50).
- 5) Mémoire sur la direction des aérostats. in-8°. 1½ feuille. Impr. de Feissat. Marseille.
- 6) Rumford (Benj. v.), Versuche mit dem ballistischen Pendel, die Geschwindigkeit geschossener Körper zu bestimmen. Nach dessen Philosoph. papers aus dem Engl. überfetzt durch Köblich. 1830. gr. 8°. 5½ Bogen und 4 Steintafeln in quer gr. Fol. Berlin, Reimer. (Wellenp. 1 Tpl. 4 gl.).
- 7) Schmidt (J. E. G.), Theorie des Widerstandes der Luft bei der Bewegung der Körper. Göttingen 1831. Mit einer Kupfertafel. 8°. 71 Seiten.
- 8) Bronski, Complément de la nouvelle théorie mathématique des machines à vapeurs. in-4°. Paris 1829. Didot aîné. 4 feuilles.

VIII. Über Imponderabillen.

- a) über mehrere Imponderabillen gemeinschaftlich.
- 1) Peytavin (J. B.), Essai sur la constitution physique des fluides élastiques et magnétiques. Paris 1830. 8°.
- 2) Pohl (G. F.), Ansichten und Ergebnisse über Magnetismus, Electricität und Chemismus. Ein Bericht an das größere naturwissenschaftliche Publicum. Auszugsweise vorgetragen in der Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte zu Berlin. 1829. 8°. 6½ Bogen. Berlin, Dammier. (geh. 8 gl.).

- 118) Thomson, Outline of the sciences of Heat and Electricity. 1830. 8°.

b) über gewöhnliche Elektricität.

- 119) Schmidtman (J. L.), über Blitzableiter. Eine Abhandlung auf höchsten Befehl ausgearbeitet. Neue Auflage von Dr. G. Fr. Bucherer. 1839. Mit einer gr. 4° Tafel illum. Abbildung in Steindruck. gr. 8°. 6½ Bogen. Karlsruhe, Braun. (14 gl.).
- 120) Murray (John), Traité sur atmosphérique electricity, incl. obs. on lightning-Rods and Paragrées. London 1828. 8°; 2me éd. 1830.
- 121) Murray (J.), Manuel de l'électricité atmosphérique, comprenant les instructions nécessaires pour établir les paratonnerres et les paragrées. Traduit par Riffault. in-12 de 264 pages, avec 2 pl., faisant partie de la collection des Manuels, Paris 1831, Roret (Bull. univ. 1831, Juillet, 20).
- 122) Preibsch (Christian), über Blitzableiter, deren Nützlichkeit und Anlegung. Zur Belehrung und zum Unterricht für den Bürger und Landmann. Mit erläuternder Abbildung. Zweite, viel vermehrte und verbesserte Auflage. Leipzig und Bittau, bei Schöps. 1830. 46 S. 8°. (Leipz. Lit. Zeit. 1830. Aug. Nr. 191. S. 1528).
- 123) Schöbentrop (S.), über die Blitzröhren oder Fulguriten, und besonders über das Vorkommen derselben am Regenstein bei Blankenburg. Braunschweig, bei Vieweg. 1830. 46 S. 8°. 1 Taf. (8 gl.).
- 124) Roth (J. J.), De electricitatis in organismum humanum effectu, diss. physiologico-pathologica. Monachii 1829.
- 125) Saur (Dr. L.), Betrachtungen über die Elektricität. 8°. 5 Bogen. Berlin, L. Schmitze in Commis. 1831. (8 gl.).
- 126) Weber (Dr. Jos. v.), Der Elektrophor in seiner Vervollständigung und Zurückführung seiner Erscheinungen auf bestimmte Gesetze. München bei Anton Weber. 1831.

c) über Galvanismus.

- 127) Fechner (Gust. Theob.), Maßbestimmungen über die galvanische Kette. Mit 1 lithogr. Tafel. Leipzig bei Brockhaus. 1831. xii und 260 S. 4°. (3 Tlfr.) (Leipz. Lit. Zeit. 1832. Mai S. 993).
- 128) Fischer (N. W.), Verhältnis der chemischen Verwandtschaft zur galvanischen Elektricität, in Versuchen dargestellt. 1830. gr. 8°. 5½ Bogen und 1 Tab. Berlin, Schlesinger. (1½ Tlfr.).
- 129) Marianini (Dr. Stephan), Memoria sopra la teoria chimica degli elettromotori voltiani semplici e composti. Venezia 1829 della tipographia di Alvisopoli. in-8vo.

d) über Magnetismus.

- 130) Secker (L. A.), Der mineralische Magnetismus und seine Anwendung in der Heilkunst. Mühlhausen bei Heinrichshofen. 1829. 203 S. 8°. (Leipz. Lit. Zeit. 1830. Mai Nr. 113. S. 397).

- 131) Magnetism. in-8°. 64 pages. Londres 1831. (Bull. univ. 1831. Juin. 336).

e) über Elektromagnetismus.

- 132) Rechner (G. Th.), Elementarlehrbuch des Elektromagnetismus, nebst Beschreibung der hauptsächlichsten elektro-magnetischen Apparate. Mit 4 Kupf. 1830. gr.-8. 10 $\frac{1}{2}$ Bog. Leipzig, Bosh. (1 Thlr. 12 gr.).
- 133) Pohl (G. F.), Der Elektro-Magnetismus, theoretisch-praktisch dargestellt. Erste Abth. mit 3 Kupfern. Berlin 1830, bei Duncker und Humblot. (Bull. des sc. math. 1831. Juin. p. 331).
- 134) Schelling (Fr. W. F. v.), über Faraday's neueste Entdeckung, zur öffentlichen Sitzung der Kön. Academie der Wissenschaften am 8. März 1832. München 1832. 8°. 31 S. (4 gr.).
- 135) Watkins (Fr.), A popular sketch of electro-magnetism, or electro-dynamics, with outlines of electricity and magnetism. 8°. with plates. London 1832. (3 sh.).

f) über Licht.

- 136) Brewster (David), A treatise on optics. London 1831. 8°. 383 S. mit 177 in den Text eingedruckten Holzschnitten. (6 Sh.) (Ge hört zu Farbnar's Cabinet Cyclopaedia). (Berl. Jahrb. 1832. März S. 469. 473).
- 137) Chevallier (G.), Notice sur l'usage des chambres obscures et des chambres claires, contenant la description et l'emploi des meilleurs appareils de ce genre, des modifications, dont ils ont été l'objet, ainsi que les mémoires publiés à ce sujet par le Dr. Wollaston et le professeur Amici. Documents utiles à toutes les personnes, qui s'occupent du dessin d'après la nature. in-8°. de 100 p. avec 4 pl. Paris 1829, Vincent et C. Chevallier, opticiens, quai d'horloge. Nr. 69.
- 138) Coddington (G.), A treatise on the reflexion and refraction of Light being Part. I. of a System of Optics. 8°. Cambr. 1829.
- 139) Coddington, A treatise on the eye, and on Optical Instruments being Part. II. of a System of Optics. 8°. Cambr. 1830.
- 140) Crum (Walter), An experimental inquiry into the number and properties of the primary colours, and the source of colour in the prism. Glasgow, Ackinson et Comp.; London, Longmann et Comp.; Paris, Treuttel et Würtz; Berlin, Dümmler. 1830. 47 S. gr.-8°. mit illum. Kupfern.
- 141) Davenport (R.), Supplement to „The Amateur's Perspective.“ London 1829. 4°. pag. 64.
- 142) Double refraction and polarisation of Light. in-8°. 2 liv. 64 pag. London 1829. (Bull. univ. 1831. Juin p. 334).
- 143) Entdeckung der Convergenz des Sonnenlichtes, indem es die Atmo-

- spätere durchdringt. Mit einer Stein Tafel. 1830. gr.-8°. 4 Bog. Schpig, Weidmann. (geh. 12 gl.).
- 144) Herschel, *Traité de la lumière, traduit de l'Anglais avec notes par P. F. Verhulst et A. Quetelet.* 2 Tom. Paris 1829.
- 145) Herschel (J. F. W.), *Vom Lichte.* Aus dem Englischen übersetzt, von Dr. J. E. Ed. Schmidt. Mit 11 lithogr. Tafeln. gr.-8°. 43½ Bogen. Stuttgart und Tübingen, Cotta 1831. (3 Thlr.).
- 146) Holland (James), *The Herschelian, or Companion to the telescope etc.* Part. I. (Orion und Hase). gr.-Fol. London 1831, Longmann und Comp. (5 Sh.) (Inß. Bull. univ. XV. 278).
- 147) Holze (J. A.), *Disquisitio de acie oculi dextri et sinistri, in mille ducentis hominibus sexu, aetate et vitae ratione diversis examinata.* Dissert. inaug. med. Lips. 1830.
- 148) Kitzrow, *Dioptrik oder Anleitung zur Verfertigung von Fernrohren.* Wien 1830.
- 149) Lloyd (Humphrey), *A treatise on light and vision.* 8° 1831. — 15 pag. cloth.
- 150) Michaelis (G. A.), *über das Sechten der Oeffen, nach eigenen Beobachtungen, nebst einigen Bemerkungen über diese Erscheinung in anderen Thieren.* Mit einem Vorworte von Pfaff. Mit 2 Kupfertafeln in gr.-4°. 1830. gr.-8°. 3¼ Bogen. Hamburg, Perthes und Besser. (10 gl.).
- 151) Newton's *Optics.* in-8. 64 pag. 1829—1830. (Bull. univ. 1831. Juin. p. 333).
- 152) Plateau (J.), *Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la vue;* 32 p. in-8°. Liège 1829, Dessain.
- 153) Rour (Jacob), *Die Farben.* Drittes Heft. Heidelberg, Winter.
- 154) Schaffer (J. F.), *Versuch einer Beantwortung der von der mathematisch-physikalischen Klasse der Academie der Wissenschaften zu St. Petersburg aufgegebenen Preisfrage über das Licht; bearbeitet als 1r Theil eines Systems der Physik.* Mit 1 Stein Tafel. 1830. gr.-8°. 7¼ Bogen. Bremen, Heyse in Comm. (16 gl.). (Leipz. Lit. Zeit. 1830. Juli Nr. 175. S. 1393).
- 155) Tourtual (C. Th.), *über die Erscheinung des Schattens und deren physiologische Bedingung, nebst Bemerkungen, die wechselseitigen Verhältnisse der Farben betreffend.* Mit 1 Kupfer. 1830. gr.-8°. 3¼ Bog. Berlin, Reimer. (18 gl.).
- 156) Wedel (G. W. U.), *über optische Täuschungen und deren Grund, Ursachen in den Erscheinungen am Himmel und auf unserer Erde.* Ein Resultat vieljähriger Studien und Forschungen in der Natur, wodurch er zur Entdeckung eines naturgemäßen Erbsystems, der Erfindung eines der englischen Preisaufgabe vollkommen entsprechenden Längengradwessers, der Erfindung eines alle die Erde betreffenden Na-

Entscheidungen enthalten und anschaulich machenden Bildern, und der Erkenntniß des Ursprunges des bisher geherrschten Irrthums in obgedachtem wichtigen Zweige der Naturwissenschaft gelangt ist. 1830. gr.-8°. Altona 1829. Leipzig, Stein. (12 gl.).

g) über Wärme.

157) Bresson, De la chaleur, spécialement appliquée à l'industrie manufacturière. 1. et 2. liv. Paris 1829, chez Crochard.

158) Schöpfert (F. R.), über die Wärmeentwicklung in Pflanzen, deren Gefrieren und Schutzmittel gegen dasselbe. Breslau, bei Jos. May und Comp. 1830. (1 Thlr. 16 gl.) (Leipz. Liter. Zeit. 1831. April. Seite 649).

159) Peclet (E.), über die Wärme und deren Verwendung in den Künsten und Gewerben. Ein vollständiges und nöthiges Handbuch für Physiker, Technologen, Fabrikanten, Mechaniker, Architekten, Forst- und Hüttenmänner u. Aus dem Franz., mit den nöthigen Zusätzen für Deutschland versehen von Dr. C. F. A. Hartmann. Braunschweig, Vieweg. gr.-8°. 1r Theil mit 7 lithogr. Tafeln. 1830. (1½ Thlr.) (Erdmann's Journ. VII. 476; Leipz. Lit. Zeit. 1831. Mai. Seite 921).

160) Traité complet des thermomètres-pyromètres, offrant l'histoire, la théorie et la pratique des instrumens, qui donnent la mesure de la chaleur avec la construction et l'application de ces instrumens etc., traduit de l'anglais par N. E. Pelouze. in-8°. de 10 feuilles. Paris 1829, Fortin.

IX. über verschiedene physikalische Gegenstände.

161) Boullay (Polydore), Dissertation sur le volume des atomes et sur les modifications, qu'il subit dans les combinaisons chimiques. Première thèse soutenue devant la faculté des sciences de Paris, pour obtenir le grade de docteur Paris 1830. 8°.

162) Braun (R.), Mikroskopische Beobachtungen, welche in den Monaten Juni bis August 1827 gemacht worden, über die Theilchen, welche im Pollen der Pflanze enthalten sind, und die allgemeine Organisation selbstständig beweglicher Molecule in organischen und unorganischen Körpern. Aus der engl. nicht in den Buchhandel gekommenen Ueberschrift ins Deutsche übertragen von Bettschmidt. 8°. 1½ Bogen. Rürnberg, Krieger und Wiesner. (geh. 4 gl.) (Bot's Repert. 11r Jahrg. III. 67).

163) Grädner (Dr. R.), Frictionstheorie. über die Ursache der Entstehung der Weltklimaerdatmosphären, deren Verschleidenheit in Ausbre-

Namenregister der Verfasser der von Seite 168 an angeführten mathematisch-physikalischen Abhandlungen.

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abel , 1. 205. | 74. 81—83. 85—91. 95—101. |
| Airy , 142. 149. 150. 181. 215. 398. | 106—115. 161. 167. 195. 232. |
| Ampère , 9. 71. 249. 872 — 877. | 262. 263. 290—293. 321. 328. |
| 380. | 389—392. |
| Aperian , 94. | Bellis , 196. 294. 295. 329—331. |
| Arago , 408. 444. | 399. 400. |
| August , 518. | Charles , 48. 49. 60. 413. 414. |
| Avogadro , 319. | Claperton , 103. 430. |
| Babinet , 409. | Coranetz , 296. |
| Bachier , 250. 252. 288. 315. | Coriolis , 347. |
| Baché , 368. | Cotte , 348. |
| Bary , 364. 443. | Cournot , 42. 233. 253. 264. |
| Behr , 231. | Dallari , 322. |
| Bélanger , 283. | Dandelin , 425. |
| Bérard , 238. | Deffers , 3. 17. |
| Bessier , 163. 164. 216. | Dichtlet , 4. |
| Béguyer , 362. 457. | Dürfen , 18. 53. 325. |
| Binet , 34. 58. 72. 105. 164. | Doolittle , 349. |
| Biot , 182. 424. 444. | Drobisch , 152. |
| Bouillier , 213. 237. | Dubuat , 38. |
| Bordoni , 412. | Ende , 168. |
| Bouvard , 320. | Euler , 204. |
| Briffon , 10. | Everest , 217. |
| Burkhardt , 166. | Eytelwein , 12. 239. 297—299. 350. |
| Busse , 208. | —352. |
| Cardinal , 238. | Fergola , 156. |
| Gauchy , 2. 11. 16. 20. 21. 35 — | Fischer , 381. 445. |
| 37. 46. 47. 50 — 52. 59. 73. | |

- Forster, 433.
 Fourier, 22. 116. 240. 459—466.
 475. 476—478. 487. 488.
 François, 218. 446. 447.
 Fraunhofer, 426.
 Fresnel, 393. 397. 401—407. 410.
 Fusinieri, 467.
 Fuß, 205.
 Galbraith, 206.
 Garnier, 353.
 Gauß, 23. 24. 39. 265. 276.
 Gergonne, 102. 241. 382. 427.
 Germain, 117.
 Gerstner, 354.
 Girard, 277. 278. 300—302. 344.
 345. 355. 356.
 Gomperß, 219.
 Grunert, 207.
 Hachette, 448. 449.
 Hauber, 25. 26.
 Jacobi, 5. 13.
 Ivory, 27. 149. 151. 183—185.
 188. 189. 197. 266—269. 332.
 333. 434. 435. 479.
 King, 61.
 Knorr, 153.
 Krjiz, 491.
 Katterbauer, 357.
 Lagrange, 31. 143. 169. 394.
 Lambert, 415.
 Lamé, 103. 480.
 Lamont, 198.
 Laplace, 6. 14. 118—120. 144. 154.
 170. 171. 186. 199. 220—222.
 279—282. 324. 334. 335. 437.
 Legendre, 7. 23. 75. 145. 157.
 Schmus, 254.
 Lehot, 450.
 Lenthéric, 213.
 Levy, 54.
 Libri, 468. 469.
 Lint, 104.
 Liouville, 378. 470.
 Littrow, 29. 158. 190. 461.
 Lloyd, 62.
 Lubbock, 172. 200. 223.
 Malus, 383.
 Mayer, 325.
 Masetti, 244.
 Merian, 304.
 Mile, 428.
 Möbius, 40. 55.
 Monge, 121.
 Mosely, 305.
 Mossotti, 306.
 Navier, 43. 122—123. 141. 234.
 245. 307. 308. 346. 484. 489.
 Newport, 246.
 Nulty, 224.
 Ohm, 363. 364.
 Olbers, 436.
 Ostrogradsky, 32. 84. 146.
 Paganí, 126—132. 255. 256. 270.
 481.
 Parrot, 155.
 Pander, 83.
 Peirce, 44. 233. 234.
 Piola, 133. 159. 209—212. 247.
 309.
 Plana, 134. 173. 438.
 Poinsot, 64—67. 201.
 Poisson, 8. 15. 19. 30. 33. 56. 57.
 58. 76—79. 92. 135—141. 147.
 149. 174—178. 208. 235—239.
 257. 258. 271. 272. 285. 286.
 310—312. 316. 336—343. 359.
 365. 366. 369—371. 395. 396.
 452. 471. 472. 474. 475. 482.
 485. 490.
 Poletti, 160.
 Poncelet, 359. 360.
 Poselger, 187.

Pouillet, 416.
 Power, 45.
 Prevost, 453.
 Puissant, 191—194. 454.
 Puzelet, 179. 417—421. 455.
 Rive, 422.
 Rogg, 326.
 Rubberg, 287. 313. 456.
 Sankey, 486.
 Sarrus, 317.
 Savary, 379.
 Schitto, 473.
 Schleiermacher, 384. 385.
 Schmidt, 327.
 Scholz, 273.
 Schubert, 41.
 Schulten, 235. 259. 386.
 Schumacher, 436.
 Sharpe, 148.
 Sorlin, 387.

Spooner, 430.
 Spunar, 458.
 Strong, 162.
 Swanberg, 431.
 Lebenat, 260. 261.
 Zimmerhans, 214. 423.
 Tralles, 69. 483.
 Trebholz, 274. 314.

Unbekannte, 242. 243. 439. 440.
 Utting, 180.
 Vallès, 70.
 Vène, 93. 248.
 Vernier, 367.
 Whewell, 80.
 Wolkmann, 275.
 Wrebe, 432.
 Young, 411. 441.
 Zach, 442.

Namenregister der Verfasser der von Seite 203 an angeführten physikalischen Schriften.

Abolp, 85.
 Aaffon, 1.
 Adott, 2. 39.
 August, 61. 62.
 Baily, 52.
 Baumgärtner, 5. 4.
 Bauer, 130.
 Bähr, 5.
 Benzenberg, 108.
 Beudant, 6.
 Bidone, 90. 91.
 Biot, 7.

Blume, 100.
 Böckmann, 119.
 Boullay, 161.
 Branses, 3. 75.
 Breffon, 157.
 Bröder, 40.
 Brewster, 136.
 Brit, 41.
 Brown, 162.
 Bunfen, 63.
 Burbin, 92.
 Chailan, 86.

- Ohellius, 37.
 Chevallier, 137.
 Cirini, 101.
 Coddington, 138. 139.
 Cournot, 42.
 Crum, 140.
 Cuvier, 170.
 Daubeng, 76.
 Davenport, 141.
 Desprez, 9.
 Desroches, 10.
 Dietmar, 56. 66.
 Dirksen, 109.
 Ederle, 11.
 Emy, 93.
 Erman, 77.
 Erley, 12.
 Fehner, 13. 127. 132.
 Fischer, 14. 15. 123.
 Fladung, 16.
 Foote, 17.
 Förster, 43.
 Forstner, 44.
 Friedleben, 18.
 Gauß, 94.
 Gehler, 19.
 Gerling, 67.
 Gerstner, 45.
 Girardin, 78.
 Göppert, 158.
 Gräbner, 163.
 Hachette, 110.
 Hallaschka, 68.
 Hartmann, 159.
 Hay, 46.
 Hellinger, 53.
 Hericourt, 102. 103.
 Herschel, 144. 145.
 Heubner, 69.
 Holland, 146.
 Holke, 147.
 Hopf, 70.
 Humboldt, 79. 80.
 Jahn, 88.
 Jacquin, 104.
 Jelsker, 71.
 Kämig, 54.
 Kastner, 20. 55.
 Kleefeld, 72.
 Kloben, 81.
 Klose, 89.
 Knorr, 96.
 Kossac, 97.
 Lagerhielm, 164.
 Lechevallier, 22.
 Lehmann, 47.
 Leuchs, 24.
 Libri, 165.
 Littrow, 148.
 Lloyd, 149.
 Lbny, 166.
 Macvicar, 25.
 Marianini, 125.
 Marr, 173.
 Meier, 48.
 Michaelis, 150.
 Michl, 26.
 Moselen, 49.
 Müncke, 27. 28.
 Murray, 120. 121.
 Neuber, 64.
 Neumann, 29.
 Neuton, 150.
 Nicholson, 167.
 Nizze, 73.
 Nolte, 57.
 Paris, 174.
 Pectet, 30. 159.
 Peitavin, 116.
 Pelouze, 160.
 Plateau, 152.

Pohl, 117. 133.
 Poinset, 49.
 Poisson, 98.
 Pontecoulant, 82.
 Poppe, 81. 105.
 Pouillet, 82.
 Preibsch, 122.

Reuter, 83.
 Ribbentrop, 123.
 Rirner, 176.
 Röttger, 177.
 Roth, 124.
 Rouvroy, 33.
 Rour, 153.
 Rubrauff, 99.
 Rumford, 113.

Saur, 125.
 Schaffer, 154.
 Schelling, 134.

Schmidt, 84. 84. 114. 145.
 Schmidtger, 74.
 Scholz, 85.
 Schöbler, 58. 89.
 Söber, 176.
 Sommer, 60.
 Speßler, 106.
 Steffens, 178.

Thomson, 178.
 Tourtual, 155.
 Thurner, 87.

Bogel, 23.

Balhaus, 107.
 Baffins, 135.
 Beber, 126.
 Bebel, 156.
 Bronski, 115.

Young, 51.

Literatur der Abhandlungen, welche wegen zu spätem Erscheins in dieser Lieferung des Repertoriuns nicht haben aufgenommen werden können*).

Diese Literatur ist in Bezug auf die vornehmsten Journale fortgeführt bis zu:

- Pogg. Ann. XXIV. Heft 4.
- Schweigg. J. LXV. Heft 3.
- Rastner's Archiv für Chemie und Meteorologie**). V. Heft 1.
- Ann. de Ch. et de Ph. XLIX. Märzheft 1832.
- Bibl. univ. 1832. Février.
- Bull. univ. des sc. math. et phys. 1831. Nov.
- Jameson's Edinb. N. phil. J. Oct.—April. 1832.
- Brewster's Edinb. J. of sc. 1832. April.
- Phil. mag. 1832. Mai.
- Phil. transact. 1831. P. I.

Mechanische Physik.

- Mugst, über einige isochronische Schwingungen elastischer Fäden; in 2 Abhandl. physikal. und mathemat. Inhalts. Berlin 1829.
- Babinet, über Anwendung der Undulationslängen zu Feststellung eines absoluten Maasses; Pogg. XV. 514.
- Barlow, Versuche über die Rigidity und Stärke verschiedener Holzarten.
- Benoit, Hygrometer aus Papier; Dingler's polyt. J. XXXV. 262.
- Bouan, Versuche über den Corfionsmodulus; Phil. transact. 1829. P. I. p. 127.
- Brown, Versuche über die Rigidity und Stärke verschiedener Holzarten; Bibl. univ. 1832. Janv. p. 109.

*) Auch einige übersehene Abhandlungen sind hier mit aufgeführt.

**) Mit Rastn. R. Arch. im folgenden Heftdruck.

Shallis, Versuche über die Zusammendrückbarkeit der Materie, aus welcher der Erdborn besteht; Phil. mag. 1831. Sept. 200.

Condensation des Quecksübers durch Druck; J. of the royal Instit. Nr. 4. p. 128.

Dove, Einige Bemerkungen über Gase und Dämpfe.

Dulong, Barometer mit ebener oder concaver Fläche des Quecksübers; Baumg. X. 234.

Carle, über die Ursachen der Explosionen von Dampfkesseln; Dingler's polyt. J. XLIII. 242.

Guch, über einen Fall von Rotationsbewegung; Schweigg. LXII. 237.
Sphygmeter aus Schwamm mit Pottascheadschnig; Dingler's polyt. Journ. XXXVI. 131.

Johnston, Beschreibung des Rotastops, eines Instrumentes zur Darstellung und Erläuterung verschiedener Gesetze der Drehungsbewegung; Silliman's J. XXI. 265.

Krystallisation; Pogg. XVIII. 169. — Daniell J. of the royal Inst. Nr. 4. p. 30.

Lamé, Versuche über die Stärke des russ. Eisendrahtes; Dingl. polyt. J. XXXV. 354.

Lechevallier, über Bewegung der Flüssigkeiten; Bull. univ. 1831. Févr. p. 98.

G. M., Neuer mechanischer Versuch; Bibl. univ. 1831. Août. p. 443.

Marr, über Schwefelkohlenstoffdampf; Schweigg. J. LXII. 460.

Meyer, über die Haltbarkeit der verschiedenen Knochensorten; Erbm. J. VII. 142.

Mitchell, über das Durchdringen der Gase durch Gattungsdoorn. of the royal Instit. Nr. 4. p. 101.

Niemann, über die Spannkraft von condensirten sauren und böhrensauren Gasen; Pharmac. Centralbl. III. 207.

Parrot, Instrument zum Maß der Zusammenrückung des Wassers in großen Meeressiefen; J. of the royal Inst. Nr. 4. p. 130.

Pictet, Versuche über die Congregethen Brandealäch; Bibl. univ. 1832. Janv. p. 110.

Poggendorf, Zur Erklärung der von Poncelet beobachteten Erscheinungen stehender Wellen; Pogg. XXII. 598.

Poisson, über die gleichzeitigen Bewegungen des Pendels und der umgebenden Luft; Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 242.

Prinssep, über das Zustandekommen von Legierungen in flüssigem Zustand; Pogg. XIV. 526.

Stennie, Versuche über die Reibung; Phil. transact. 1829. P. I. p. 127.

Robinson, Transportabler Barometer; Dingler's polyt. Journ. XLI. 152.

Rostriß und Hartley, Versuche über die Reibung an Wagenrädern; Dingl. polyt. J. XXXV. 146.

- Sabine, Versuche zur Bestimmung der Correction wegen der Temperatur beim Pendel; Phil. transact. 1830. P. II. p. 229. (Bull. univ. XV. 185).
- Schweigger und Bach, über Endosmose und Exosmose; Schweigg. J. LVIII. 1.
- Shires Verfahren, kleine Winkel zu messen; Dingler's polyt. Journ. XL. 339.
- Thilorier, über eine neue Pumpe zur Compression oder Verdichtung der Gase; Dingl. polyt. J. XLIV. 12.
- R. J. R., Vorschlag zu einer neuen verbesserten Luftpumpe; Dingl. polyt. J. XLIV. 10.
- über eine doppelt wirkende Luftpumpe; J. of the royal Instit. Nr. 5. 31. oder Fror. Notiz. Nr. 1. XXXIII.
- Neue Luftpumpe von Körner; Kasin. N. Arch. IV. 93.
- Willis, über den Druck, welchen eine ebene Platte erleidet, die einem, aus einer Öffnung in einer Ebene herausströmenden, Luftstrome entgegengehalten wird; Transact. of the Cambridge phil. soc. Vol. III. P. I. p. 341.
- Zavabovsky, über den Widerstand des Holzes; Bull. univ. des sc. technol. XVII. 278.
- Zinken, Aëriometer; Pogg. XXII. 233.
- über die Schnelligkeit des Fluges bei Insecten; Fror. Notiz. Nr. 1. des XXXIII. Bandes.

Schall.

- Babinet, über die Schallleitung des Wassers; Pogg. XXIII. 447.
- Bennati, Savart, Cagnard-Latour, Versuche bei Gelegenheit einer Schallrohrklopfessfel angestellt; Fror. Notiz. 10. des XXXII. Bandes S. 153.
- Blackburn, Beschreibung eines parabolischen Schallbrets an der Kanzel der Aitercliffe Kirche; Dingl. polyt. J. XXXV. 272.
- Cagnard-Latour, über die Töne der Sirene; Pogg. XXIII. 443.
- Faraday, über eine besondere Klasse von Klangfiguren. 11.; Ann. de Ch. et de Ph. XLIX. 46.
- Hallström, über Combinationstöne; Pogg. XXIV.
- Latour, über den Ton, den das Pfeifen mit dem Rinde hervorbringt; Magendie Journ. 1830. Janv. et Avril. oder Fror. Not. Nr. 10. des XXVII. Bandes.
- Marr, über eine neue Art die Klangfiguren hervorzubringen (auf zarten Membranen von Gummi elasticum); Schweigg. J. LXV. 148.
- Munck, über das Trevelyan-Instrument; Pogg. XXIV. 466.
- Trevelyan, neue Art Töne zu erregen; J. of the royal Instit. Nr. 4. p. 119 oder Schweigg. LXIV. 421.
- Wheatstone, über die Fortpflanzung der Töne durch feste lineare Lei-

- tes und die daraus hervorgehende Reflexion; J. of the royal Instit. Nr. 5. p. 223 oder Baumg. Zeitschr. X. 469.
 Willis, über Vokalstöne und Zungenpfeifen; Vogg. XXIV. 397.

Gewöhnliche Electricität.

- Barry, über die chemische Wirkung der atmosphärischen Electricität; Phil. transact. 1831. P. I. p. 165.
 Becquerel, über die Veränderungen, welche im Zustande der Körper durch Wärme hervorgerufen werden; Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 118; XLIX. 181.
 Erman (P.), Beiträge zur Monographie des Marcasit, Turmalin und brasilianischen Topas, in Bezug auf Electricität (besondere Schrift).
 Fusinieri, Fortführung der Substanzen durch den Blitz; Bibl. univ. 1831. Dec. p. 371; 1832. Janv. p. 1.
 Harris, über den Nutzen der Blitzableiter auf Schiffen; Gillman's J. XXI. 347.
 Henderson, Horizontale Elektrifirmaschine; Dingl. pol. J. XLII. 108.
 Kastner, Elektrisches Leuchten des Binns bei seiner Drydation; Pharm. Centralbl. III. 462.
 Köhler, Thermoelektrische Mineralien; Vogg. XVII. 146.
 Ohm, über eine verkannte Eigenschaft der gebundenen Electricität; Schweigg. LXV. 129.
 Versuche über den Einfluß von Blitzableitern auf die Vegetation; Jam. Edinb. N. phil. J. 1831. Jul.—Oct. p. 386.

Galvanismus.

- Becquerel, Allgemeine Betrachtungen über die elektro-chemischen Zersetzungen und die Reduction des Eisenoxydes, der Birkenerde, Magnesia zc. durch schwache elektrische Ströme; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 337. (Nutz. Pharm. Centralbl. III. 527).
 Döbereiner, Darstellung Kobaltischer Farbenfiguren; Schweigg. J. LXIII. 472.
 Dutrochet, über Wirkung des Galvanismus auf Eibiotter-Emission; For. Rot. Nr. 1. des XXXIII. Bandes. — Derselbe, über die ungleichnamig elektrische Beschaffenheit der organischen Substanzen, welche in den Blutkügelchen über einander geschichtet sind; For. Rot. Nr. 11. des XXXIII. Bandes.
 Fare, Empfindlicher Multiplikator; Baumg. X. 224.
 Kemp, über die elektrische Leitungsfähigkeit einiger zu tropfbaren Flüssigkeiten verdichteter Gase; Baumg. X. 124.
 Ohm, An Zhatfachen fortgeführte Nachweisung des Zusammenhanges, in welchem die mannichfaltigen Eigenthümlichkeiten galvanischer, insbesondere hydro-elektrischer, Ketten unter einander stehen; Schweigg. J. LXIII. 385; LXIV. 21. 136. 267.

eff, Zur Kritik von Fischer's Schrift, über das Verhältniß der chemischen Verwandtschaft zur galvanischen Elektricität; Schweigg. J. LXIV. 1. 129.

thie, über die Wirkungsverstärkung durch Zahl der Plattenpaare; For. Rot. Nr. 8. des XXXIII. Bandes.

Magnetismus:

riew, über den wahrscheinlich elektrischen Ursprung aller Erscheinungen des Erdmagnetismus; Phil. transact. 1831. P. I. p. 99.

man, über verschiedene Verhältnisse des Magnetismus; Pogg. Ann. XXIII. 487.

r, über Variation der Intensität des Erdmagnetismus und den Einfluß des Nordlichtes darauf; Bibl. univ. 1832. Avril. p. 381. oder Phil. transact. 1831. P. I. p. 199.

rris, über die Fähigkeit einiger Substanzen, die magnetische Wirkung zu interceptiren; Journ. of the royal Inst. Mai. 1831. Nr. 3 (Ausg. Bibl. univ. 1831. Juin. 134). — Derselbe, über den vorübergehenden magnetischen Zustand, dessen gewisse Substanzen fähig sind; Phil. transact. 1831. P. I. 67.

uillet, Magnetische Temperaturgränzen; Schweigg. LXV. 122.

evost, Bemerkungen über den Magnetismus des Erdbörpers; Bibl. univ. 1832. Avril. p. 337.

ef, Zur Bestimmung der magnetischen Inclination eines Ortes; Pogg. XXIV. 193.

hweigger-Seidel, Zusammenstellung über Magnetisirung durch Galvanismus; Schweigg. LXV. 115.

oresby, über das Vermögen des Magnetismus, durch alle bekannte Substanzen hindurchzuwirken, und die Anwendung hiervon zur Bestimmung der Dichte fester Substanzen; Jameson's Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. p. 319. (Unvollst. Not. in Baumg. X. 463).

urgeon, über Vertheilung und Festhaltung des Magnetismus in Metallen; Phil. mag. 1832. Mai. 324.

att, Instrument zu Beobachtung der Änderung der Intensität des Magnetismus; Baumg. VIII. 90.

Elektromagnetismus und Thermomagnetismus.

re die durch Faraday entdeckte neue Klasse elektromagnetischer Erscheinungen: Faraday's Brief an Babbage; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 402 oder Schweigg. J. LXIV. 441. — Auszug aus Faraday's Abhandlung; Bibl. univ. 1832. Avril. p. 341. — Becquerel's und Ampère's Versuche; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 402 oder Schweigg. J. LXIV. 442 oder Pogg. Ann. XXIV. 612. — Versuche von Nobili und Antinori; Bibl. univ. 1832. Févr. p. 127 oder Schweigg. J. LXIV. 460 oder Pogg. XXIV. 473, 621. — Pohl's Versuche; Pogg. XXIV. 489.

- Moll**, über Magnetisirung weichen Eisens durch elektrische Ströme; *Quetelet's Corresp.* 1830. 6me livr. 327. (Bibl. univ. 1831. Sept. 141).
Regro, Elektro-magnetische Versuche; Bibl. univ. 1832. Avril. p. 381.
Ritchie, über Beziehung von Electricität und Magnetismus; *Journ. of the royal Instit.* Nr. 4, p. 128.
Schweigger-Seibel, Magnetisirung durch Galvanismus; *Schweigg.* J. LXV. 115.
Sturgeon, über Elektromagnete; *Phil. mag.* XI. 194 oder *Pogg.* XXIV. 632. — Derselbe, über Thermomagnetismus homogener Körper; *Phil. mag.* 1831. Juillet. p. 24. 116., oder *Bibl. univ.* 1831. Août. p. 351; Sept. p. 1 oder *Baumg.* X. 221.

Sicht.

- Airy**, über die Natur des Lichtes in den beiden durch die Doppelbrechung des Bergkrystalles hervorgebrachten Strahlen; *Brewster's Edinb. J. of sc.* 1831. Nr. 10. p. 324 oder *Pogg.* XXIII. 204.
Babinet, über die Absorption des polarisirten Lichtes; *Pogg.* XXIII. 435.
Bachelor, über eine Art mouches volantes; *Bibl. univ.* 1831. Avril. p. 427 oder *Phil. mag.* 1831. Mars.
Barlow, über Verfertigung flüssiger Fernrohrsinsen; *Philos. transact.* 1831. P. I. p. 9.; *J. of the royal Inst.* Nr. 4. p. 1.
Bergelius, über Glühen beim Schmelzen des Kalks; *Bergzel. Jahrbuch.* XI. 122.
Brewster, über eine neue Zerlegung des Sonnenlichtes in die drei Grundfarben, welche coincidirende Spectra von gleicher Länge bilden; *Brewster's Edinb. J. of sc.* 1831. Nr. 10. p. 197 oder *Pogg.* XXIII. 435. — Derselbe, über das Princip der Erleuchtung mikroskopischer Objecte; *Brewster's Edinb. J. of sc.* 1832. Jan. p. 83.
Dietrich, Beschreibung eines neuerfundnen Reflectors; *Dingler's polyt. J.* XXXV. 409.
Dobereiner, Interessantes Farbenspiel durch Erhitzung von Kupfer; *Schweigg.* LXIII. 473 oder *Pharm. Centralbl.* III. 125.
Ehrenberg, Betrachtungen über die Sehkraft des menschlichen Auges; *Pogg.* XXIV. 1. — Derselbe, über das neueste Mikroskop von Vistor und Schink; *Pogg.* XXIV. 188. — Derselbe, über einen neuen, das Leuchten der Oefee bedingenden Körper und das Leuchten der Schmetterlingsaugen; *Pogg.* XXIII. 147.
Farbenänderungen von Zirkon und Glas; *Pogg.* XXIV. 386; von vanadin-saurem Baryt; *Schweigg.* LXIII. 42.
Fresnel, über die doppelte Strahlenbrechung; *Pogg.* XXIII. 372. 494.
Gergonne, über die zufälligen Farben; *Gergonne's Annal.* XXI. 284.
Hermann, Leuchten der Alkalimetalle; *Pharm. Centralbl.* III. 400.
Jackson, über Durchsichtigkeit und Farbe der Atmosphäre und der in Entfernung gesehenen Gegenstände; *Bibl. univ.* 1832. Févr. 163.

- Robell, Verhalten des Kpatits in polarisirtem Lichte; Schweigg. Journ. LXIV. 420.
- Rifter, über einige Eigenschaften achromatischer Objectivgläser, welche zur Verbesserung des Mikroskopes anwendbar sind; Brewster's Edinb. J. of sc. 1831. Nr. 9. und 10.
- Rordenstidb, Untersuchung einiger neuen Phänomene beim Farbenspiel des Labrators; Pogg. XIX. 179.
- Plateau, über optische Täuschungen; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. p. 268.
- Potter, Mathematische und praktische Anweisung zur Politur von Linfen und Spiegeln, zur Hervorbringung von Krümmungen in Gestalt von Kegelschnitten; Brewster's Edinb. J. of sc. 1832. VI. p. 278.
- Powell, Versuche über die Interferenz des Lichtes; Phil. mag. 1832. Jan. p. 1.
- Shaw, über die Richtung des Sehens der Gegenstände; For. Rot. Nr. 6. des XXXIII. Bandes S. 87.
- South, Die zwei größten bis jetzt bekannten Objectivgläser; Dingler's polyt. J. XXXVI. 171.
- Untersuchungen über die Farben von Druck und Papier, durch welche das Auge am wenigsten ermüdet wird; Brewster's Edinb. J. of sc. 1832. Jan. oder Forier's Notiz. Nr. 8. des XXXIII. Bandes.
- Versuche über Beobachtung der Adgäßen der wässerigen Feuchtigkeit im eigenen Auge; For. Notiz. Nr. 1. des XXVIII. Bandes.
- Young, Sur Theorie der Interferenzphänomene; Ann. de Ch. et de Ph. XL. 178 oder Baumg. VI. 221.

Wärme.

- Bartlett, Versuche über die Ausdehnung und Zusammenziehung von Bausteinen durch Temperaturänderungen; Silim. J. XXII. 136.
- Graham, über die Erhizung eines an einem Ende glühenden Eisenstabes beim Sintauchen in kaltes Wasser; Bull. univ. 1831. Oct. p. 143.
- Dutrochet, über Circulation der Flüssigkeiten in Röhren durch Wärme; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 268.
- Johnson, über die schnelle Erzeugung des Dampfes bei Berührung des Wassers mit Metallen in hoher Temperatur; Bibl. univ. 1831. Juill. p. 241. — Derselbe, Experimentalversuche über Hitze und Dampf; Silim. J. XXI. p. 304. — Derselbe, über ein Dampfpyrometer; Silim. J. XXII. p. 96.
- Lamé und Clapeyron, über Erkaltung der Erde; Ann. de Ch. et de Ph. XLVII. 250.
- Lenz, über die Ausdehnung des Seewassers durch die Wärme; Pogg. XX. 116.
- Melloni, über den Durchgang der strahlenden Wärme durch verschiedene Flüssigkeiten; Bibl. univ. 1832. Avril. p. 337. — Derselbe, über

eine neue Eigenschaft der Sonnenwärme; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 385 oder Pogg. XXIV. 640. — Derselbe mit Robili, über mehrere Kälteversuche mittelst des Thermo-Multiplikators; Ann. de Ch. et de Ph. XLVIII. 198.

Evanberg, über den Erstarrungspunct von Legirungen; Berzelius Jahresbericht XL. 126.

Physikalische Geologie.

über den letzten Ausbruch des Vesuv; Torrie, James. Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. p. 384.

über den wahrscheinlichen Ursprung der Mineralquellen; Jameson's Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. p. 290.

Pendelbeobachtungen von Zuetke; Baumg. X. 237.

über das beim Anlegen artesischer Brunnen in und um Wien übliche Verfahren; Baumg. IX. 476.

Meteorologie.

Beschreibung eines Sturmes in Nordamerika; Audubon, Jameson's Edinb. N. phil. Journ. 1831. Oct. p. 278.

über Berechnung der Höhe des Nordlichtes; Potter, Brewster's Edinb. J. of sc. July. p. 27; Oct. p. 209.

Bemerkungen über die Ursache der Falos und die Erscheinungen divergirender und convergirender Strahlen; Recler, Brewster's Edinb. Journ. of sc. 1832. Nr. 12. p. 251.

Beschreibung einer Methode, die Menge der in der Atmosphäre enthaltenen Kohlensäure zu bestimmen; Brunner, Pogg. XXIV. 569.

über den Einfluß des Mondes auf unsere Atmosphäre; Schädler, Schweigg. LXIV. 348; Eiber, Kasn. N. Arch. V. 48.

Psychrometrische Tabellen von Rämß, in f. Meteorol. I. 319.

über Bildung des Hagels; Perevoschtschikoff, Bull. univ. XVI. 259.

Störung der Magnethadel durch Nordlicht; Henry, Gillman's Journ. XXII. 143.

Meteorologische Beobachtungen an der Magellanstraße (Barometer, Thermometer, Daniell's Hygrometer) im Jahr 1828 von Anfang Januar bis Mitte August, das Thermometer und Barometer täglich um 6, 9, 12, 3 und 6 Uhr, das Hygrometer um 3 Uhr beobachtet; nebst Ziehung allgemeiner Resultate, auf dem von King commandirten Schiff Adventure; For. Rot. Nr. 14. des XXXIII. Bandes S. 209.

Monatliche Mittel der Thermometer- und Barometer-Beobachtungen um 9 Uhr 30 Min. Vorm. und 8 Uhr 30 Min. Nachmittags, nebst jähriger Regenmenge zu Inverness in den Jahren 1830 u. 1831; Adam, James. Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. 289.

über die stündlichen Oscillationen des Barometerstandes bei Edinburgh, abgeleitet aus 4410 Beobachtungen (von 1827 — 1830, zu 5 Stunden

- des Tages), nebst einer Untersuchung über das Gesetz der geographischen Vertheilung der Erscheinung; Forbes, Brewster's Edinb. J. of sc. 1832. Nr. 12. p. 261—286.
- Über jährige Perioden in der Größe der Barometerschwankungen zu Stuttgart nach 10jährigen Beobachtungen; Schädler, Schweigg. LXIV. 355.
- Hygrometer- und Psychrometer-Beobachtungen; Schädler, Schweigg. J. LXV. 58.
- Meteorologische Beobachtungen mittlerer monatlicher Temperatur, Maximum und Minimum, nach täglichen dreimaligen Beobachtungen, bei Sonnenaufgang, um 2 Uhr und 9 Uhr Nachmittags im Jahr 1831, Regen, Wolken, Wind und Wetter zu Marietta, Ohio; von Silbretth, Sillim. J. XXII. 109.
- Resultate der meteorologischen Beobachtungen zu N. Bedford im J. 1831, enthaltend die monatlichen Mittel des Thermometers und Barometers um Sonnenaufgang, 2 Uhr Nachmittags, Sonnenuntergang und 10 Uhr Abends, die Maxima und Minima dieser Stände, Regen, Wind, Wolken; Sillim. J. XXII. 188.
- Tägliche Thermometerbeobachtungen im Jahr 1828 vom Mai bis October, um 7½ Uhr Vormittags und 8½ Uhr Nachmittags, nebst monatlicher Regenmenge zu Banlockhead, von Lang; James. Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. p. 335.
- Mittlere monatliche Barometer- und Thermometerstände nach täglichen Beobachtungen um 9½ Uhr Morgens und 8½ Uhr Abends vom 1. November 1830 bis 1. November 1831, desgl. monatliche Regenmenge und Wolken- und Windbeobachtungen zu Banff Castle; Jameson's Edinb. N. phil. J. 1831. Oct. p. 336.
- Über das Klima der Syntra-Berge; Beadon, Transact. of the med. and phys. soc. of Calcutta. 1829. Vol. IV.
- Über das Klima von Deyrah-Doon; Shore, ebend.
- Über das Klima von Mullay; Tytler, ebend.
- Über das Klima von Pooree; Brande, ebend.
- Vergleichende Darstellung der außerordentlichen Kälte des Febr. 1832 in Bezug auf Heiterkeit, Trockenheit, Schnee mit 132 Februarmonaten anderer Jahre, von Schäbler; Berl. med. Zeit. 1832. Nr. 10. S. 145—147.

- Brechung des Lichts.** Einfache — II. 100; Brechungsverhältnisse verschiedener Körper, II. 100; Instrument zur Bestimmung der — II. 102; Einfluß der Temperatur auf die — II. 103; Beziehung der — zur Zerstreuung, II. 103. Doppelte — II. 104; — durch Druck, II. 106; Fresnel's Formeln, II. 107; III. 232; Elemente der — in verschiedenen Krystallen, II. 113; Zerstreuung der Arten der — II. 115.
- Capillaritätserscheinungen,** I. 96.
- Combinationstöne,** von Stein, I. 357; von Saksén, III. 229.
- Dämpfe;** Spannkraft der — I. 173; — fester Körper, I. 195; — des Äthers, I. 196; — des Eisens, I. 196; Temperatur der — II. 396; Bemerkungen von Dove über — III. 223; — des Schwefelkohlenstoffes, III. 223; Durchbringen der — durch Caoutchouc, III. 223; Spannkraft der — von condensirten Gasen, III. 228.
- Dampfmaschinen.** Geschichte, I. 183; Explosionen, I. 184.
- Declination der Magnetnadel.** Methode die Variationen der — zu vergrößern; III. 80; Isogonische Linien, III. 90; Construction der — III. 98; Variation der — III. 100; Literatur der — III. 160.
- Dehnbarkeit,** des Bleis, I. 27; — der Haare, I. 28.
- Drachwage.** Construction der — von Ritchie, I. 77; Störung der — durch thermoelektrische Wirkung, Münch, I. 78.
- Druck,** in festen Körpern, Cauchy, I. 46; Poisson und Cauchy, I. 52; — schraubenförmiger Drähte, Weber, I. 62; — des Gases, Burnand, I. 65; Princip der Gleichheit des — in Flüssigkeiten, Poisson, I. 90; — des Meeres, I. 92.
- Ductilität s. Dehnbarkeit.**
- Ebenheit;** Prüfung der — Later, I. 4.
- Eis;** Grund, — III. 143; Literatur über das — III. 152.
- Elasticität,** des Holzes, Savart, I. 30; — der Krystalle, Savart, I. 30; — der Metalle, Savart, I. 31; — des Äthers, II. 346.
- Electricität;** Lehre von bergewöhnlichen — I. 342; III. 230; Erregung der — I. 342. 449. 450; Vertheilung und Binden der — I. 347; Entladungen der — I. 352; Atmosphärische — III. 74; Literatur der atmosphärischen und tellurischen — III. 159; Chem. Wirt. der atmosphärischen — III. 230; — der Mineralien, III. 230.
- Electrisirmaschinen;** Henderson's, III. 230.
- Electrochemische Theorie** von Becquerel, II. 1.
- Electromagnetismus,** II. 70; III. 241.
- Electroskope,** I. 350.
- Erdbeben;** Einfluß der — auf meteorologische Erscheinungen, III. 8; Einfluß der — auf die Magnetnadel, III. 117; Literatur der — III. 150.

- Erde, Literatur geologischer Phänomene, III. 147.
 Erregende Oberfläche; L. 417.
 Farben; objectiv durch nicht polarisirtes Licht H. 184; — durch Zurückwerfung, II. 145; — auf gestreiften Flächen, II. 154; Stärke der — II. 215; Subjectiv — II. 217, III. 222; Mangelndes Unterscheidungsvermögen der — II. 230; Parallaxen der — II. 271; — nach der Undulationstheorie, II. 352; — des Kupfers bei Erleuchtung, III. 232; Änderungen der — bei Birken, Glas und Camadinfarbharzt, III. 223; — der Atmosphäre, III. 223; — von Druck und Papier, welche am günstigsten für das Gesicht sind; III. 234.
 Farbenringe, in polaris. Lichte, II. 272, 276.
 Farbensale, von Köhler, II. 135; von Fiehl, II. 140; von E. Seel, II. 277.
 Fernöhre, II. 197.
 Festigkeit, der Metalle, I. 35, 52; III. 223; — der Koharten, III. 229.
 Figuren, magnetische, II. 51.
 Flammen; Elektrisches Verhalten der — I. 345; Farben der — II. 141.
 Fröschengelbversuche, Galvanische, I. 472.
 Flüssigkeiten; Princip der Gleichheit des Druckes in — I. 90; Zusammenbrüchung der — I. 94; Capillarscheinungen der — I. 96; Ausfluß der — I. 98; Permanente Luft in — I. 102; Siedepunkt der — I. 183; Festigkeitsvermögen der — I. 403; Ausdehnung der — II. 425.
 Galvanismus; Lehre vom — I. 353; III. 230; Theorien des — I. 354; Vertheilung des — I. 367; Messung des — I. 388; Gesetze des — I. 392; Physiologischer — I. 471.
 Gasarten; Gleichgewicht, I. 108; Mariottesches Gesetz, I. 110; Absorptionerscheinungen, I. 114; Dampfgas, I. 121; Verbreitung der — I. 121; Ausströmen der — I. 127, 131; Absolutes und specifisches Gewicht, I. 288; Schallgeschwindigkeit in — I. 260; Benutzungen von Döve über — III. 226; Durchdringen der — durch Gasatmosphäre; III. 228; Spannkraft der Dämpfe der condensirten — III. 228.
 Genber, I. 314.
 Geothermometer, II. 445.
 Geschwindigkeit, des Lichts, I. 106; — des Schalls, II. 338.
 Gesicht, II. 208; III. 222.
 Gewitter; Barometerstand bei — III. 33; Bildung der — III. 78; Häufigkeit der — III. 79; Literatur der — III. 160.
 Gleichgewicht, Mathematische Betrachtung der Gleichgewichtsercheinungen, I. 35.
 Glas, Zurückwerfungsvermögen des — H. 39; Farbige — II. 145; Optisches — H. 169, 173; Polarisation des Lichtes auf — II. 257; Ausdehnung des — II. 409.

- Bariometer von Rajochi, I. 6; Beurtheilung der Fehler des — Weissbach, I. 7.
- Brundells, II. 143.
- Bugel, III. 56; Literatur, III. 158.
- Bärmonika, chemische, I. 265.
- Deertrauch, Literatur, III. 157.
- Deffoht, II. 99.
- Deffe, III. 122. 162.
- Hydraulischer Kibber, I. 106.
- Hygrometer, I. 199 ff.; III. 228.
- Hygrometrische Verhältnisse der Atmosphäre, III. 44. 157.
- Inclination der Magneträder; Methode die Variation der — zu vergrößern, III. 80; Beseitigung der Fehler beim Messen der — III. 82; Foklinische Linien, III. 90; Änderungen der — III. 98. 106; Literatur der — III. 161.
- Intensität des Erdmagnetismus; Maß der — nach Poisson, Moser und Kieß, III. 86; Hydrodynamische Linien, III. 90. 99; Änderungen der — III. 114; Literatur der — III. 162. 231.
- Interferenz; Phänomene der — II. 117; Erklärung und Gesetze der — II. 378; Young's Versuche, III. 232.
- Irlichter; Literatur der — III. 154.
- Isonerische Körper, I. 23.
- Kalispach; Vergrößerung der Doppelbrechung des — II. 105; Polarisationwinkel am — II. 267.
- Kette, galvanische; Elektroskopische Wirkungen der — I. 370; Gesetze der — I. 392 ff.; Wirkungsabnahme der — I. 430; Wogen der Kraft in der — I. 434; Umkehrungsphänomene der — I. 458; Befestigungsrichtungen der — II. 1; Anwendung der — zur Prüfung der Reineheit der Metallsalze und Metalle; II. 8.
- Kongfigurationen, Hervorbringung, I. 291. III.; Gestalt auf verschiedenen Körpern, I. 294 ff.; besondere Klasse, III. 229.
- Körper; Entfernung ihrer Theilchen von einander, I. 9; Krystallisirte Structur der — Savart, I. 10; Lagerveränderungen der feinsten Theilchen der — I. 12; Grundzustand der — Poisson und Gauß, I. 19.
- Kohlensäure; Gehalt der — in der Atmosphäre, III. 61; Methode der Bestimmung der — von Brunner, III. 434.
- Krystallisation und Krystalle; Krystallisirte Structur der Metalle und anderer Körper, Savart, I. 10; Elasticität der — Savart, I. 30; Härte der — Frankenheim, I. 32; — aus Beobachtungen, III. 228.
- Lichtphänomene, I. 456.
- Lampe, Lichtintensität der — II. 84; Monochromatische, II. 142.

Reibenfroß'scher Versuch, II. 400.

Leiter und Leitungsvermögen. Elektrische Leiter; Unipolare Leiter, I. 373; Leitungsvermögen der Mineralien, I. 403; — der Kohle, I. 404; — der Flüssigkeiten, I. 405. III.

Leuchten der Blumen, I. 352; — des Kalks beim Lösen, III. 232; — der Oefen, III. 232; — der Alkalimetalle, III. 232.

Licht; Lehre vom — II. 71. III. 232; — Verhältniß des — zur Wärme, II. 72; Geradlinige Bahn des — II. 73; Erregung des — II. 75; Gemischte Wirkungen des — II. 81; Wirkung des — auf Magnetismus, II. 46; Undulationstheorie des — (vgl. Undulationstheorie); Zurückwerfung des — II. 89; Brechung des — II. 100 (vgl. Brechung). Lichterscheinungen; Galvanische Funken, I. 464; Atmosphärische — III. 119. 162.

Leisen, aus Sapphir und Diamant, II. 180; Flüssige — II. 200; III. 232. Luftelektrophor, I. 348.

Luftpumpe; verschiedene, von Remp, Wille, I. 116 ff.; von Lillier, von R. J. R. u. III. 229.

Lupen, II. 178.

Magnetismus; Lehre vom — II. 32. III. 231; Bertheilung des — II. 32; Einfluß des Aggregatzustandes, Streichens, Temperatur, Licht auf den — II. 35; Mittheilung des — II. 47; Erregung des — II. 48. III. 231; — durch Drehung, II. 57; Wirkung des — auf chemische und Krystallisationserscheinungen, II. 67; — der Erde, III. 80 (I. Inclination, Declination, Intensität); Literatur des Erdmagn., III. 160.

Mariotte'sches Gesetz, I. 110.

Maßstäbe, von Khar, I. 2; von Werner, I. 1; Biegung der — Kater, I. 2.

Maultrommel, Theorie, I. 513.

Meer; Temperatur des — III. 141; Literatur über das — III. 150.

Metalle; Krystallinische Structur, I. 10; Tenacität, I. 27. 28; Elasticität, I. 31; Adhäsion, I. 79; Galvanische Prüfung der Reinheit, II. 9; Niederschlagung durch einander, II. 18; Elliptische Polarisation durch — II. 295; Wirkung der — auf gewöhnliches Licht, II. 334; Wärmeleitung, II. 394; Schmelzpunkt der — II. 475; Expansion und Contraction der — beim Erstarren, II. 458; Latente Wärme, II. 472; Wärme bei Compression oder Dilatation von — II. 473; Specifische Wärme, II. 477. 480.

Meteorologie, III. 1; Literatur, III. 146.

Meteorsteine; Literatur der — III. 146.

Mikroscop, II. 179. 183. 185. 187. 190. 193. 196. III. 232.

Mond; Einfluß des — auf die Witterung, III. 6. 234; Einfluß des — auf die Barometerschwankungen, III. 27; Einfluß des — auf die Winde, III. 43; Einfluß des — auf die Menge der wässrigen Niederschläge aus der Atmosphäre, III. 43.

- Monochord von Weber, I. 259.
 Multiplikator, elektromagnetischer, I. 401. III. 230.
 Nebel, Literatur über — III. 157.
 Nebenmonde und Neben Sonnen; Literatur der — III. 162.
 Neigung s. Inclination.
 Nordlicht; Einfluß des — auf die Magnetnadel, III. 115. 234; Verschiebene, das — betreffende Umstände, III. 123; — vom 7. Januar 1831, III. 125; Literatur des — III. 163.
 Pendel; über gleichzeitige Bewegungen des — und der Luft; III. 223; Correction wegen der Temperatur, III. 229.
 Phase, beim Licht; II. 355. 357.
 Phosphorescenz, von Salz, II. 77; — von Mineralien, II. 77.
 Photometer, II. 83.
 Planetenraum; Verhältnisse des — III. 1.
 Polarisation; Lehre von der gewöhnlichen — II. 233. (vgl. das Inhaltsverzeichnis); Lehre von der kreisförmigen und elliptischen — II. 279; die — nach der Undulationstheorie, II. 358; — der Wärme, II. 398.
 Pyrometer von Prinssep, II. 453; von Neumann, II. 455; von Daniell, II. 455; verschiebene, II. 457. III. 233.
 Quellen; Temperatur der — III. 135; Literatur über — III. 151; Gas — III. 152.
 Regen; Menge des — in verschiedenen Höhen, III. 48; Einfluß des Mondes auf die Menge des — III. 48; Literatur, III. 157.
 Regenbogen; Theorie des — III. 119; Literatur des — III. 163.
 Regenmesser, III. 48.
 Registerpyrometer, II. 455.
 Reibung, I. 78. 79. III. 228.
 Resonanz, I. 261.
 Rotationsapparat, elektromagnetischer, II. 70.
 Säulen, trockene, I. 381 ff.; — mit feuchten Zwischenleitern, Construction, I. 384; Geseze, I. 425. III. 231.
 Saiten; Geseze der Schwingungen der — I. 267 ff.; plötzliche Verlängerung und Verkürzung der — I. 67.
 Schall; Lehre vom — I. 241. III. 229. (vgl. Inhaltsverzeichnis).
 Schmelzpunkt, der Metalle, II. 457.
 Schnee; Gestalt des — III. 61; Literatur über den — III. 158.
 Schwefel; Erscheinungen beim Erstarren des geschmolzenen — II. 461.
 Schwingungen; Geseze der — der Saiten, Stäbe, Membranen u., I. 264; — des Lichtes, II. 361; — elastischer Körper, III. 227.
 Seen; Literatur über — III. 150.
 Sirene, III. 229.
 Sechner's Repertorium d. Experimentalphysik. III. 16

Spannung, von Saiten, I. 66. 69.

Specifisches Gewicht; Bestimmungsmethode des — von Feby, I. 219; von Leslie, I. 220; von Reille, I. 220; von Osann, I. 225; — verschiedener Körper, I. 228; — des Wassers, I. 232; — der Gase, I. 233.

Specifische Wärme; Mischungsmethode zur Bestimmung der — II. 473; Vorschlag Reumann's zu einer neuen Bestimmungsmethode der — II. 476; Weber's Methode, die — der festen Körper bei konstantem Vol. zu bestimmen, II. 478; — der Metalle, II. 477; — verschiedener Mineralien, II. 481; — des Wassers, II. 486; — der Gasarten, II. 486.

Spitzen des Silbers, I. 16.

Sternschnuppen; Literatur über — III. 164.

Stimme, menschliche, I. 334. III. 229.

Telegraph, elektromagnetischer, I. 401.

Teleskope, II. 197.

Temperaturverhältnisse der Erde, III. 127; Literatur der — III. 164.

Thermoelectricität, I. 432 ff.

Thermometer, I. 439; II. 438 (vgl. Inhaltsverzeichnis).

Ton, Töne; Bewegung von — I. 251; Combinationstöne I. 257; III. 229; — von Saiten, Stäben, Membranen zc., I. 264; Gränge der — I. 335; Unterscheidung der — I. 341.

Torsion, fester Streifen und Stäbe; Savart, I. 73; Bèvan, III. 227.

Tromben; Literatur über — III. 158.

Undulationstheorie des Lichtes; Literatur, II. 71; Gleichung für die Gestalt der Wellen, II. 109; hauptsächlichste Bestimmungen der — II. 345.

Vulkane; Literatur der — III. 149.

Wärme; Lehre von der — II. 395 (vergl. das Inhaltsverzeichnis und Temperaturverhältnisse), III. 238.

Wage, von Ritchie, I. 7.

Wasser; Spannkraft der Dämpfe des — I. 173; Ausdehnung des — II. 411; Farbe des — III. 152.

Wasserstoffmetalle, galvanische Bildung; II. 2.

Wasserwage, I. 5. 6.

Wellen, stehende auf Wasser, I. 102; III. 223; — des Lichts, II. 109. 369.

Widerstand; Leitungswiderstand der Electricität, I. 405. 414.

Wind; Verhältnisse des — III. 37. 144; Literatur, III. 159.

Winkelmessung, optisches Verfahren; Moser, I. 6.; vgl. Sonimeter. Verfahren von Chirac, III. 229.

- S**tererrothen; Electricität des — I. 481.
Sungenpfeifen, Einrichtung und Theorie von Weber, I. 514; von Billis, III. 230.
Zusammendrückbarkeit, einer Kugel, I. 55; — der Materie des Erdbodens, III. 228; — des Quecksilbers, III. 228; Parrot's Instrument zum Maß der — des Wassers im Meere, III. 228.
Zwischenbogen in der Kette, I. 427.

N a m e n r e g i s t e r.

- A**chard, Erwärmung des Wasserstoffgases, II. 401.
Ainger, Theorie des Regenbogens, III. 119.
Airy, Doppelbrechung im Bergkry stall, II. 294; Farbenringe im polarisirten Lichte, II. 344.
Aibert, Galvanischer Apparat, I. 387.
Amici, Spiegelmikroskop, II. 185; Dioptrisches Mikroskop, II. 190.
Ampère, Elektromagnetischer Telegraph, I. 402; Oberfläche der Lichtwellen, II. 109; Faraday's Versuche, III. 231.
Antinori, Faraday's Versuche, III. 231.
Arago, Spannkraft der Dämpfe, I. 173; Explosion von Dampfkesseln, I. 184; Farbenringe durch polarisirtes Licht, II. 342; Magnetische Reizung, III. 106.
Aubuisson, Ausfluß des Wassers, I. 98.
August, Hygrometer und Psychrometer, I. 199. 202. 204; Reductionsformel für das Quecksilberthermometer, II. 439; Isochronische Schwingungen elastischer Federn, III. 227.
Babinet, Beugungsphänomene, II. 118. 121; Undulationslänge als Maß, III. 227; Schalleitung des Wassers, III. 229; Absorption polarisirten Lichtes, III. 232.
Bachelor, Monches volantes, III. 232.
Barlow, Brechung des Lichtes, II. 103; Teleskop mit flüssiger Linse, II. 200; III. 232; Stürke der Holzarten, III. 227; Elektrischer Ursprung des Erdmagnetismus, III. 231.
Barry, Chemische Wirkung der atmosphärischen Electricität, III. 230.
Bartlett, Ausdehnung und Zusammenziehung von Bausteinen, III. 233.
Bary, Elektroskope, I. 350.
Bauernfeind, Phosphorescenz von Fett, II. 77.

- Baumgartner, Anschwellen: tierischer Blase, I. 118; Leslie's Instrument, I. 220; Apparat zu Interferenzversuchen, II. 132.
- Beck, Farbenscale, II. 277.
- Bequerel, Verschiedene galvanische und elektrochemische Versuche, I. 356. 450. 453. 456; II. 2; Thermoelektrische Versuche, I. 484. 487. 489; Elektrochemische Theorie, II. 1; Galvanische Erzeugung elektrochemischer Verbindungen, II. 12; Wirkung der Wärme auf Electricität, III. 230; Reduction von Metallen, III. 230; Elektromagnetischer Versuch Faraday's, III. 231.
- Bennett, Stimme, I. 334; III. 229.
- Benoit, Hygrometer, III. 233.
- Benzenberg, Dalton'sche Theorie, I. 108.
- Berthold, Subjective Gesichtserscheinung, II. 204.
- Bergelius, Beobachtung an Phosphorsalz und Chromoxyd, I. 17; Chemische Wirkung der Magnethaut, II. 67; Licht beim Lösen von Metall, III. 232.
- Beudant, Specificisches Gewicht der Mineralien, I. 228.
- Bevan, Torsionsmodulus, III. 227.
- Bigeon, Leitungswiderstand der Flüssigkeiten, I. 407; Erregende Oberfläche, I. 423.
- Blackburn, Parabolisches Schallbret, III. 229.
- Blein, Combinationstöne, I. 257.
- Bonnycastle, Electricitätsentziehung, I. 345.
- Boullay, Specificisches Gewicht, I. 230.
- Boussingault, Magnetische Variation, III. 108.
- Bouvard, Tägliche Barometeränderungen, III. 20.
- Brande, Galvanische Zersetzung von Alkaloiden, II. 4.
- Brewster, Zurückwerfung des Lichtes, II. 90; Doppelbrechung durch Druck, II. 106; Glauberit, II. 116; Monochromatische Lampe, II. 142; Farbenerscheinungen durch Zurückwerfung, II. 145; Farben auf gestreiften Flächen, II. 154; Nichtunterscheiden der Farben, II. 230; Polarisation des Lichtes, II. 233. 237. 239. 241. 244. 246. 249; Polarisirende Axen, II. 271; Elliptische Polarisation, II. 306. 334. 341; Bodentemperatur, III. 138; Neue Zerlegung des Sonnenlichtes, III. 232; Beleuchtung mikroskopischer Objecte, III. 232.
- Brodeur, Complementärfarben, II. 168; Einwirkung der Farben auf einander; II. 217.
- Brown, Actives molecules, I. 12; Rigidität der Polarten, III. 227.
- Brunner, Hygrometrisches Verfahren, I. 216; Verfahren zur Bestimmung der Kohlensäure in der Atmosphäre, III. 234.
- Buch, Barometeränderungen, III. 13; Theorie der Hagelbildung, III. 58.
- Buff, Abkühlung der Gase, I. 233.
- Cagnard-Latour, Sirene, III. 229; Pfeifen mit dem Munde, III. 229.
- Camelli, Adhäsionsphänomen, I. 80.

- arlini, Tägliche Barometeränderungen, III. 21.
 auchoir, Bergkrystallfernrohre, II. 199.
 auchy, Mathematische Behandlung der Gleichgewichts- und Bewegungs-
 erscheinungen, I. 35; Druck und Zug in festen Körpern, I. 46; Aus-
 dehnung und Zusammenziehung fester Körper, I. 57; Schallgeschwin-
 digkeit, I. 241; Geseze der Tonschwingungen, I. 264; Bewegung der
 Wärme, II. 408; Isothermische Linien, III. 144.
 hallis, Zusammenrückbarkeit der Materie des Erdbörpers, III. 228.
 habni, Klangfiguren, I. 291.
 hristie, Vertheilung des Magnetismus, II. 32.
 lapeyron, Erkaltung der Erde, III. 233.
 olquhoun, Nichtunterscheiden der Farben, II. 230.
 oriolis, Ductilität des Bleies, I. 27.
 rahay, Erhizung von Eisen, III. 233.
 rum, Farbentheorie, II. 134.
 uvier, Urmweltliche Temperatur, III. 127.
 allari, Gleichgewicht elastischer Flüssigkeiten, I. 108.
 alton, Nichtunterscheiden der Farben, II. 230.
 aniel, Ausdehnung des Platins, II. 411; Pyrometer, II. 455.
 avid, Galvanisch-physiologische Versuche, I. 481.
 avy, Electricität des Zitterrothens, I. 481.
 elezenne, Unterscheidung der Töne, I. 341.
 espres, Wärme beim Verbrennen, II. 472.
 etrich, Neuer Reflector, III. 232.
 öbereiner, Electricitäts-erregung, I. 342; Chemische Wirkung des Rich-
 tes, II. 81; Nobil'sche Figuren, III. 230; Farbenspiel durch Erhi-
 zung von Kupfer, III. 232.
 onné, Trockne Säulen, I. 381.
 obe, Verdunstungsversuch, I. 196; Monatliche Barometeränderungen,
 III. 14; Ursache der täglichen Barometeränderungen, III. 14; Ein-
 fluß der Windbesrichtung auf den mittlern Barometerstand, III. 37;
 Windverhältnisse im Allgemeinen, III. 37. 40. 42; Hygrometrischer
 Luftzustand, III. 44; Gewitterbildung, III. 78; Magnetische Varia-
 tion, III. 102; Nordlicht, III. 117. 124; Einfluß des Windes auf
 die mittlere Temperatur, III. 144; über Gase und Dämpfe, III. 228.
 rummond, Licht auf Leuchtthärmen, II. 89.
 ulong, Spannkraft der Dämpfe, I. 173; Schallgeschwindigkeit, I. 246.
 250; Specifische Wärme der Gase, II. 437; Barometer, III. 228.
 unn (und Sang), Ausdehnung des Marmors, II. 410.
 utrochet, Galvanische Versuche, III. 230; Circulation von Flüssigkei-
 ten durch Wärme, III. 230.
 arle, Explosionen von Dampffesseln, III. 230.
 hrenberg, Sehkraft des Auges, III. 228; Neuestes Mikroskop, III.
 232; Leuchten der Oefen, III. 232.

- Erdmann; Beobachtung an essigsaurem Natron, I. 15; Chemische Wirkung des Magnetismus, II. 67.
 Erman; Unipolarität, I. 380; Specifische Wärme, II. 470; Barometerstand unter verschiedenen Breiten und Längen, III. 11; Gestalt der isogonischen, isoklinischen und isodynamischen Linien, III. 90; Nordlicht III. 117; Erdbeben, III. 119; Electricität der Mineralien, III. 230; Verschiedenes über Magnetismus, III. 231.
 Eschmann f. Horner.
 Euler; Brechungsverhältniß, II. 100.
 Gwart; Ausströmen von Gas, I. 123; Temperatur des ausströmenden Dampfes, II. 396.
 Faraday; Beobachtungen an kieselurem Kalk, I. 16; Durchströmen der elastischen Flüssigkeiten, I. 127; Versäufung, I. 194; Reflexionsvermögen des Glases, II. 89; Mängel des optischen Glases, II. 169; Bereitung des optischen Glases, II. 173; Optische Täuschungen, II. 226; Klangfiguren, III. 229; Neue elektromagnetische Entdeckungen, III. 231.
 Farquharson; Magnetische Variation, III. 104; Nordlicht, III. 116. 124.
 Fechner; Klangfiguren, I. 300; Versuche gegen die chemische Theorie des Galvanismus, I. 359 ff.; Vertheilung der Electricität in galvanischen Combinationen, I. 367; Wirkungsverstärkung der Säulen, I. 388; Messung des Galvanismus, I. 388; Gesetze der galvanischen Kette, I. 392 ff.; Umkehrungsphänomen der galvanischen Kette, I. 460; Thermoelektrisches Instrument, I. 482; Elektrochemische Färbung von Reagenzpapieren, II. 6; Elektromagnetischer Rotationsapparat, II. 70; Bestimmungen der Undulationstheorie des Lichtes, II. 345; Interferenzformeln, II. 382.
 Fieib; Farbenscale, II. 140; Nordlicht, III. 124.
 Fischer; Färbung der Reagenzpapiere, II. 6; Galvanische Prüfung der Reinheit der Metalle, II. 9; Niederschlagung der Metalle, II. 23; Wärmeleitung, II. 394; Leidenfroth'scher Versuch, II. 399.
 Flaugergues, Einfluß des Mondes auf den Barometerstand, III. 28.
 Forster, Luftfaher, III. 5.
 Fox; Leitungsvermögen der Mineralien, I. 403; Electricitätsentwicklung in Schächten, I. 451; Wärme im Innern der Erde, III. 141; Intensität des Erdmagnetismus, III. 231.
 Frankenheim, Härte der Krystalle, I. 32.
 Frei, Leidenfroth'scher Versuch, II. 400.
 Fresnel; Formeln für Zurückwerfung des Lichtes, II. 91; Formeln für Doppelbrechung, II. 107; III. 232; Kreisförmige Polarisation, II. 279; Elliptische Polarisation, II. 290. 295.
 Frey, Bestimmung der Menge der zu einer Feuerstelle austretenden Luftmenge, I. 125.
 Fuchs, Molecularbewegung, I. 16; III. 228.

- Fusinieri, Bild, III. 230.
 Gambey, Helioſtat, II. 99.
 Gauß; Princip der Mechanik, I. 44; Capillarerſcheinungen, I. 96.
 Gautier, Einfluß der Tagesſtunde auf barometriſche Höhenmeſſungen, III. 35.
 Vergonne; über das Licht, II. 73; Zufällige Farben, III. 232.
 Gobel; Niederſchlagung von Metallen, II. 22; Lichtentwicklung, II. 77.
 Goring; Monochromatiſche Lampe, II. 143; Achromatismus, II. 179; Engpſtop, II. 196.
 Graham; Aufſchwellen ſchierlicher Blaſe, I. 111; Verbreitung der Gasarten, I. 121.
 Granville, Stimme, I. 334.
 Green, Druck des Meeres, I. 93.
 Gueſin, Temperaturabnahme mit der Höhe, III. 139.
 Halbat; Magnetiſche Verſuche, II. 35. 51; Bewegung des Lichtes, II. 117.
 Hallaſchka, Einfluß des Mondes auf das Barometer, III. 29.
 Hallſtröm, Combinationstöne, III. 229.
 Hanſſen; Erdmagnetismus, III. 90. 104. 106. 108. 117; Nordlicht, III. 123.
 Hare, Multiplikator, III. 230.
 Harris; Binden der Elektrizität, I. 348; Nutzen der Ableiter, III. 230; Interception magnetiſcher Wirkungen, III. 231; Vorübergehender magnetiſcher Zuſtand mehrerer Subſtanzen, III. 231.
 Hayes, Beobachtungen im Queckſilberjobit, I. 13.
 Hellwag, Farbentheorie.
 Henderson, Elektrifiſirmaſchine, III. 230.
 Henry (und Ten Eyk), Magnetiſirung, II. 49.
 Hermann; Beobachtungen an ſalzſaurem Eithon, I. 13; Reuchten der Alkalimetalle, III. 232.
 Herſchel; Beobachtungen an ſchwefelſaurem Kupferorydblei, I. 14; Brechungsverhältniß, II. 100. 103; Beugungsphänomene der Teleſkope, II. 122; Erklärung der Beugungsfarben dicker Platten, II. 124; Farben der Flammen, II. 141; Abſorption des Lichtes, II. 162; Farberinge, II. 272.
 Hoffmann, Erdbeben, III. 8.
 Holte, Schweite, II. 204. 208.
 Horner (und Eſchmann), Einfluß der Tagesſtunden auf barometriſche Höhenmeſſung, III. 34.
 Huber-Burnand, Druck, Reibung, Ausfluß des Sandes, I. 65. 79. 82.
 Hünefeld, Beobachtungen an einem Doppelfalze aus Chlor, Zink und Platin, I. 14.
 Hugi, Grundeis, III. 143.

- Humboldt; Magnetische Variation, III. 100. 106; Urtweltliche Temperatur, III. 127.
- Jackson; Farbige Gläser, II. 145; Durchsichtigkeit und Farbe der Atmosphäre, III. 232.
- Jacquin, Mikroskop, II. 183.
- Jbeler, Hagel, III. 58.
- Johnson, Dampfbildung, I. 188; III. 233.
- Johnston, Rotastop, III. 228.
- Kdmg; Trockene Säulen, I. 381; Tägliche Barometeränderungen, III. 21; Meteorologische Temperatur, III. 129. 130.
- Karsten, Festigkeit, I. 26.
- Kastner; Kohle zu galvanischen Versuchen, I. 388; Denbritisches Ammoniumamalgam, II. 4; Klingende Legirungen, I. 255; Elektrisches Seichten des Sinnes, III. 230.
- Kater; Biegung der Linearmassstäbe, I. 2; Prüfung der Ebenheit, I. 4.
- Keil, Starke Magnete, II. 48.
- Kemp; Luftpumpe, I. 116; Galvanische Apparate, I. 384; Zeitungsvermögen der Kohle, I. 404; Galvanischer Schlag, I. 472; Thermometer, II. 451; Leitung condensirter Gasarten, III. 230.
- King, Maximumthermometer, II. 444.
- Knar, Maßstab, I. 2.
- Kobell; Farbenringe, II. 274. 276; Verhalten des Apatits im polarisirten Lichte, III. 233.
- Köchlin-Schouch, Electricitätserregung, I. 342.
- Köhler, Thermoelektrische Mineralien, III. 230.
- Kupffer; Messen der magnetischen Inclination, III. 82; Erdmagnetismus, III. 89; Abnahme der magnetischen Intensität mit der Höhe, III. 115; Quellen- und Bodentemperatur, III. 135. 136; Temperaturabnahme mit der Höhe, III. 140.
- Kamé; Stärke des Eisens, III. 228; Erstaltung der Erde, III. 238.
- Kampadius; Beobachtungen an Platin und Nickel, I. 18; an Quecksilber und Natrium, I. 18.
- Schevallier; Leidenfroth'scher Versuch, II. 400; Maximumthermometer, II. 444; Bewegung der Flüssigkeiten, III. 228.
- Ségrand, Erdmagnetismus, III. 98.
- Sehot; Galvanische Frotschenkelversuche, I. 472; Grängen des Sehens, II. 205; Subjective Complementärfarben, II. 228.
- Sembert, Galvanisch-physiologische Versuche, I. 479.
- Senz; Bathometer, II. 451; Temperatur des Meeres, III. 141; Ausdehnung des Meerwassers, III. 233.
- Serebour, Optische Gläser, II. 178.
- Sesbroë, Ausfluß der Flüssigkeiten, I. 98.

- Sibri**; Alte Thermometerscale, II. 441; Gleichbleiben der mittlern Temperatur, III. 128.
- Sind**, Anemometer, I. 125.
- Sister**, Objectivgläser, III. 233.
- Sädersdorf**, Galvanische Zersetzung des Alkohols, II. 5.
- Ragnus**; Wasserstofftellur, II. 3; Geothermometer, II. 446.
- Rajocchi**, Soniometer, I. 6.
- Rarianini**, Galvanische Versuche, I. 364. 422. 456. 458. 461. 464. 465. 471. 472. 480.
- Rarr**, Beobachtungen an schwefelsaurem Kupferoxydkali, I. 14; Beobachtungen an essigsaurem Natron, I. 15; Siedepunct, I. 183; Brechungsverhältniß, II. 100; Doppelbrechung, II. 104; Farbenringe, II. 273. 276; Erscheinungen beim Schmelzen und Erstarren der Metalle, II. 458; beim Erstarren des Schwefels, II. 461; Schwefelkohlenstoffdampf, III. 228; Klangfiguren, III. 229.
- Ratteucci**; Electricitäts-erregung, I. 343; Galvanischer Versuch, I. 362; Galvanisch-physiologische Versuche, I. 472. 481; Galvanische Zersetzungsversuche, II. 2. 5; Magnetische Versuche, II. 46.
- Reermann**, Maximum und Minimum der Temperatur, III. 128.
- Reifle**, Heber, I. 220.
- Reißner**, Erdbhater Luftdruck, III. 33.
- Relloni**; Pygrometer, I. 200; Galvanisches Differenzialthermometer, I. 490; Verschiedene Wärmeversuche, III. 233.
- Reiz**, Mikroskop, II. 187.
- Reyer**, Haltbarkeit des Eisens, III. 223.
- Rile**, Luftpumpe, I. 118.
- Ritchell**, Durchbringen der Gase und Dämpfe durch Gauthouc, III. 228.
- Ritis**, Festigkeit des Eisens, I. 32.
- Ritscherlich**, Beobachtungen an verschiedenen Salzen, I. 18.
- Roll**, Magnetisirung von weichem Eisen durch Electricität, III. 232.
- Rons**, Chemische Harmonica, I. 255.
- Roser**; Winkelbestimmung, I. 6; Magnetische Versuche, II. 35. 86; Methode zur Vergrößerung der Variation des Erdmagnetismus, III. 80; Maß der Intensität des Erdmagnetismus, III. 88; Änderung der magnetischen Intensität, III. 114; Nordlicht, III. 117; Pöfe, III. 122.
- Müller**, Galvanisch-physiologische Versuche, I. 476.
- Runde**; Brown's mikroskopische Bewegungen, I. 12; Drehwaage, I. 78; Pygrometer, I. 204; Electricitäts-erregung, I. 343; Ausdehnung des Glases, II. 409; Ausdehnung des Wassers, II. 411; Ausdehnung verschiedener Flüssigkeiten, II. 425; Ausdehnungsgesetze der Flüssigkeiten, II. 436; Reductionsformel für das Quecksilberthermometer, II. 439; Construction von Weingeistthermometern, II. 441; Trevelhain-instrument, III. 229.
- Muret de Bore**, Electricitäts-erregung, I. 342.

- Navier; Xenacität, I. 29; Gleichungen für elastische Körper, I. 38; Ausfluß von Gasen, I. 131.
 Necker, Erdmagnetismus, III. 99.
 Negro, Elektromagnetischer Versuch, III. 232.
 Neumann; Specifische Wärme, II. 473. 476. 479. 481. 482; Pyrometer, II. 455.
 Nicol, Doppelspath, II. 105.
 Niemann; Spannkraft der Dämpfe, I. 180; III. 228; Calv. Versuche mit liq. Kohlensäure, II. 2.
 Nixon, Wasserwaage, I. 5.
 Nobili; Galvanometer, I. 392; Galvanische Froschschenkelversuche, I. 472; Galvanismus gegen Zähmung, I. 482; Thermoelektrisches Differentialthermometer, I. 489; Galvanische Färbung von Metallplatten, II. 10; III. 230; Farbenscale, II. 135; Wirkung der Metalle auf das Licht, II. 338; Anstellung der Faraday'schen elektromagnetischen Versuche, III. 231.
 Nordenfjöld, Laborator, III. 233.
 Ohm; Gegen die chemische Theorie des Galvanismus, I. 359. 364; Störungen bei elektrochemischen Versuchen, I. 366; Elektroskopische Wirkungen der geschlossenen Kette, I. 370; Unipolare Leiter, I. 373; Wirkungsabnahme der Kette in Schwefelsäure, I. 421; Electricitäts-erregung durch Berührung von Flüssigkeiten, I. 452; Ladungsphänomene, I. 457; Stützkraft der Drähte, I. 466; Versuche mit concentrirter Schwefelsäure in der galvanischen Kette, II. 10; Neue Abhandlungen über Electricität und Galvanismus, III. 230.
 Olmsted, Hagel, III. 56.
 Osann, Specifisches Gewicht, I. 225. 232; Schmelzbarkeit von Mischungen, II. 467.
 Parrot; Chemische Theorie des Galvanismus, I. 359; Fize Punkte des Thermometers, II. 438; Instrument zum Maß der Zusammenbrückung des Wassers, III. 228.
 Pearson, Phosphorescenz, II. 77.
 Pecklet, Lampen- und Kerzenlicht, II. 84.
 Pellissier, Erregung von Eönen, I. 253. 256; Holzharte, I. 309.
 Peltier, Trockene Säulen, I. 383.
 Perkins, Leidenfroth'scher Versuch, II. 400.
 Pfaff; Vertheilung der Electricität, I. 347; Berührungstheorie des Galvanismus, I. 355 ff.; Leitungsvermögen der Flüssigkeiten, I. 412; Magnetisirung durch Galvanismus, II. 48; Versuche gegen Watt, II. 82; Zur Kritik von Fischer's Schrift, III. 231.
 Pianciani, Electricitätsentladung, I. 352.
 Pictet, Congrege'sche Raketen, III. 228.
 Plagge, über das Sehen, II. 203.

- Plateau; Magnetische Versuche, II. 47; Subjective Gesichtserscheinungen, II. 210. 217. 222; III. 233; Relative Stärke der Farben, II. 215.
- Pöhl; Optische Instrumente, II. 178. 196.
- Pohl; Galvanische Versuche, I. 363. 429; Elektromagnetische Versuche, III. 231.
- Poisson; Grundzustand der Körper, I. 19; Mathematische Behandlung der Gleichgewichts- und Bewegungserscheinungen, I. 35; Druck und Zug in festen Körpern, I. 52; Fortpflanzung der Bewegung in elastischen festen Körpern, I. 81; Princip der Gleichheit des Druckes nach allen Richtungen in Flüssigkeiten, I. 90; Capillarercheinungen, I. 96; Schallgeschwindigkeit, I. 241; Gesetze der Longschwingungen, I. 264; Klangfiguren, I. 295; Maß der Intensität des Erdmagnetismus, III. 86; Gleichzeitige Bewegungen des Pendels und der Luft, III. 228.
- Poncelet; Ausfluß der Flüssigkeiten, I. 98; Permanente Curven im Wasser, I. 102; III. 228; Maß und Geschwindigkeit des Wassers, I. 105.
- Potter; Photometer, II. 84; Reflexion von Metallen, II. 97; Specifische Wärme der Metalle, II. 477; Polsture nach Linien und Spiegeln, III. 233.
- Pouillet; Magnetische Temperaturgrößen, III. 231.
- Powell; Polarisation der Wärme, II. 398; Interferenz des Lichtes, III. 233.
- Pravaz; Galvanismus gegen Biß toller Hunde, I. 481.
- Precht; Adhäsion, I. 79.
- Prevost; Magnetismus des Erdkörpers, III. 231.
- Prinsep; Ausdehnung des Eisens, II. 419; Pyrometer, II. 455; Bildung von Legirungen im starren Zustande, III. 228.
- Pritchard; Sapphirlinsen, II. 180.
- Quetelet; Bewegung von Gas, I. 128. 130; Streifen in Flammen, II. 141; Streifen an Spiegeln, II. 144; Gestalt des Säuer's, III. 61.
- Raucourt; Geschwindigkeit des Wassers, I. 105.
- Reich; Änderung der magnetischen Intensität, III. 114.
- Rennie; Reibung, I. 78.
- Richardson; Nordlicht, III. 116. 123.
- Riese; Abnahme der Barometerhöhe vom Äquator nach den Polen, III. 11; Barometerstand im Niveau der Nord- und Ostsee, III. 12.
- Rieß; Magnetische Versuche, II. 85. 86; Maß des Erdmagnetismus, III. 86; Magnetische Variation, III. 102. 114. 231.
- Ritchie; Drehwaage, I. 7. 77; Elektromagnetischer Telegraph, I. 402; Leitungswiderstand der Flüssigkeiten, I. 406; Galvanische Versuche, Sechner's Repertorium d. Experimentalphysik. III. 17

- I. 449. 456; Photometer, II. 83; Gesetze der galvanischen Säule, III. 231; Beziehungen zwischen Electricität und Magnetismus, III. 232.
- Rive (de la); Chemische Theorie der Electricität, I. 354 ff.; Galvanische Versuche, I. 449. 454. 455. 458; Specifische Wärme der Gase, II. 486.
- Robinson, Barometer, III. 238.
- Roche, Spannkraft der Dämpfe, I. 179.
- Roget; Magnetische Curven, II. 53; Optische Erscheinungen, II. 220.
- Rose, Specifische Wärme, II. 477.
- Rostick, Reibung, III. 228.
- Rubberg; Doppelbrechung, II. 113. 115. 116; Erscheinungen beim Erkalten von Legirungen, II. 462; Specifische Wärme, II. 463; Latente Wärme, II. 471.
- Runge; Platineisenkette in Aëthallauge, II. 5; Electrochemische Bewegungen, II. 28.
- Sabine, Correction wegen Temperatur des Pendels, III. 229.
- Saigen, Magnetismus durch Drehung, II. 57. 59.
- Saladin, Verdampfung, I. 195.
- Saussure, Kohlen säuregehalt der Atmosphäre, III. 61.
- Savart; KrySTALLINISCHES Gefüge der Körper, I. 10; Elasticität der Körper, I. 80; Torison, I. 73; Erregung von Tönen, I. 251; Klangfiguren, I. 294; Gränze der Töne, I. 335.
- Schitzko; Dämpfe, I. 178. 181; Wärme, II. 401. 491.
- Schmidt, Ballistisches Problem, I. 86.
- Schmidger, Gewitter, III. 79.
- Schöck, Witterungsregel, III. 10.
- Schöbler; Verdunstung des Eisens, I. 196; Hygrometer, I. 199; Einfluß des Mondes auf die Witterung, III. 6. 235; Witterungsanzeigen durch Vögel, III. 10; Variation der mittlern Windrichtung, III. 33; Einfluß des Mondes auf die Windrichtung, III. 43; Einfluß des Mondes auf die Regenmenge, III. 48; Einfluß des Windes auf die atmosphärische Electricität, III. 74.
- Schwarz; Pyrometrisches Verfahren, II. 457; Specifische Wärme von Eisen und Platin, II. 479.
- Schweigger, Endosmose und Exosmose, III. 229.
- Schweigger-Seidel, Beobachtungen an Quecksilber, I. 14; Magnetisierung durch Galvanismus, III. 231.
- Scorechy, Durchgang des Magnetismus durch Körper, III. 231.
- Seebeck; Instrument zur Bestimmung des Brechungsverhältnisses, II. 102; Instrument zur Messung des Polarisationswinkels, II. 263; Bestätigung des Brewster'schen Gesetzes, II. 265; Polarisationswinkel beim Kalkspath, II. 267.

- Certürner, Verhältniß des Lichtes zur Wärme, II. 72.
 Shaw, Richtung des Sehens, III. 233.
 Shires, Winkelmessung, III. 229.
 Siber, Einfluß des Mondes auf das Barometer, III. 29.
 Simon, Galvanische Zersetzungsversuche, II. 1. 3.
 South, Objectivgläser, III. 233.
 Stampfer; Ausdehnung von Messing, II. 410; Ausdehnung des Wassers, II. 411.
 Stern, Erscheinung an tönender Glasröhre, I. 85.
 Strehlke; Klangfiguren, I. 291. 305; Einfluß der Gewitter auf den Barometerstand, III. 32.
 Sturgeon; Magnetismus der Metalle, III. 231; Elektromagnetische Versuche, III. 232.
 Swanberg; Temperatur des Planetenraumes, III. 5; Erstarrungspunct von Legirungen, III. 234.
 Taylor, Brennen des Steinkohlengases, II. 89.
 Thénard, Compressionsfeuerzeug, II. 75.
 Thilorier, Luftpumpe, III. 229.
 Tortual, Zerstreuungsbilder, II. 203.
 Tregaskis, Spannkraft der Dämpfe, I. 177.
 Trevelyan, Erregung von Tönen, I. 254; III. 229.
 Tyler, Ausdehnung des Stahles, II. 410.
 Valz; Fernröhre, II. 198; Dichtigkeit des Äthers, III. 1.
 Voget, Chemische Wirkung des Lichtes, II. 81.
 Volz, Ausströmen der Luft, I. 129.
 Wach; Beobachtungen an kieselsaurem Kalk, I. 16; Niederschlagung der Metalle, II. 18; Endosmose und Exosmose, III. 229.
 Watt, Versuche über das Licht, II. 81.
 Weber, Luستهlektrophor, I. 348.
 Weber; Druck von Drähten, I. 62; Verlängerung oder Verkürzung von Saiten, I. 67; Erscheinung an tönender Glasröhre, I. 84; Specifisches Gewicht des Wassers, I. 232; Schallgeschwindigkeit, I. 248; Monochord, I. 259; Zungenpfeifen, I. 314; Compensirte Orgelpfeifen, I. 330; Wärme bei Compression und Dilatation von Metallen, II. 473; Specifische Wärme, II. 477. 480.
 Weissbach, Soniometer, I. 7.
 Werner, Maßstab, I. 1.
 Weylar; Versuch mit Eisen in salpetersaurer Silberauflösung, I. 458; Ungleichzeitiges Eintauchen homogener Platten, I. 461; Chemische Wirkung des Magnetes, II. 67.
 Wheatstone; Resonanz, Maultrommel, Gender, I. 261. 313. 314; Fortpflanzung der Töne, III. 229.

- Biegmann, Bitterungsregel, II. 10. 1
 Billis; Anziehungsercheinungen einer Platte gegen einen Luftstrom, III. 229; Vocalektöne und Zungenpfeifen, III. 230.
 Bollaston; Barometer, I. 115; Doppelmikroskop, II. 193.
 Brench, Taschenthermometer, II. 452.
 Young, Interferenz, III. 233.
 Samboni, Trockene Säulen, I. 384.
 Sandetesch, Chemische Wirkung des Magnetismus, II. 68.
 Savapovsky, Widerstand des Holzes, III. 229.
 Sawabzky, Früchten der Blumen, I. 352.
 Sinden; Beobachtungen an Eisenschlacken, I. 16; Mikrometer, III. 229.

jen.

n über das Licht in Pog-
ert über das Licht*).

$$\begin{aligned} &= 1 - 2 \\ &\cot x [\cos (i - r)]^{\frac{1}{2}} \\ &= \cot x \sqrt{\cos (i - r)} \\ &\cot x \cot 56^{\circ} 40' \end{aligned}$$

er steht ein Satz, der im Original heißt: This
from a quarter of tint in value down zero
Strahlen schalte ein: aus dem ungewöhnlichen

alle schalte ein: erstern
— β schalte ein: nicht
H. Wasser I. Glas

$$\begin{aligned} a. & \cos \varphi I. - \cos 2 \varphi \\ & \frac{c^2}{2} I. c^2 \end{aligned}$$

richtige Erfahrung weiß, wie hemmend und unangenehm oft
Studium physikalisch-mathematischer Abhandlungen sein
die Anzeige einiger befalls zu machenden Berichtigungen,
und, bei Abhandlungen, deren erleichtertes Studium
ist, nicht überflüssig sein möchte.

2) Berichtigungen zu Herschel's Wert über das Licht.

- Seite 246 Seite 7 v. u. fl. beliebiger Färbung I. beliebig dunkler Färbung
 — 303 u. 320 Hier muß man sich hüten, daß die verschiedene Bestimmung
 des Wortes Amplitude nicht Verwirrung verursache, in-
 dem S. 303 ~~die~~ halbe Amplitude genannt wird, was
 S. 320 als Amplitude schlechthin bestimmt ist.
 — 321 — 2 v. o. fl. des Quadrats I. des Quadrats der Amplitude
 — 323 — 15 v. u. fl. $\sqrt{a^2 - 2a a' \cos k + a'^2}$ I. $\sqrt{a^2 + 2a a' \cos k + a'^2}$
 — 333 — 7 v. u. fl. S M X I. S A X
 — 356 — 4 v. u. fl. Reihen I. Ringe
 — 365 — 4, 5, 8, 11, 13 v. u. fl. A G I A O
 12 v. u. fl. A G I A O
 8 u. 7 v. u. fl.: so wird derselbe zu gleicher Zeit von einer
 Welle erreicht, die jedem Strahlenkegel zugehört, wovon
 die eine nach q M aus q, die andere nach A M von A
 ausgeht, I.: so wird derselbe zu gleicher Zeit von zwei
 Wellen erreicht, deren eine dem Kegel um q M, die an-
 dere dem Kegel um A M zugehört.
 — 366 — 2 u. 4 v. u. fl. G I C
 — 372 — 12 v. p. fl. hieß I. hieß Polynom
 — 383 — 18 v. u. fl. haben I. haben, fortgepflanzt
 — 387 — 19 v. o. fl. P F I P N
 — 388 — 5 v. u. fl. $PB = \frac{a}{a+b} \cdot I \cdot PB \times \frac{a}{a+b}$
 — 406 — 22 v. u. fl. gerade durch I. senkrecht auf
 17 v. u. fl. Salz oder Lobtenkopf I. eine Mischung von Salz
 und Colcothar
 — 501 6 v. o. fl. $\sin \theta^2 \sin \theta'$ I. $\sin \theta \sin \theta'$
 — 508 Der mit drittens anhebende Satz ist falsch und ungenau dar-
 gestellt. Er muß so heißen, wie ich ihn B. II. S. 281
 angeführt habe.
 — 509 Der Paragraph 1054. ist meines Erachtens unrichtig, in so fern
 der Hosenunterchied δ fälschlich auf die beiden Antheile
 Licht, deren einer parallel, der andere senkrecht auf die
 Einfallsoberfläche ist, bezogen wird. Vgl. dies Repertorium
 II. S. 285 ff.

3) Nachträgliche Berichtigungen zu meinen Maßbestimmungen über die galvanische Kette.

- Seite 29 Seite 7 v. o. fl. 37,8 I. 39,5
 — 35 in der ersten Zeile der Tabelle S. 19,5 I. 19,25.
 — 43 — 5 v. u. fl. (Zinnkupfer) 0,221 I. (Zinnkupfer) 0,221
 — 44 — 1 v. o. fl. Zinnkupfer I. Zinnkupfer

4) Nachträgliche Berichtigungen zur zweiten Ausgabe von Biot's Lehrbuch.

Zu Theil I.

Seite	269	Seite	2 v. o. fl. 1° I. 0°
—	269	—	2 v. o. } eben so.
—	270	—	2 v. o. }
—	271	—	2 v. o. }
—	273	—	1 v. u. fl. krummen l. schief gekrümmten
—	293	—	28 und 9 v. u. fl. Rose l. Erman d. S.

Zu Theil II.

Seite	17	Seite	13 v. o. fl. + l. X
—	19	—	3 v. u. fl. 4117,57 l. 4417
—	118	—	3 v. u. fl. offenen l. gedeckten
—	118	—	2 v. u. fl. gedeckten l. offenen
—	120	—	27 v. u. fl. offenen l. gedeckten
—	120	—	26 u. 25 v. u. fl. schwächerer l. stärkerer
—	211	—	12 v. u. streiche weg: noch weniger
—	312	—	23 v. o. streiche weg: nicht
—	340	—	22 v. u. fl. am l. in

Zu Theil III.

Seite	76	Seite	15 v. o. fl. Drahtes l. Bogens
—	80	—	19 v. u. fl. Kraft l. Nabel
—	183	—	3 v. o. fl. Überganges l. Schließungsdrahtes
—	199	—	20 v. u. fl. 0,0725 l. 0,0676
			13 v. u. fl. 0,0223 l. 0,0247
			1,400 l. 1,3976
			4 v. u. fl. 0,0725 l. 0,0676
			3 v. u. fl. 0,09118 l. 0,9167
—	242	—	26 v. o. fl. 1fache l. 11fache
—	243	—	2 v. o. fl. 11fache l. 1fache
—	248	—	14 v. o. fl. 4 l. 8.
—	285	—	7 v. u. fl. 0,970 (9,15) l. 0,966 (9,15)
—	319	—	7 v. o. und fl. Dieser Satz ist falsch und muß so dargestellt werden, wie in diesem Repertorium l. S. 470; 5)
—	330	—	6 v. u. fl. l. l. l.
—	379	—	17 v. o. fl. XIV. l. XVII.
—	423	—	25 v. u. fl. 504 l. 504
—	474	—	7 v. u. fl. 213 l. 199
—	554	—	13 v. o. fl. 44,25 t l. 33 t

Zu Theil IV.

Seite	347	Seite	6 v. o. fl. $\sin U \sin U'$ l. $\cos U \sin U'$
-------	-----	-------	--------------------------------------------------

Zu Theil V.

Seite	45	Seite	26 v. u. streiche weg: dünne
—	141	—	5 v. u. fl. bei l. aus
—	383	—	24 v. u. fl. 33°,5 l. 30°,5

5) Berichtigungen zu diesem Repertorium.

Zu Theil I.*).

Seite	20	Seite	17	v. o. f. Mangel L. Stempel
—	40	—	8	v. u. f. an L. u.
+	105	—	20	v. o. f. des L.
—	123	—	4	v. u. f. 0,0723 L. 0,0723
+	207	—	10	v. u. f. ist (unter einander zusammenhängenden) die L. ist, bis (unter einander zusammenhängenden)
—	242	—	9	v. o. nach ersten Secunde fuge hinzu: wenn diese als Seitenzahl angenommen wird.
+	264	—	2	v. o. man lasse weg: und der Electrochemie
—	280	—	15	v. o. f. dem halben L. — dem halben
—	293	—	12	v. u. f. $\frac{1}{\sqrt{\frac{r}{\rho \omega}}} L. \frac{1}{2k} \sqrt{\frac{r}{\rho \omega}}$
—	294	—	12	v. u. f. Satz L. Sätzen
—	296	—	15	v. u. f. $\mu^2 L. \mu$
+	299	—	21	v. o. f. Werthe L. Werthen
+	300	—	21	v. o. f. Gde L. Gde
—	300	n. ff.	f. Pellissier L. Pellissier	
—	345	—	2	v. u. f. einer geladenen Septener. Tafel L. eine geladene Seydener Tafel
—	447	in der 7. Querspalte v. u. f.	$\left. \begin{array}{l} 0,0723 \\ 0,0723 \\ 0,100 \\ 0,100 \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} 1:2 \\ 4:5 \end{array} \right\} L. \left. \begin{array}{l} 0,0000 \\ 0,121 \\ 0,122 \end{array} \right\} 2.4.5$	
—	457	—	6	v. u. f. Übergangszahlen L. Übergangszahlen
—	464	—	23	v. o. f. den andern L. einen andern, in den andern Gehälter

Zu Theil II.

Seite	100	Seite	22	v. o. f. ungewöhnlichen L. gewöhnlichen
—	111	—	12	v. u. f. zwei rechtwinkliche, auf einander L. zwei, rechtwinklich auf einander
—	115	—	12	v. o. f. in der Luft L. in der ersten Richtung
—	424	—	11	v. u. f. — 4° 50 L. — 4° 50
—	430	—	22	v. u. f. 1,020100000 L. 1,020100000
—	432	—	9	v. u. f. 0,001220027 L. 1,001220027
—	462	—	17	v. u. f. ihre Erstarrungstemperatur L. die Erstarrungstemperatur einer gewissen Legirung unter ihnen (dem. Legirung)
—	462	—	15	v. u. nach Verhältnis schalte ein: (das der Gemischen Legirung)

Zu Theil III.

Seite	20	Seite	16	u. 4 v. u.
—	20	—	18	v. u.
—	32	—	1	v. o.
—	37	—	18	v. u. f. Berlin L. Berlin
—	61	—	2	v. u. f. LX. L. LXI.
—	90	—	3	v. u. f. aber L. eben

*) Die mit einem + bezeichneten Berichtigungen sind solche, welche schon in Th. I. angezeigt worden sind.

D.C.
M.M.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10







